

EICHLERIELLA ALLICIENS ZOEKT ASIEL IN NEDERLAND


Bernhard de Vries

Roerdomplaan 222, 7905 EL Hoogeveen

De Vries, B. 2004. *Eichleriella alliciens* seeks asylum in The Netherlands. *Coolia* 47(3): 168.

Eichleriella alliciens is recorded as new for the Netherlands. A description is given and differences with *Eichleriella leucophaea* and *Eichleriella deglubens* are discussed.

Mijn eindejaarsuitkering bestaat vooral uit een stapel enveloppen met inhoud die Eef Arnolds mij toestopt. Met die inhoud ben ik dan een groot deel van de winter zoet. Naast heel veel gewoons vind ik daarin soms wat leuks. Zo ook een berkentakje gevonden in een Eiken-Berkenbosje bij Valthe (coord. 258/541) waarop iets zat dat leek op jonge *Cylindrobasidium laeve*; platte schoteltjes met een licht rossig beigeachtig creme kleur. Bij het aansnijden was het materiaal echter wat wasachtiger en de rand was niet wit maar lichtbruinviltig. Onder de microscoop bleek al gauw dat er basidiën en sporen waren van het *Tremella*-type (zie Figuur 1):



Figuur 1. *Eichleriella alliciens*. Sporen, maatsreepje = 10 μ m, basidia, hyfen.

Baden-Württemberg; verder in Polen, Vietnam en Zuid-Amerika. Het is weer een zuidelijk type dat hier een thuis gevonden heeft.

Literatuur

- Arnolds, E., Kuyper, Th.W., Noordeloos, M.E. (red.). 1995. Overzicht van de paddestoelen in Nederland. Nederlandse Mycologische Vereniging, Wijster.
Jülich, W. 1984. Die Nichtblätterpilze und Bauchpilze. Fischer, Stuttgart
Krieglsteiner, G.J. 2000. Die Grosspilze Baden – Württembergs Band 1. Ulmer, Stuttgart

Sporen $12-14 \times 4,8-5,3 \mu$ m. Basidia $18-23 \times 8-12 \mu$ m. Hyfen van trama lang hyalien in congorood $1,4-3 \mu$ m; gespen lastig te vinden maar in de dunwandiger subhymenium-hyfen duidelijker. Het was dus *Eichleriella alliciens* (Berkeley & Curtis) Burt, de soort met lichte incarnaat tinten en relatief kleine sporen en basidiën.

Eichleriella leucophaea Bres. verschilt door de kleur van het hymenium (grijs) en de dikwandige hyfen. Ook heeft deze basidiën die langer kunnen worden.

De soort *Eichleriella deglubens* (Wrattige waskorstzwam) die al in ons land gevonden was heeft grote basidiën ($25 - 50 \mu$ m lang) en is, zoals de naam al zegt, meestal wrattig.

Volgens Krieglsteiner (2000) heeft *E. alliciens* een boreosubtropisch - tropische verspreiding en is hij drie maal gevonden in