

duidelijk dat bij determinatie vooral sporenmaat en breedte van kiemporie doorslaggevend zijn. Ook opvallend was dat de Geaderde leemhoed ontzettend snel kan opkomen om vervolgens weer even zo snel te verleppe. Het hele proces speelde zich af in 2 tot 3 dagen.

Literatuur

Nauta, M.M., 2002. Een nieuwe Leemhoed op Houtsnippers. Coolia 45: 57-61.

L. Rommelaars, Tilburg

Puntig mosklokje (*Galerina triscopa*)

Keizer, P.-J. 2004. *Galerina triscopa* was found in a flower pot. Coolia 47(4): 216-217.

In de warme nazomer van 2003 trof ik een tweetal kleine bruine paddestoeltjes aan in een bloempot die buiten op mijn dakterras staat. Het waren van die paddestoeltjes van het type 'ruim 13 in een dozijn'. Maar zwammetjes zó dicht bij huis aangetroffen konden toch niet ongedetermineerd blijven. Er waren wel enkele enigszins opvallende kenmerken: de hoed was voorzien van een puntig umbootje en de steel was vrij sterk donkerbruin naar de basis, met in het onderste derde deel enkele witte velumvezeltjes.

In het microscopisch preparaat bleek dat de sporen ruw waren en sommige voorzien van een z.g. navelvlek (plage). Daarmee werd meteen duidelijk dat het om een Mosklokje (*Galerina*) gaat, want dit sporenkenmerk is uitsluitend aan te treffen bij *Galerina*'s. Nu kon de determinatie tamelijk gemakkelijk verlopen. In de sleutels van Bon (1992) loopt men min of meer probleemloos naar *G. triscopa*. Via de sleutel van Watling & Gregory (1993) gaat dit moeilijker omdat de soort opgenomen staat onder de soorten met capitata (met een kop) cystiden, terwijl ze in het hier bestudeerde materiaal hoogstens subcapitata zijn (zie figuur 1). In de *Galerina*-sleutel van Barkman (1969) is deze soort niet opgenomen.

In het Overzicht (Arnolds et al., 1995) staat dat *G. triscopa* erg zeldzaam is, en op hout is aangetroffen. Dat stemt niet helemaal overeen met de standplaats op humeuze potgrond. In Watling & Gregory echter wordt behalve mossig rot hout ook veen en veenachtig materiaal in kassen als standplaats vermeld; dat sluit goed aan bij deze vondst.

Figuur 1. Habitus en microscopische structuren van *Galerina triscopa*. 1. Habitus; 2. sporen; 3. caulocystiden; 4. cheilocystiden.

Korte beschrijving:

Hoed 9-10 mm breed en 5-7 mm hoog, kegelvormig met duidelijke spitse umbo, vrij donker tabakbruin, iets doorschijnend gestreept, bij drogen lichter. Lamellen normaal staand, smal aangehecht, met dezelfde kleur als de hoed, en wit bewimperde snede. Steel 23-33 × 1,5 mm, cilindrisch, top middelbruin, naar beneden overgaand in donker roodbruin, onder het midden enkele onduidelijke witte velumvezels.

Sporen 7,3-8,6 × 4,5-5,1 µm, ellipsoid-amandelvormig, ruw, met plage. Cheilocystiden lageniform tot slank-lageniform met dikwijls subcapitate top, 30-45 × 6-15 µm, dikwijls met een lichtbrekende massa in de top. Pleurocystiden afwezig. Caulocystiden buigig – lageniform – utriform, veelvormig, 30-55 × 5-16 µm.

Literatuur

- Arnolds E., Kuyper, T.W. & Noordeloos, M.E. (red.). 1995. Overzicht van de paddestoelen in Nederland. Nederlandse Mycologische Vereniging.
- Barkman, J.J. 1969. Het geslacht *Galerina* in Nederland. *Coolia* 14(3).
- Bon, M. 1992. Clé monographique des espèces Galero-Naucorioides. Documents Mycologiques, Tome XXI, Fasc. 84.
- Watling, R. & Gregory, N.M. 1993. British Fungus Flora 7. Cortinariaceae p.p. Royal Botanic Garden Edinburgh.

P.J. Keizer, Utrecht

Podostroma alutaceum

Keizer, P.-J. 2004. *Podostroma alutaceum* was found for the first time in The Netherlands. *Coolia* 47(4): 217.

Enige tijd geleden, in september 2001 kreeg ik een melding van Lydia van den Ham, dat zij op 21 september een vreemde paddestoel gevonden had. Hij leek sprekend op *Podostroma alutaceum*, die op de pagina's 276 en 277 van Phillips (1981) beschreven en afgebeeld staat. Nu had ik nog nooit van die soort gehoord, dus leek het me interessant deze paddestoel te zien. Het resultaat was verrassend, want het vruchtlichaam zag er exact uit als het plaatje in Phillips. Nooit was het determineren van een paddestoel zo gemakkelijk!

Dit exemplaar groeide in het bos van Nieuw – Amelisweerd op een op de grond liggend stuk loofhout, waarvan de boomsoort niet meer te achterhalen is, maar in de omgeving staan onder andere Beuken en Essen.

Een nadere beschrijving van deze soort is niet nodig, want de foto in Phillips volstaat. In het Overzicht ontbreekt hij, waaruit we afleidden dat dit de eerste vondst van Nederland moet zijn.

Als Nederlandse naam stel ik voor: Bleke knotszwam.

Literatuur

- Arnolds E., Kuyper, T.W. & Noordeloos, M.E. (red.). 1995. Overzicht van de paddestoelen in Nederland. Nederlandse Mycologische Vereniging.
- Phillips, R. 1981. Paddestoelen en Schimmels van West-Europa. Spectrum Natuurgids.

P.-J. Keizer, Utrecht