

START RUBRIEK: “NIEUWE EN BIJZONDERE SOORTEN”

In Nederland worden jaarlijks tientallen nieuwe soorten (en variëteiten) van paddenstoelen vastgesteld. Van slechts een klein deel daarvan wordt zo nu en dan verslag gedaan in Coolia met een beschrijving en illustraties. Daarom starten we een nieuwe rubriek, waarin we meer nieuwe soorten aan bod laten komen door het geven van een beknopte beschrijving, een afbeelding van één of meer kenmerken en met vermelding van de gebruikte (determinatie)literatuur. Zo kunnen we nieuwe en andere bijzondere soorten die in Nederland zijn gevonden, beter onder de aandacht brengen. Ook worden ‘eerste vondsten’ op deze wijze gedocumenteerd voor nu en later. We gaan alleen soorten opnemen waarvan de wetenschappelijke en de Nederlandse naam door de Karteringscommissie en de Commissie Nederlandse Namen zijn vastgesteld. Onder ‘bijzondere soorten’ valt in elk geval ook de herontdekking van als in Nederland uitgestorven beschouwde soorten. Het gaat daarbij uitsluitend om soorten die nog niet in Coolia zijn beschreven.

De rubriek zal deels worden samengesteld op grond van de informatie die al op het nieuwe-soortenformulier is ingevuld (zoals waarnemingsgegevens en literatuur). Voor de beschrijving en/of gebruikte determinatiekenmerken en voor de illustraties (foto's of tekeningen) is echter de medewerking van de waarnemers nodig. Bijdragen bestaande uit het betreffende nieuwe-soortenformulier, beknopte beschrijving en illustraties kunnen worden ingestuurd aan: Eduard Osieck, email soortenrubriek@ziggo.nl. Plaatsing in Coolia is afhankelijk van de beschikbare ruimte.

LET OP: Deze rubriek staat geheel los van de procedure voor het melden van nieuwe soorten, die onverkort van toepassing blijft (zie http://www.paddestoelenkartering.nl/nieuwe_soort.html).

Toelichting bij de literatuurverwijzingen: de titelbeschrijvingen van de gebruikte literatuur (artikelen, zo mogelijk voorzien van een snelkoppeling) kunnen ook onder de betreffende soort in de Verspreidingsatlas worden opgezocht (uiteraard pas zodra de soort aan de atlas is toegevoegd). Publikaties met afbeeldingen zijn met een sterretje (*) gemerkt.

Ceriporia mellita (Bourd.) Bond. & Sing. Kleverige wasporia

Groep: Basidiomyceten, polyporoid (gaatjeszwammen) (Bpo)

Vondst: Loofhouttak in gemengd bosgebied, Heveringen, Voornse Duinen (ZH, 11/10/2014)

Beschr: Resupinate bleekoranje/roze gaatjeszwam met witte rand en vrij kleine gaatjes (4–5/ mm). Met KOH verkleurde het (gedroogde) vruchtlichaam bruinrood. Opvallend kenmerk was het kleverige oppervlak (zelfs na drogen). Hyfen en basidia zonder gespen, breedte hyfen van subiculum 2,5–3,5 (4) µm, sporen cilindrisch en iets gekromd, 5–6 × 1,8–2 µm.

Bijz: doorslaggevend voor de determinatie van deze wasporia zijn de sporenbreedte (<2 µm), het kleverige oppervlak en de KOH-reactie.

Verspr: Alleen uit Europa bekend (FR, GB, BE, CH, PL). Op diverse loofhoutsoorten aangetroffen: o.a. populier, hazelaar, els en appel (FR); es, beuk en wilg (GB); beuk (BE).

Lit:

*Pieri, M.; Rivoire, B. 1997. A propos du genre *Ceriporia* Donk (Aphyllporomycetidae). Bulletin de la Société Mycologique de France. 113(3):193–250.


*Vampola P. & Pouzar Z. 1996. Notes on some species of genera *Ceriporia* en *Ceriporiopsis* (Polyporaceae). Czech Mycology 48(4): 315–324

Ryvarden, L. & Melo, I. 2014. Poroid fungi of Europe. Synopsis Fungorum. 31:1–455.

Waarnemer Hermien Wassink
(Bevestiging Eduard Osieck)



Kleverige wasporia (*Cerioporia mellita*), vers en gedroogd (inzet), Heveringen.
(Foto's Hermien Wassink)



***Crepidotus calolepis* var. *calolepis* Geschubd oorzwammetje**

(syn. *Crepidotus mollis* var. *calolepis*)

Groep: Basidiomyceten, agaricoïd (plaatjeszwammen) (Bag)

Vondst: Op een dode populier in de Kennemerduinen (NH, 24/10/2015)

Kenm: Als een Week oorzwammetje (*C. mollis*) met op de hoed (breedte 4 cm) fijne, bleekbruine schubjes. Sporen $7-8,5 \times 5-6 \mu\text{m}$.

Bijz: Er zijn in ons land al eerder meldingen geweest van *Crepidotus mollis* var. *calolepis* maar deze werden toen opgevat als vormen van het Week oorzwammetje met een geschubde hoed.

Beide monografieën van dit geslacht beschouwen dit taxon echter als aparte soort.

De variëteit *squamulosus* van *C. calopis* onderscheidt zich door de grotere sporen ($8,5-12 \times 6-7,5 \mu\text{m}$). Deze variëteit komt veel voor in Scandinavië, vooral op populier.

Lit:

*Senn-Irlet, B. 1995. The genus *Crepidotus* (Fr.) Staude in Europe. *Persoonia* 16: 1-80.

*Consiglio, G. & Setti, L. 2008. Il genere *Crepidotus* in Europa. *AMB Trento*.

Waarnemer Eduard Osieck
(Bevestiging Mirjam Veerkamp)
(Foto Eduard Osieck)

