

NIEUWE EN BIJZONDERE SOORTEN

Deze rubriek gaat uitsluitend over nieuwe en bijzondere soorten die nog niet in Coolia zijn beschreven en afgebeeld. Voor de beschrijving en/of gebruikte determinatiekenmerken en voor de illustraties (foto's of tekeningen) is echter de medewerking van de waarnemers nodig. Bijdragen bestaande uit het nieuwe-soortenformulier, beknopte beschrijving en illustraties kunnen worden ingestuurd aan: Eduard Osieck, email soortenrubriek@ziggo.nl. Plaatsing in Coolia is afhankelijk van de beschikbare ruimte. Toelichting bij de literatuurverwijzingen: de titelbeschrijvingen van de gebruikte literatuur (artikelen, zo mogelijk voorzien van een snelkoppeling) kunnen ook onder de betreffende soort in de Verspreidingsatlas worden opgezocht (uiteraard pas zodra de soort aan de atlas is toegevoegd). Publikaties met afbeeldingen zijn met een sterretje (*) gemerkt.

***Ceratosebacina longispora* (Hauerslev) P. Roberts Langsporig waskorstje**

syn. *Sebacina longispora* Hauerslev 1976, *Exidiopsis longispora* (Hauerslev) Wojewoda

Groep: Basidiomyceten, tremelloïd (trilzwammen en verwanten) (Btr)

Vindplaatsen: Binnenkant schors van verrotte populierenstam in moeras, Blikkenburg (Zeist, 7/12/2013); 1e vondst op licht verrot hout in elzenbroekbos bij Odijk (Utrecht, 27/10/2012)

Kenm: Onopvallend, vrijwel onzichtbaar korstje. Soort wordt microscopisch gekarakteriseerd door aanwezigheid van gespen, tremeloïde basidiën in combinatie met zeer lange, hoekig gebogen sporen. Verwarring mogelijk met *Ceratosebacina calospora*, een ander onopvallend, vrijwel onzichtbaar korstje dat ook lange, hoekig gebogen sporen heeft, maar zich onderscheidt door het ontbreken van gespen.


Bijz: In de Vlaamse lijst opgenomen als *Exidiopsis longispora*. Volgens Roberts (1993) verschilt het geslacht *Exidiopsis* van *Ceratosebacina* door de aanwezigheid van dendrohyfidia in het hymenium. Bij *Ceratosebacina longispora* ontbreken deze. Daarom is hier in navolging van Roberts gekozen voor *Ceratosebacina*. In Europa ook bekend uit DE, DK, FR, GB en SF.

Lit: *Roberts, P. 1993. *Exidiopsis* species from Devon, including the new segregate genera *Ceratosebacina*, *Endoperplexa*, *Microsebacina*, and *Serendipita*. Mycol. Res. 97: 467-478.

Jülich, W. 1984. Die Nichtblätterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze. Gustav Fisher, Stuttgart.



Waarnemer: Ida Bruggeman
(Bevestiging: Eduard Osieck)



Splanchnonema ampullaceum (Pers.) Shoemaker & P.M. LeClair **Lindenkruikje**

Groep: Ascomyceten, loculoascomycetoïd (bitunicate ascomyceten) (Alo)

Vindplaats: op lindetakken, Oude Warande, Tilburg (1 en 14 november 2015). Inmiddels ook gevonden bij Bergen (NH), Heemskerk (NH), Houten (Ut), Schaarsbergen (Gld) en Boxmeer (L).

Kenm.: De ascomata ontwikkelen zich solitair of in groepjes onder de schors waardoor bobbelen ontstaan (Foto linksboven). Uiteindelijk breken de ostiolen door de schors en worden zichtbaar als zwarte puntjes (later gelijkend op kratertjes). Asci 8-sporig, hoofdzakelijk biseriaat, dikwandig. Sporen (40–42 × 14–15 µm), zoelvormig (met een grote en een kleine cel; Foto's onder, bruin getint en soms voorzien van een slijmschede (Foto rechts onder).

Det.: Groeiwijze, zoelvormige sporen en substraat (linde) zijn doorslaggevend.

Lit: Shoemaker, R.A. & P.M. LeClair (1975) Type studies of *Massaria* from the Wehmeyer collection. Can. J. Bot. 53: 1568–1598.

Waarnemer: Luciën Rommelaars
(Bevestiging Eduard Osieck)

