

Inhoud:

Voorplaat: Duinrouwzwever, <i>Peter de Knijff</i>	pag. 1
Activiteitenagenda, <i>Bestuur</i>	pag. 4
Bestuursmededelingen en Excursieverslagen, <i>Bestuur</i>	pag. 7
(in)Efficiënte Boerenzwaluwen rectificatie , <i>Hein Verkade, Johan Scholten, Peter Spierenburg, George Hageman, Sven Pekel</i>	pag. 10
Kieviten en Kleine Plevieren op de Oude Golf in 2025, <i>Jelle van Dijk</i>	pag. 11
Een nieuw paar Torenvalken op het Westeinde, <i>George Hageman</i>	pag. 14
Galerie, <i>Nellie van der Ploeg - van Leeuwen</i>	pag. 18
Natuurtekenen-workshop door Anita Walsmit Sachs, <i>Jaap Eisenga</i>	pag. 20
Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek, <i>Jelle van Dijk</i>	pag. 21
• Erwin Kompanje 2025. De zanglijster	
• Menno Schilthuis & Freek Vonk 2020 Wie wat bewaart. Twee eeuwen Nederlandse natuurhistorie.	
Waarnemingen april mei juni 2025, <i>Peter Spierenburg</i>	pag. 23
Aankondiging boek “de Noordduinen van Noordwijk”	pag. 32
Werkgroepen	pag. 33

Bij de voorplaat:

Duinrouwzwever

Foto: Peter de Knijff

De Duinrouwzwever *Hemipenthes morio* is één van 21 in Nederland voorkomende wolzwevers, een klein groepje van parasitoïde vliegachtigen met nogal aparte benamingen als “wolzwever”, “rouwzwever” en “villa”. De volwassen wolzwevers leven vrijwel uitsluitend van nectar, maar hun larven leven op - en doden uiteindelijk - een heel scala van andere insecten. De larven van de Duinrouwzwever leven op de poppen van sluipvliegen en bladwespen. Alle wolzwevers zijn zeer goede en snelle vliegers en in vlucht vaak moeilijk te volgen. Sommige soorten zitten ook graag op kale grond maar zijn ook op een scala van bloemen aan te treffen. In het veld zijn ze qua gedrag nog het meest te verwarren met pijlstaartvlinders of Kolibrievlinders, ze zijn alleen beduidend kleiner, maximaal 15 mm lang. Door hun lang behaarde uiterlijk worden ze ook nog wel eens vergeleken met hommels die min of meer even groot zijn. Echter, hommels vliegen veel trager en onbeholpen. Duinrouwzwevers worden in Nederland hoofdzakelijk in mei en juni in de duinstreek waargenomen, globaal tussen Hoek van Holland en Schoorl. Daarnaast worden ze ook in het oosten van Brabant en Limburg aangetroffen. In de Noordduinen zijn sinds 2000 6 wolzweverssoorten waargenomen met in totaal 62 waarnemingen. De meest algemene zijn Duinrouwzwever (15 waarnemingen), Kleine bretelrouwzwever (14) en Duinvilla (26). Veel minder algemeen zijn de Gewone wolzwever (2), Dwergrouwzwever (3) en Hottentotvilla (2). Zeer kenmerkend en opvallend is de lange recht vooruitstekende tong bij de echte wolzwevers. Deze uitstekende tong ontbreekt bij de rouwzwevers en de villa's. Geïnteresseerd? Dan is de herkenning van alle Nederlandse soorten goed te doen met twee publieke bronnen:

https://waarneming.nl/download/Veldtabel_wolzwevers_150.pdf en

https://determineren.nederlandsesoorten.nl/linnaeus_ng/app/views/matrixkey/index.php?epi=42.

Peter de Knijff

