

Stuifduin

Nieuws over beleid, beheer en bedreigingen

Waar is de ree gebleven?

Twee keer per jaar worden er in de duingebieden van Dunea reeën geteld. Dit om de ontwikkeling van de reeënpopulatie in het beheersgebied nauwlettend te volgen. Vanaf de zomerperiode worden er steeds minder reeën in de duinen gespot. Dit bleek ook uit de resultaten van de najaarstellingen. Zodra de eerste sneeuw is gevallen, gaat Dunea eropuit om op basis van sporen een beter onderbouwd beeld te krijgen van de reeënpopulatie.



Reeën worden in Meijndel aanzienlijk minder waargenomen. Onderzocht wordt waarom. Is het de deels zwoele winter of is de populatie langzaam aan het stabiliseren? Foto: Dennis van der Niet.

Nieuw visitekaartje van Duinbehoud

Met gepaste trots kan Duinbehoud haar nieuwe website presenteren: duinbehoud.nl. Twee vrijwilligers, ontwerper Jack Zwanenburg van Eden Design en websitebouwer Danny Kleine van Marketing Brigade, hebben met veel inzet en professionaliteit een hedendaagse website geproduceerd. Een website die niet af is, want er zullen voortdurend nieuwe berichten worden toegevoegd. Houd hem in de gaten of wordt Facebook-vriend van Duinbehoud.

Nieuwe kernreactor Petten

De Nuclear Research & consultancy Group zet concrete stappen voor de bouw van een nieuwe kernreactor in Petten. De benodigde vergunningaanvragen worden voorbereid. Het gaat om de vervanging van de bestaande reactor. Duinbehoud vindt dat deze reactor niet in de duinen thuishoort. Daarom zullen we de ontwikkelingen kritisch volgen en waar mogelijk actie ondernemen.

Kernreactoren horen niet in de duinen te staan, los van de discussie of ze elders dan wel zouden mogen worden gebouwd. Foto: Joost Bauwmeester.



Begrazing is een beproefde methode van duinbeheer, maar dat de vinger aan de pols moet blijven, bewijst het onderzoek dat Alterra op verzoek van Waternet in de AWD uitvoerde. Foto: Joost Bauwmeester.

Stikstofbelasting door bijvoeren runderen

Alterra heeft op verzoek van Waternet het effect van bijvoeren van runderen in de Amsterdamse Waterleiding Duinen onderzocht. Bijvoeren leidt per hectare tot toevoer van vier kilo stikstof bovenop de normale jaarlijkse belasting van zestien kilo. Door deze overmaat aan stikstof kan kwetsbaar duingrasland veranderen in grasland met veel ruige soorten. Waternet reageert op deze resultaten door vermindering van runderbegrazing in de winter.

Blauwe kiekendief, vrouwtje.
Foto: René van Rossum.



Kustbroedvogels: stijgers en dalers

In de nieuwe Vogelbalans voor 2011 van SOVON Vogelonderzoek Nederland zien we een scherpe tweedeling in ontwikkelingen. Lepelaar, zwartkopmeeuw en grote stern presteren goed. Karakteristieke kustbroeders als kluut, scholekster, strandpieper en stormmeeuw nemen met 40 procent af. Duinbroeders als blauwe kiekendief, velduil en tapuit doen het nog slechter en balanceren op de rand van uitsterven. Opvallend is de toename van de graspieper, die op de kwelders van het Waddengebied in steeds hogere dichtheden broedt (maar in het boerenland juist afneemt). Waarschijnlijk zorgt de verminderde begrazingsdruk op de kwelders voor een begroeiing waar de piepers beter in kunnen broeden.