

Een prachtig boomvormig vertakte fors bladmos was gauw als Thamnium alopecurum (L.) Br. eur. (leg Landwehr, Oud-Valkenburg) thuisgebracht.

Agsteribbe kloof gretig in Zuid Limburgs materiaal van ondergetekende en werd het met hem eens over Eurhynchium speciosum Schpr. (=Oxyrrhynchium sp.) en Campylium protensum (Brid.) Broth. var. calcareum van de Riesenbergr (leg W.M. VI - '46).

Enkele Sphagna uit de Subsecundum-groep van de Nieuwkoopse schraallanden werden nog even bekeken o.a. Sphagnum auriculatum, Schimp.

Aan het slot van deze geanimeerde bijeenkomst werd aan onze administrateur levend materiaal van Riccardia pinguis (L.) Gray., (recent niet meer bij A'dam gevonden) en enkele Brya overhandigd, verzameld bij het Stadion, zodat toch ook nog iets aan Amsterdams mossen werd gedaan. Bij 't afscheid van de hortus werd afgesproken een excursie naar het kalkterrein bij Craillo te houden.

W.M.

Overzicht van de rondzendingen van de voormalige Bryologische Kring (Juli 1941 - 1942)

Motto: "Du choc des opinions jaillit la vérité".

Inleiding:

De voorloper van de Bryologische Werkgroep de Br.kring onderhield het onderlinge contact tussen de leden door middel van mossenrondzendingen. Allerlei exquise vondsten en systematische puzzles uit diverse delen van het land afkomstig kregen we daarbij onder ogen, dit ter oefening van onze systematische blik, ter kritische beoordeling van onze eigen determinaties en ter verrijking van onze kennis van de Nederlandse mosflora.

In het vergaderingsverslag staat reeds vermeld hoe die rondzendingen precies in hun werk gingen. Nu ze voor de meesten van ons niet meer voortgezet worden, willen we eens de balans opmaken. De deelnemers kunnen dan zien wat zich in de andere groepen heeft afgespeeld en het gevaar, dat de gegevens spoorloos verdwijnen, wordt meteen voorkomen.

Lijst van deelnemers (met afkortingen achter hun namen)

1e. groep	R.v.d.Wijk	R.W.
	W.D.Margadant	W.D.M.
	H.de Rover	H.R.
	W.H.Wachter	Wa.
	D.Bakker	D.B.
	V.Westhoff	V.W.
	H.v.Ooyen	H.v.O.
	Mörzer Bruyns	M.B.
2e.groep	R.W., Wa. en	
	J.J.Barkman	J.B.

W.Meijer	W.M.
F.J.Kuiper	F.K.
Mej.R.Jonker	R.J.

3e. groep R.W., H.R., D.B., Wa. en
W.Sterk W.S.
A.J.Roskamp A.J.R.

Alfabetisch overzicht van de gecirculeerde Hepaticae-Levermossen.

1. Anthoceros levis L. leg R.W.
Gelderland, Winterswijk, P 7,36,32
Langs greppelrand
2. Calypogeia Trichomanis (L.) Corda
f.m. compacta Meyl.
leg R.J. V '41 Greppelwand in fluvoglaciaal nabij Wolvega. Vermengd met Lepido-
zia reptans.
3. Cephalozia bicuspidata (L.) Dum. c.f.r.
leg A.J.R. 9 IV-42. Plasmolen, langs Molenbeek.
4. Cephalozia connivens (Dicks) Spruce
leg W.M. 23. 7. '41 't Hof, Bergerbos op zure bosgrond langs grachtrand o.a. met
Leucobryum glaucum, en Calypogeia Trichomanis.
5. Chiloscyphus polyanthus (L.) Corda
leg R.W. Friezenveen '41
6. Conocephalus conicus (L.) Dum. leg R.W.
Winterswijk. Steile kant van de Oedingse beek. P 7-37-12.
7. Diplophyllum albicans (L.) Dum.
leg A.J.R. IV '42. Heide bij Jansberg Plasmolen
8. Fossombronia foveolata Lindb. = F. Dumortieri (Hueben et Genth.) Linb.
leg R.J. IX '42 Vochtig heideveld nabij den Hoorn, Texel cfr. Doorslaggevend ken-
merk: netvormige structuur op de sporen.
9. Gymnocolea inflata (Huds.) Dum.
 - a. leg W.D.M. Schoorl, Zwanenvlak, vochtig karrespoor, IV '41. L 4-12-13.
Ingezonden als Marsupella Funckii. Waarvan deze soort echter verschilt
door de volgende kenmerken:
 1. celwanden in de hoeken niet verdikt. 2. blaadjes aan de top afgerond.
 - b. leg W.M. VII '41 Ganzenveldje, Duinen bij Schoorl. In gezelschap van Salix
repens en Drosera rotundifolia op 's winters onder watergedompelde plekken.
10. Jungermannia caespiticia (Lindenberg)
leg A.J.R. Beckoevers, Plasmolen, Jansberg. 9-IV-'42

11. Jungermannia crenulata Sm.

var. gracillima Hook.

leg Wa. VIII '41 Oirschot. Landgoed "De Baast" op een bospad, kenbaar aan de zeer talrijke jonge takken. De randcellen onderscheiden zich bijna niet van de overige.

12. Lepidozia reptans (L.) Dum.

leg D.B. IV '41 Oorsprong, Beek bij Nijmegen, vochtige boshelling met Leucobryum. Volgens Wa. fo. laxa wegens de in flagellen uitlopende zijtakken.

13. Lepidozia setacea (Web.) Mitt.

a. leg V.W. VII '41 Hassendal bij Mook. N.Helling, 40^o, Querceto Betuletum.

b. leg W.M. VII '39 Bunnerveen (Dr.)

In gezelschap van Calypogeia/en Cephalozia connivens op afgestoken ~~turf~~wand.
/Trichomanis

14. Lophozia excisa (Dicks) Dum.

a. leg V.W. V'41 Vochtige heide bij Westerflinter, park de Hoge Veluwe, Callunetum-Genistetum, Molinietosum op Fluvoglaciaal.

Determinatie-discussie:

Oorspronkelijk gedetermineerd als Marsupella emarginata. Volgens W.D.M. Lophozia ventricosa: 1. hoekige gemmen 2. geen hoek verdikkingen van de cellen.

H.v.O. 1. wel hoekverdikkingen 2. geen gemmen gezien dus Marsupella

Wa. Marsupella emarginata heeft veel sterkere hoekverdikkingen. Lophozia ventricosa heeft ze iets sterker en veel meer gemmen. Z.i. is het Gymnocolea inflata waarvan vormen met gemmen niet zeldzaam zijn. De inplanting der bladen is bij Gymnocolea zeer verschillend. Bij een volgende rondzending geeft W.D.M. een nieuwe determinatie: Alle bladtoppen spits, dus geen Gymnocolea. Vooral de gemmen wijzen op Lophozia. L-excisa klopt beter dan -ventricosa om de volgende redenen:

1. weinig sterke of in het geheel geen hoekverdikkingen.

2. weinig gemmen.

3. soms nog een derde tand aan de blaadjes.

Wa. kon zich hier wel mee verenigen en de rest sloot zich ook bij deze determinatie aan! b. leg W.M. cfr. III'42 "Duin en Kruidberg" Santpoort N.helling met Rhytidia-delphus triquetrus, Dicranum scoparium en Lophocolea bidentata

15. Metzgeria furcata (L.) Dum.

leg DB. 21.3.42 Staelduin (Westland) op Ulmus, vermengd met Dicranoweisia cirrata

16. Nardia scalaris Gray.

leg H.v.O. 29.VIII. '41 Voorthuizen, langs greppelkant, karakteristieke kenmerken. amphigastriën en de vorm van de olielichaampjes.

17. Odontoschisma Sphagni (Dicks) Dum.

a. leg H.v.O. VII '41 Staverden, Veluwe, tussen Pleurozium Schreberi en Hypnum cupressiforme van ericetorum onder heide (Callunetum-genistetum orchidetosum) nabij de leemkuil te Staverden.

- b. leg R.J. IX '42 Vochtige heide nabij den Hoorn, Tessel.
18. Pallavicinia Lyelli (Hook) Dum.
leg R.J. Tessel. Op zonnige greppelwand, 10-50 cm. boven het water. Zandige humus. Verder nergens op het eiland gevonden! Door de centrale streng van kleinere cellen in het thallus en door de vorm van pseudoperianth en involucrum van *Pellia* te onderscheiden.
19. Plagiochila asplenoides (L.) Dum. leg V.W. IV '41
Weustbos (Heksenbos), kotten, Winterswijk. Vorm met heel weinig tanden.
20. Ptilidium ciliare (L.) Hampe
leg F.K. XII '41 Bilthoven. In een dennenbos op het einde van de Beethovenlaan.
21. Scapania compacta (Roth.) Dum.
leg F.K. XII '41 Bilthoven. In de Biltse duinen tussen gras.
22. Scapania curta (Mart.) Dum.
leg W.M. 21-VII-'41 Ganzenveldje Schoorl tegen de kant van een afvalplasje. Ook bij Bergen aan Zee deze soort gevonden. (Wordt vervolgd).

Van den Redacteur.
=====

Het ligt in de bedoeling dat vóór de voorjaarsexcursie het tweede nummer van dit blaadje uitkomt. Willen allen die artikelen, berichten, verslagen van vergaderingen en/of oproepen te plaatsen hebben hun copy voor medio Februari inleveren.

De tekeningen in dit nummer zijn van den Heer J. Landwehr.

