

Van dezelfde auteur.

c. Tortula in North Am. North of Mexico.

Bryologist Vol 43; 1940.

Van de 68 "soorten" worden 20 als *Barbula* species gehandhaafd, terwijl 16 namen synoniemen van *Barbula* soorten zijn, een deel hoort in andere geslachten thuis, de rest wordt geschrapt. De anatomische variabiliteit van sommige soorten in deze geslachten is een interessant verschijnsel waar de schrijver op wijst. Beide publicaties vormen weer een goed voorbeeld van de noodzaak van revisies en "lumping".

W.M.

Aanvulling ledenlijst.

P.J. den Dulk	Proefstation	Renkum.
W.Helle	Quellijnstraat 102'	Amsterdam-Zuid.
K.J.W.Hensen	Nw. Keizersgracht 50'	Amsterdam-Centrum.
H.R. Maas Geesteranus	J.J. Vlotstraat 5	Amsterdam-Zuid.
M.F. Mörzer Bruyns	St. Janskerkhof 3	Utrecht.
R. de Wit	Kijkduinstraat 66'	Amsterdam-West.
Ulla Wit	Tapijtweg 4	Den Haag. Bewerkt het geslacht <i>Pogonatum</i> .
Dingeman Bakker	IJsselkade 21	Kampen.

Willen de mensen die in de vorige ledenlijst vermeld werden vanwege hun deelhebben aan de voormalige Bryologische Kring, maar die niet reageerden op de oproep voor de werkgroep in Natura, enig teken van leven geven, bijv. door zich op te geven bij Dr. v.d. Wijk (Goeman Borgesiuslaan 20, Groningen) voor de hervatte rondzendingen.

Oproep tot medewerking.

Ondergetakende zou graag van ieder die in ons land recente vindplaatsen kent van *Antitrichia curtipendula* of van *Cryptophaea arbuscula* (Cr. *heteromalla*), hiervan een nauwkeurige opgave ontvangen, teneinde deze voor een sociologisch onderzoek te bezoeken. Indien mogelijk tevens vermelden standplaats (boomsoort, bostype, dikte boom, hoogte boven de grond, expositie enz.) en van de mossen die er bij groeien. Bij voorbaat mijn dank!

J.J. Barkman.

Kam. Onneslaan 21 Leiden.

UIT DE OUDE DOOS.

De excursie van de voormalige Bryologische kring (26-4-'42). Van het Ledig erf (Utrecht) langs de Kromme Rijn naar het landgoed "Rhijnauwen".

Al spoedig passeerden we een klein ruderaalterreintje (opgebaggerde rivierklei), dat begroeid begon te raken met een "*Funarietum*", d.w.z. bedekt was met grote, geelgroen glanzende velden van *Funaria hygrometrica*, rijkelijk fructificerend, daartussen ook wat *Physcomitrium pyriforme* fr. en *Marchantia polymorpha* alsmede grappige bolletjes van blauw-wierkolonies.

De Kromme Rijn volgend passeerden we het bos "Amelisweerd", waar we op een beschadwd basalten muurtje aan de Rijn, *Metzgeria furcata* met één jong kapsel vonden. Op de bosgrond *Rhytidiadelphus squarrosus* en *Thuidium tamariscinum*, aan de waterkant *Fissidens bryoides* fr. en *F. taxifolius*. (wordt vervolgd).