

Voorlopige nieuwe naamlijst der Nederlandse Bryophyta, opgesteld
door R. van der Wijk en W.D. Margadant.

In 1927 stelde Wachter een naamlijst op van de Nederlandse Bladmossen, in 1931 gevolgd door een der Levermossen (Ned. Kruidk. Arch. resp. 1927, p. 76 en 1931, p. 530). Hoewel speciaal bedoeld voor het ordenen van het herbarium der Ned. Bot. Vereniging, werden deze lijsten de basis voor het gebruik van Latijnse mossennamen in ons land. Ze zijn thans echter niet meer in overeenstemming met de Internationale Regels der Botanische Nomenclatuur, doordat deze op een aantal punten gewijzigd werden. Het voornaamste hiervan is wel de verlegging van het beginpunt der nomenclatuur van de Musci (uitgezonderd Sphagnaceae) naar het posthume werk van Hedwigs Species Muscorum, 1801.

Wij hebben in de volgende lijst de namen zo goed mogelijk in overeenstemming met de internationale regels gebracht. Het betreft echter uitsluitend een literatuuronderzoek; vanzelfsprekend is ons niet alle literatuur onder ogen gekomen. Systematisch onderzoek, zoals het nagaan van de aard van het type-materiaal hebben we in dit stadium nog niet uitgevoerd; dat is trouwens een kwestie van monografische bewerking. Door deze twee oorzaken kunnen er nog wijzigingen in de namen komen. Voor verbeteringen houden we ons dan ook ten zeerste aanbevolen. We verwachten echter dat het aantal namen dat door deze oorzaken veranderen zal niet groot is. Wel zal een groot aantal namen veranderen als de systematische opvatting betreffende geslachten en soorten verandert. Wij hebben na overleg met de Werkgroep ons strikt gehouden aan de systematische opvattingen van Paul (Sphagnaceae) en Brotherus (overige Musci). (Om nomenclatorische redenen hebben wij hierop één uitzondering gemaakt, nl. bij *Barbula rigidula* (Hedw.) Mitt. ex Milde, welke combinatie, indien aangenomen, het gebruik van de naam *Didymodon* voor de overige soorten onmogelijk maakt.) in Engler en Prantl, Die natürlichen Pflanzenfamilien, 2e druk, 10 en 11, resp. 1924 en 1925, en van Buch, Evans en Verdoorn (Hepaticae) in Annales Bryologici 10, p. 3, 1937. Over het algemeen is de geslachts- (en ook de soort-) begrenzing in deze werken zeer eng. (Daardoor staan in deze lijst ook namen van vormen waarvan de twijfelachtige soortwaarde gebleken is. Red.)

De volgorde is om praktische redenen alfabetisch, zowel voor Musci als voor Hepaticae; binnen de geslachten zijn de soorten eveneens alfabetisch gerangschikt. De synoniemie is tot het uiterste beperkt. Daar Jansen en Wachter in hun Bryologische Notities X, N.K.A., 53, p. 137, 1943 een volledige opsomming geven van alle tot dat tijdstip in Nederland gebruikte Latijnse mossennamen, is alleen de officiële naam van hun lijst tussen haakjes geplaatst achter de naam, die wij gebruiken, wanneer deze afwijkend is. In enkele gevallen moesten ter argumentatie meer synoniemen aangehaald worden. Worden echter andere auteursnamen gebruikt dan is dit niet apart aangeduid. De z.g. vóór-Hedwigse auteursnamen mogen wel aangehaald worden, b.v. *Atrichum undulatum* (L. ex Hedw.) Pal. Beauv., maar verplicht is dit niet. Wij hebben dit zo eenvoudig mogelijk aangeduid. (Nieuwe soorten sedert B N X zijn met spatie gedrukt. Bij nog niet gepubliceerde nieuwe vondsten is het herbarium van de vinder aangegeven).