

Sphagnum cuspa. (Wo) *Sphagnum cuspa. fo-plumosum* Br. eur. (Wo), magel. (WiZ en Wo), pal. (Wo)
pap. (Wo) *recurv.* (Wo), *recurvum var. mucronatum* (Russ.) Warnst. (N en Wo); *Thuidium tam.*
(a)

S. Groenhuijzen.

Voor nieuwere namen en auteurs wordt naar de lijst elders in dit nummer verwezen. In de volgende nummers van *Buxbaumia* worden alleen de nieuwe namen gebruikt.

Red.

Enkele vondsten van een Overijsel-Gelderlandtocht.

In sneltreinvaart laten we ze even de revus passeren. We beginnen bij Duiven, waar op oude betonnen bruggetjes alleen *Orthotrichum affine* (det. W.M.), *Grimmia pulvinata* en *Bryum capillare* groeide.

Een vluchtig bezoek aan Montferland gaf mij de overtuiging dat een mossenweekend hier de moeite waard zal zijn. Zo vond ik langs de voet der heuvels aan de leemhoudende greppelkanten veel *Pellia Fabbronia*, *Riccardia pinguis* en ook de typische rozetjes van *Riccia bifurca*. Terloops knabbelde ik in de boesen wat *Thuidium tamniscinum*, *Georgia pellucida* en *Orthotrichum Lyelli* mee; ook *Pogonatum nanum* en *aloides* waren goed vertegenwoordigd. Hier zal wel een formidabele lijst tevoorschijn komen.

Het Korenburgerveen gaf enkele flinke kussens van *Plagiothecium Ruthi* (= *Pl. denticulatum var. undulatum*) det. W.M., te zien, op zeer natte sompige plekken. De bovenste blaadjes zijn 2 - 3 x gegolfd, de onderste glad, gaafrandig, kapsels op lange seta, overgebogen, met lang puntig deksel.

Oude bruggetjes leverden onderweg haast altijd *Orthotrichum diaphanum* en -*anomalum*, op. Ook *Schistidium apocarpum* was er vaak bij. De streek tussen Vorden en Beekhorst weemt van *Conocephalus conicus*. De landvorm van *Riccia fluitans* is daar ook rijk vertegenwoordigd. Als je in Overijsel langs natte greppels of sloten zoekt kun je er haast zeker van zijn, *Blasia pusilla*, *Anthoceros punctatus*, *Fossombronia Dumortieri* en *Philonotis fontana* aantreffen. Tot nog toe heb ik alleen *punctatus* aangetroffen en soms in grote hoeveelheden. Wim Meijer bracht mij van *Anthoceros laevis* enkele exemplaren gekweekt in de Hortus Botanicus te Amsterdam uit Wageningemateriaal. Het verschil is duidelijk te merken aan de sporen. *A. punctatus* heeft bruine sporen met hoge lijsten als stekels, terwijl *A. laevis* gelige sporen heeft die fijn gekorrelt zijn.

Het Achterveldse ven in Gelderland gaf een typische moeilijkheid. Aan een afgestoken heidekantje groeide vlak aangedrukt, een klein maar opvallend levermosje. Een in verhouding zeer dikke stengel met aan weerszijden vlezige blaadjes, rond omgebogen in een groot ventraal en een kleiner dorsaal. De toppen vormen rijkelijk gemmen, waardoor bij ouder worden de bladrand ingesneden wordt. Voor de gemmenvorming klontert het chlorophyl in een bal bijeen van de bladrandcellen.

Het plantje is heldergroen, heeft geen ventraalblaadjes en het bezit kleurloze rhizoiden. (Lijkt ons *Lophozia ineisa*, juiste determinatie niet mogelijk W.M.)
Loenen en omgeving is een rijke mossenstreek. Zo vond ik bij *Bartramia pomiformis*, *Scapania*

memorosa, Orthodicranum montanum (det. Agsteribbe) en Leptobryum pyriforme (det. Agst.) langs een bospaadje bij Loenen. De beek bij Roozendaal (Beekhuizen) was, vooral in de wattervalletjes dicht bezet met Platyhypnidium rusciforme (det. W.M.) en Fontinalis antipyretica. De diepe insnijdingen door de heuvelachtige bossen waren hier dicht bezet met Lepidozia reptans en Diplophyllum albicans, waartussen tot mijn vreugde een voor ons land nieuw levermosje groeide en wel LOPHOZIA FLOERKEI. De drietoppige blaadjes zijn onderliggend, dakpansgewijs vrij dicht op elkaar; cilien aanwezig 2 - 4 cel lang; bladcellen met duidelijke hoekverdikkingen en de stengel draagt duidelijke amphigastrien: tweetoppig met links en rechts extra punten. Wim Meijer kon de determinatie tenvolte bevestigen.

Op de terugweg vond ik bij de Loosdrechtse plassen op betonblokken langs het water nogal wat Cratoneuron filicinum (det. W.M.). Hiermee zijn enkele soorten genoemd die mij het meest getroffen hebben en die in een of andere hersenkronkel zijn blijven hangen.

J. Landwehr

Bijeenkomst Amsterdamse Werkgroep, 23 September in de Hortus Botanicus.

Aanwezig zeven man. Te veel vondsten en ervaringen om op een avond aan elkaar te laten zien of te vertellen.

Groenhuizen had materiaal uit de omgeving van Winterswijk bij zich. Hiervan werden bekeken Mnium punctatum, Nardia geoscyphus (met bladcellen aan de rand 20-35u, naar het midden 40u), Nardia Calypogeia Neesiana (met tongvormige blaadjes en weinig ingeschulpte amphigastrien, de derde vondst in ons land) en Dicranella secunda var. curvata met een klein vraagteken. Agsteribbe liet zien uit de Ardennen, verzameld in de omgeving van Malmedy op silicaatrotsen: Tritomaria quinqueidentata, Schistostega osmundacea c.spor. Andraea petrophila en -Rothii e.a.

Landwehr kwam met prachtig materiaal van Riccia crystallina uit een leemput langs de Waal bij Druten aanzetten. Daar in het land van Maas en Waal verzamelde hij ook nog Anomodon viticulosus, Neckera complanata, Ulota Bruchii c.spor., en Rhacomitrium heterostichum (bij Nieuwvaal).

Jaap van Dijk toonde zijn door Wim Margadant gedetermineerde vondst van Camptothecium (=Tomenthypnum) nitens uit het Kloppersblok, een blauwgrasland terrein bij Weerselo (Twente). Zie elders in dit nummer.

Aan de overige vondsten kwamen we niet toe. Wel bekeken we nog met aandacht de mooie nieuwe tekeningen van den heer Landwehr.

W.M.