

Bijeenkomsten der Amsterd.Bryol.Werkgroep.

Op 17 Febr. '48 determineerden we o.a. *Bryum ventriosum* (Verbrande Pan Bergen N.H.), *Marsupella emarginata* (hei tussen Bussum en Hilversum) en *Blasia pusilla* van kalkterrein bij Crailloo afkomstig (leg.Hensen).

Margadant hield zich hoofdzakelijk met de *Mniae* bezig n.l. met *Mnidumspidatum*-affine en-rostratum (de echte) en toonde ons nog een kweek van *Mnium Seligeri*. Op 9 Maart '48 probeerden we onze krachten op materiaal, verzameld langs een greppelwand op het terrein van de Koninklijke Domeinen te Baarn (leg.Agsteribbe en Groenhuijzen). Hierbij was een levermos dat aanvankelijk voor een *Nardia* versleten werd. Uiteindelijk bleek echter na het bijkijken van veel literatuur dat we met *Odontoschisma denudatum* te doen hadden.

Agsteribbe was nog met Belgisch materiaal bezig en liet ons o.a. *Nardia compressa* zien. Uit een kleipolder bij Amsterdam kwam *Weisia controversa* te voorschijn (leg.Landwehr).

Op 6 April '48 determinaties van *Brachythecium velutinum* van het Ulvenhoutsebos, *Sphagnum subsecundum* s.l. en- *fimbriatum* uit een plasje aan duinvoet bij Groet bij Camperduin (leg.Hensen). *Lepidozia reptans* van Doorn (leg.Kesler), *Lophozia ventricosa* *Thuidium tamariscinum* en *Rhytidiadelphus triquetrus* van Kolland (leg.Zwillenberg) Op 28-4-48 werden voornamelijk de prachtige vondsten (plus tekeningen) uit Zuid-Limburg van Landwehr bekeken (zie Buxb. No.3/4 1948).

25-5-48. Op deze avond werden hoofdzakelijk de kritische soorten van onze Beerze-exo. aan een nader onderzoek onderworpen, o.a. *Campylium hispidulum* var. *Somme*. Echter ook nog materiaal van Meijer uit Wijster (D.f.7) in Drente, n.l. *Cladopodiella fluitans* en *Cephalozia connivens* (beide cum spor.). Van Landwehr nog andere Zuid-Limburgse mossen. Verder nog *Radula complanata* uit het Leuvenumsebos en *Campylium stellatum* van Kortenhoeve (leg.Hensen)

Op 15-6-48 *Cephalozia macrostachya* en-*connivens*, *Calypogeia Trichomanis* s.str., *Cladopodiella fluitans* van het Grote Veen Lheerzand Drente (leg.Meijer). Van de Beerze nog *Calypogeia arguta* (leg.Meijer). Uit het Wijster turfveen (Drente) *Scapania irrigua*; *Riccardia incurvata* van Petten N.H., eveneens leg. Meijer.

W. Reijnders kwam o.a. met *Ctenidium molluscum* van Oud-Valkenburg en Groenh. met *Rhytidiadelphus loreus* van het landgoed Groeneveld bij Baarn, afkomstig. Verder nog *Campylium polygamum*, *Leptodictyum trichopodium* var. *Kochii* van de Aandammerbrug (Br.in Waterl.) (leg.Groenhuijzen)

6 Juli 1948 was onze "Indonesische avond". Op deze avond probeerden we onze krachten op door Groenh.meegebrachte en hem door Mej.J.Challa (waarvoor onze dank) geschenken Javaanse mossen. Met behulp van Fleischer werden twee soorten gedetermineerd, waarbij vooral Agsteribbe en Margadant zich inspanden. Het waren *Campylopus Thwaitesii* (Mitt.) Par. en *Pogonatum Junghuhnianum* (Dz.et Mbk.) v.d.B. et Lac., afkomstig van de berg Poentjak bij Buitenzorg.

W. Meijer zocht ijverig de levermossen er uit en belooft deze te zullen determineren. (Het resultaat: *Calyptogeia arguta* Mont. et Nees, *Marchantia omarginata* Reinw. Bl. et W. ab E., *Mardia truncata* (Nees) Schffn., en *Riocardia platyolada* Schffn. - Red-Na een lange vakantie werd de eerste bijeenkomst weer gehouden op 5 Oct. '48. Aanwezig waren 9 leden. Allereerst werd een lijst van W. Meijer besproken van door hem gedetermineerde mossen van Lapland. Verder toonde hij nog enige Zwitserse mossen. n.l. *Meesa trichodes*, *Myurella tenerrima*, *Pterigynandrium filiforme* en *Catoscopium nigrum*. Ook nog een nieuwe soort voor Nederland n.l. *Pellia Neesiana*, gevonden in het Naardermeer en rijkelijk voorzien van perianthen en "manneltjes". *Agaster* kwam nog met enige Belgische mossen op de proppen, o.a. met *Cirriphyllum* Grass. en *Amblystegium varium*. Zwillenberg en Kesler waren nog met Naardermeermateriaal bezig t.w. *Thuidium tamariscinum*, *Calyptogeia Trichomanis*, *Plagiothecium undulatum* en *Dicranum Bonjeani*. Ook de andere leden probeerden hun krachten op het door hun verzamelde materiaal.

Alle bijeenkomsten werden steeds behoorlijk bezocht, terwijl enige nieuwe leden toegetreden zijn. Door de "ervaren en meer ervaren" bryologen werd zooveel mogelijk aan de "nieuwelingen" bij hun determinaties hulp verleend.

S.6.

Een mossenverzameling van een reis naar Petsamo Lapland.

Een mossenverzameling te determineren die gemaakt werd in het hoge Noorden in de nabijheid van de ertshaven Kirkenes in Finnmarken (Noorwegen) en de omgeving van Petsamo (Finl.Rusl.), op de Fjelden en de toendra's boomloze vlakten boven en benoorden de bosgrens, dat is voor een hollands bryoloog, die nog niet zo veel van over de grens heeft gezien, een groote genoeg. We hebben er dan ook geen gras over laten groeien toon Dr. Beyerinck, directeur van het Biologische Station te Wijster ons verzocht zo'n collectie (door hem gemaakt in Juli 1934) op naam te brengen. In onderstaande lijst zijn alleen de soorten opgenomen voor zover ze niet op het eerste gezicht op naam te brengen waren. Algemene die wel verzameld werden staan er daardoor niet in vermeld. Zij werden door ons al in Wijster gedetermineerd.

De lijst geeft een heel bescheiden indruk van de subarctische en arctische mosflora, vooral van de gesteentemossen zullen in het onderzochte gebied wel meer soorten voorkomen. *Sphagna* zijn er aardig in vertegenwoordigd. Enkele arctische *Bryum*-soorten, *Helodium*, *Paludella*, *Splachnum*, *Tetraplodon* en typische levermosjes doen elke hollands bryoloog watertanden. Om een denkbeeld te vormen hoe en waar de genoemde soorten groeien kunnen we van enkele gegevens uit "Aantekeningen over het Noorden van Fins Lapland" door Dr. W. Beyerinck, Tijdschr. Kon. Ned. Aardrijksk. Genootschap 1936, gebruik maken. We zien dan dat voornamelijk in de buurt van de sedert 1930 bestaande autoweg die vanuit het Z.W. naar de Petsamomond bij de Yssee verloopt, verzameld werd.