

VERSLAGEN en MEDEDELINGEN

Hoklijstjes voor mossen

Prof. Dr. R.v.d.Wijk, Botanisch Lab. te Groningen, afd. Planten-systeematiek, heeft gedrukte hoklijstjes beschikbaar voor Musci, Hepaticas en Lichenen.

Formaat I.V.O.N., vrije linker pagina voor aantekeningen, prijs F.l.-- de 40 stuks.

Van de Redacteur:

Op alle soorten van bryologische copy wordt prijs gesteld. Willen de auteurs echter alleen artikelen inleveren die duidelijk getypt zijn aan één zijde van het papier?

In ruil ontvangen voor de bibliotheek:

Een rijke collectie van overdrukken van Dr. A.W.Evans (New Haven) waaronder zich vele publicaties bevinden over Noord-amerikaanse mossen die ook in Europa voorkomen o.a. in de series "Studies among our common Hepaticas", Notes on New England Hepaticas, Aparte studies over bepaalde geslachten (o.a. Radula, Scapania en Riccia) en het belangrijke artikel "The classification of the Hepaticas" in Bot.Review 5(1939) en andere.

Uitlening geschiedt door de bibliothecaris, S.Groenhuyzen.

VERSLAG VAN BIJEENKOMSTEN DER AMSTERDAMSE BRYOLOGISCHE WERKGROEP.

Op 26 October, 16 November en 7 December 1948 en op 18 Januari, 8 Februari, 1 Maart en 22 Maart 1949.

Zoals gewoonlijk werden ook op deze avonden weer diverse soorten gedetermineerd en critische soorten gezamenlijk gecontroleerd.

Op de eerste avond begon Agsteribbe met een uitdeling van overvloedig kapselsdragende Leucobryum glaucum, afkomstig uit het Leuvenumsebos. Wim Meijer toonde ons materiaal uit

Fins Lapland nl. *Paludella squarrosa*, *Splachnum vasculosum*, *Androsace petrophylla* en *Racomitrium heterostichum* var. *obtusum*, waarvan de laatste twee soorten door *Agsteribbe* gecontroleerd werden. Ook *Moerckia blyttii* en *Leiocolea bantryensis* (= *Lophozia hornschurchiana*) (leg. en det. W. Meijer) uit Zwitserland en *Cololejeunea rossettiana* uit het Belgische Nationale Park (Furfooz) (leg. en det. E. Agsteribbe) kregen we te zien.

Kok determineerde een van Voorne afkomstige *Drepanocladus aduncus*. Op de twee volgende avonden werden met uitzondering van *Distichium inclinatum* die op de Weissfluh, "Ob Wolfgang" bij Davos in Zwitserland op 2700 m. voorkwam (leg. en det. W. Meijer), onze krachten hoofdzakelijk besteed aan materiaal dat we op onze Texelse excursie verzameld hadden, Gedetermineerd werden de volgende soorten:

Lophozia bicrenata en - *ventricosa*, *Calypogeia trichomanis*, *Thuidium tamariscinum*, *Bryum pendulovatum* (= *B. pendulum*), *Cephalozia bicuspidata*, *Campylium stellatum*, *Drepanocladus aduncus*, *Dicranella cerviculata*, *Sphagnum plumulosum* en - *palustre*, *Pallavicinia lyellii*, *Mnium affine* s.l., *Mnium hornum*, *Calliergon cordifolium*, *Eurhynchium Stokesii*, *Lophocolea heterophylla*, *Campylopus flexuosus* en - *fragilis*, *Fissidens adianthoides* (c. spor.) *Leptobryum pyriforme* (c. gemmae).

Deze soorten kwamen voor een groot deel in de Muy voor. Een juiste opgave van de vindplaatsen vindt men in het Texelverslag.

Op 18 Januari '49 zorgde Landwehr voor een interessante afwisseling. Hij bracht nl. stukken sub-fossiel veen mee, dat hij op een diepte van 5.20 m. - A.P. aantrof in een vijver, die in het Hespark te Amstelveen gegraven werd. IJverig werden er door ons stukjes vanaf "gepukt", preparaten gemaakt en de navolgende soorten gedetermineerd: t.w. *Sphagnum imbricatum*, *Tomenthyphum nitens*, *Thuidium blandowii*, en *Calliergon giganteum*. Kesler had nog mooie pollstjes *Rhodobryum roseum* bij zich dat hij op 29 Dec. '48 op de noordhelling van een dijk langs de IJssel bij Deventer verzameld had. Op 8 Febr. materiaal van de Aandammerbrug o.a. *Leptodictyum trichopodium* var. *Kochii*, *Cirriphyllum piliferum*, *Campylium polygamum*, *Sphagnum subsecundum* s.l. en *Sph. fimbriatum* (leg. en det. S. Groenh.) *Agsteribbe* en Meijer

hielden zich voornamelijk bezig met *Hepaticas* en *Sphagna* die afkomstig waren van de omgeving van Kotten (leg. C. Booy). De 1ste Maart liet Meijer *Orthodicranum montanum* zien van een nieuwe vindplaats nl. 't Baarnsebos bij station Baarn, waar het aan de voet van een boom groeide. Ook bij het Fluismeer had hij interessante soorten verzameld. Allereerst liet hij ons hiervan *Odontoschisma denudatum* zien. *Agsteribbe* determineerde uit het Fluismeer materiaal natuurlijk alles wat op *Campylopus* leek. (*Campylopus flexuosus* en *pyriformis* kwamen er uit te voorschijn). Verder werd onze aandacht nog gevestigd op door Roskam verzameld materiaal uit België o.a. op *Racomitrium fasciculare* (bos bij Stèr) en *Leptoscyphus Taylori* (Hogne bij Hockay).

Op 22 Maart '49 wederom krachten besteed aan Zwitsers materiaal (leg. W. Meijer) o.a. *Sphagnum Girgensohnii* (veentje bij Schwagerloch) en *Campylium halleri* (Prastigau, ob Klosters, Graubünden). Vooral interessant was een vondst van Hargen (N.H.) (leg. W. Meijer) nl. *Lophozia Mildeana*. Hiervan was ook reeds materiaal verzameld op 25.7.41 en wel bij de zandafgraverij. Het werd door Dr. H. Persson als zodanig gedetermineerd.

Bij het nazien van ander materiaal dat eveneens van Hargen afkomstig was, echter bij een veentje op 2.8.40 verzameld was, ontdekten Agtsreibbe en Meijer nog meer *Lophozia Mildeana*. Verder nog wat materiaal van de Geul van Tenel bekeken o.a. *Dicranum scoparium* en *Polytrichum commune*; determinaties van *Barbula unguiculata* van het Amsterdamse bos (leg. Mej. Dr. Timmer) en door Vergouw *Tortula subulata* (Vossen del. A.W.D.), *Hypnum cupr. var. resupinatum*, *Homalothecium sericeum* en *Amblystegium serpens* van Vogelenzang.

RECTIFICATIE Door een technische fout is S. Groenhuyzen. in het vorige nummer (Bunb. Vol. III, p. 14) de naam weggevallen van de auteur van het artikel: "Een bryologische excursie in de omgeving van Halfweg". Dat is Drs. W. Vergouw.