hielden zich voornamelijk bezig met Hepaticas en Sphagna die afkomstig waren van de omgeving van Kotten (leg.C.Booy).
De 1ste Maart liet Meijer Orthodicranum montanum zien van een nieuwe vindplaats nl. 't Baarnsebos bij station Baarn,waar het aan de voet van een boom groeide. Ook bij het Pluismeer had hij interessante soorten verzameld.Allereerst liet hij ons hiervan Odontoschisma denudatum zien.Agsteribbe determineerde uit het Pluismeer materiaal natuurlijk alles wat op Campylopus leek.(Campylopus flexuosus en pyriformis kwamen er uit te voorschijn). Verder werd onze aandacht nog gevestigd op door Roskam verzameld materiaal uit Belgie o.a. op Racomitrium fasciculare (bos bij Stèr) en Leptoscyphus Taylori (Hogne bij Hockay).
Op 22 Maart '49 wederom krachten besteed aan Zwitsers materiaal (leg.W.Meijer) o.a. Sphagnum Girgensohnii (veentje bij Schwagerloch) en Campylium halleri (Praetigau, ob Klosters, Graubünden). Vooral interessant was één vondst van Hargen (N.H.) (leg.W.Meijer) nl. Lophozia Mildeana. Hiervan was ook reeds materiaal verzameld op 25.7.41 en wel bij de zandafgraverij. Het werd door Dr. H.Persson als zodanig gedetermineerd.
Bij het nazien van ander materiaal dat eveneens van Hargen afkomstig was, echter bij een veentje op 2.8.40 verzameld was, ontdekten Agtsreibbe en Meijer nog meer Lophozia Mildeana. Verder nog wat materiaal van de Geul van Texel bekeken o.a. Dicranum scoparium en Polytrichum commune; determinaties van Barbula unguiculata van het Amsterdamse bos (leg.Mej.Dr.Timmer) en door Vergouw Tortula subulata (Vossen del. A.W.D.), Hypnum cupr.var.resupinatum, Homalothecium sericeum en Amblystegium serpens van Vogelenzang.

RECTIFICATIE Door een technische fout is S. Groenhuyzen. in het vorige nummer (Bumb.Vol.III,p.14) de naam weggevallen van de auteur van het artikel: "Een bryologische excursie in de omgeving van Halfweg". Dat is Drs. W.Vergouw.