

genus is ook naar een soort van deze sectie (*Rh. aurescens*) opgesteld, - Fleischer dient dan echter als auteur genoemd te worden, want Bescherelle heeft het stellig niet als zodanig bedoeld-, de sectie *Microcalpe* is m.i. echter verkeerd in dit genus gebracht. Vooral wanneer men ziet hoe groot de variabiliteit binnen het genus *Sematophyllum* en binnen een soort van dit genus (zie als voorbeeld hiervan vooral Dixon in *Journ. of Bot.* LVIII, 1920, p. 81) kan zijn, dan komt men tot de overtuiging dat de sectie *Microcalpe* beter op zijn plaats is onder het geslacht *Sematophyllum*. Wij sluiten ons daarom aan bij Mitten en noemen het mos in kwestie *Sematophyllum subsimplex* (Hedw.) Mitt.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

VERSLAGEN EN MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

1. Data van komende excursies

De aandacht wordt gevestigd op de data voor de twee eerstkomende excursies, zoals deze tijdens onze vergaderingen afgesproken werden: Najaarsexcursie 1950: 30 Sept. en 1 Oct. (Nijmegen). Voorjaarsexcursie 1951: 28, 29 en 30 April (Maas-
tricht). Men kan hiernee dus reeds thans rekening houden.

2. Exsiccaten van algemene Nederlandse mossen. In Putten is afgesproken dat J. Sixma, Koopmansgracht 19, Sneek, postgiro no. 407906, de verzorging van de lang-besproken exsiccaten van een 50-tal algemene mossoorten ter hand zal nemen. Wie zich in de algemene blad- en levermossen nog niet geheel zeker voelt, zal een belangrijke steun aan zo'n serie hebben. De kosten zijn begroot op F.1.--. Wie prijs stelt op toezending van zo'n serie direct bij verschijnen in de herfst, wordt verzocht, dit bedrag te gireren op bovengenoemde girorekening.

3. Nieuwe rubriek. Behalve de grote artikelen, zoals die tot nu toe verschenen zijn, worden onze kolommen opengesteld voor de vermelding van waarnemingen, die om de een of andere reden de moeite waard zijn om vastgelegd te worden, terwijl er toch geen groot artikel aan gewijd hoeft te worden. Als voorbeeld noemen we het voorkomen van soorten, die in het diluviale deel van ons land wel algemeen zijn, in de duinen, waar ze nog maar van zeer weinig plaatsen bekend zijn, zoals *Racomitrium lanuginosum* en *Plagiothecium undulatum*. Een ander voorbeeld is het voorkomen van kapsels van een soort, waarbij ze in ons land zeldzaam zijn, of het vinden van een bepaalde soort op een zeer afwijkende standplaats, b.v. *Dicranoweisia*