

doende hoeveelheid zouden verzamelen en droog, gedetermineerd en zonder andere soorten aan Sixma zullen sturen. In Natura zal een oproep geplaatst worden, met het verzoek, het grote bedrag van F. 1. -- als bestelling aan hem te gireren. Daardoor wordt bekend, hoe groot het aantal klaar te maken series minstens zal zijn.

Tijdens de rondvraag kwam nog ter sprake of een zomerkampje van de Werkgroep dit jaar nog zin heeft. De mening hierover is negatief; er zal deze zomer dus geen speciaal kampje georganiseerd worden. Verder werd nog even van gedachten gewisseld over het opnemen van korte notities in Buxbaumia, waarin leden, die zich nog niet ver genoeg gevorderd voelen om een groot artikel te schrijven, toch waarschuwingen, die om de een of andere reden belangrijk zijn, vast kunnen leggen. De vergadering werd beëindigd door sluiting door de voorzitter.

De secretaris,
W.D.Margadant.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

BRYOLOGISCH ALFERNET

Haplomitrium Hookeri indigeen?

Dr. A.J.M.Garjeanne te Den Bosch vestigt de aandacht op de mogelijkheid dat bovengenoemd beroemd Levermos in ons land nog voor zou kunnen komen. Hij verzamelde het indertijd op de Gronings-Duitse grens op een klei-landje. Men zoekt vooral op vochtige plekjes met Pohlia annotina, Blasia en Riccardia (opgave in K.Müller. Die Lohmoose Deutschlands), dat zijn dus de bij ons als Miezepieter-vegetaties bekendstaande begroeiingen, officieel door de Frans-Zwitserse School in de Plantensociologie tot het Nanocyperion te rekenen (zie Diemont, Sissingh en Westhoff, in N.K.A. dl.50, 1945, p. 215-284).

Voorproefjes van de Duivelsberg

Het nieuwe gebied blijkt bij goed zoeken voor mossen wel interessant te zijn. Het bevat o.a. rijke groeiplaatsen van Orthocaulis gracilis, na de nieuwe vondst van Mevrouw E.Nannenga-Bremekamp in het Heelsumse beekdal de derde groeiplaats in ons land. De goede plekjes van v.d. Sande Lacoste c.s. bij Beek uit de vorige eeuw schijnen verdwenen te zijn.

Op de voorjaarsfloristendag

werd op bryologisch gebied bekendheid gegeven aan het

Isoetes macrospora en *Dicranum strictum* in Nederland (leg. W.D. Margadant en Mevrouw E. Nannenga-Bremekamp) en de ontdekking van nieuwe groeiplaatsen van de montane levermossen *Sphanolobus minutus*, *Bazzania trilobata* en de bovenvermelde *Orthocaulis gracilis* door laatstgenoemde.

Tevens werd de vondst van *Calliergon megalophyllum* (leg. W.M.) uit het Belversven gedemonstreerd.

Hoogveenlevermosjes in Noord-Holland benoorden het IJ

Op een excursie met R.J. de Wit werd op aanwijzing van Dr. P. Vermeulen bij Akersloot een veentje aangetroffen aan de rand van een weiland, een paar honderd vierkante meter groot, dat naast *Calluna*, *Erica tetralix*, *Empetrum nigrum* en *Vaccinium macrocarpum* een interessante levermosoogst opleverde:

nl. *Lophozia incisa*, *Riccardia latifrons*, *Cephalozia macrostachya* en *Odontoschisma sphagni*, allemaal soorten die in West-Nederland als zeldzaam beschouwd moeten worden, in hoogveentjes in het Oosten en Zuiden van ons land echter algemener zijn, hoewel we *Cephalozia macrostachya* en de typisch acidophile *Riccardia*-soort daar ook nog maar van weinig plaatsen kennen. De laatste werd ook nog in het "Heitje" bij Katham in Waterland aangetroffen.

W.M.

BOEKBESPREKING

Burck, O.- Die Laubmoose Mitteleuropas (Abhandl. Senckenb. Naturf. Ges. abb. 477) 1947. prijs F. 19.60.

Dit boek van 198 pagina's (groot 21 x 30 cm) is in 2 kolommen op slecht papier gedrukt. Er zijn 57 afbeeldingen in de tekst, die een groot aantal bladontrekken en detailtekeningen geven; verder nog 9 platen met photo's van bladen en blad- en stengeldoorsneden (de plaatnummering is fout: 1 moet 5 zijn en omgekeerd; 4 en 8 dito.) Op de photo's van de bladen komt het celnet slechts zelden tot zijn recht.

In de 4 pagina's lange inleiding worden de gebruikte termen, gedeeltelijk aan de hand van tekeningen verklaard, en een beschrijving gegeven van een techniek om van kleine mosjes bladdoorsneden te maken. Achterin is, behalve het register, ook een lijst van auteursnamen met afkorting opgenomen. Er is een determinatietabel voor kapseldragende mossen; maar speciaal is de aandacht besteed aan die voor de gametophyt; hierin worden op het laatst in vele gevallen, ook anatomische kenmerken opgenomen