Riccardia pinguis	BM
" sinuata	BM
Scapania curta	WP (E.N.)
" irrigua	JV1, WV1, GV1

Nov.ind. = nieuw voor Nederland
Indien een soort maar door één vinder gerapporteerd wordt, staat haar, resp. zijn naam er achter.

+
+ +

MOSVONDSTEN IN NEDERLAND II 1)

Nieuwe mossen voor de Nederlandse flora

Musci

Calliergon megalophyllum Mikut., Belversven N.Br., April 1948, leg. W.Meijer, det. R.Tuomikoski.
Dicranum fuscescens Turn. var. falcifolium Braithw., Speulderbos Gelderl. N 5-17-24, April 1950, leg. Bryol.Werkgroep, det. W.Meijer.
Dicranum strictum Schleicher, Renkumsebeek Geld., voorjaar 1950, leg. en det. E.Nannenga-Bremekamp en W.D. Margadant.
Neckera pumila Hedw. var. philippeana (Br.& Sch.) Milde, bij Solse Gat, Putten Geld. N 5-17-21, April 1950, leg. Bryol. Werkgroep, det. E.Agsteribbe.
Plagiothecium depressum Dix., Schone Grub Zd Limburg, April 1951, leg. Bryol.Werkgroep, det. E.Nannenga-Bremekamp
Trichostomum crispulum Bruch., Bemelerberg Zd Limburg, leg. Bryol. Werkgroep, det. E.Agsteribbe en W.Meijer; Savelsbos Zd Limburg, leg. Bryol Werkgroep, det. E.Agsteribbe en E.Nannenga-Bremekamp (allen April 1951).

Hepaticae

Blepharostoma trichophyllum (L.) Dum. Komt als inlandse soort te vervallen. Alle exemplaren aanwezig in het Rijksherbarium te Leiden zowel als in het herb. van de Kon.Ned.Bot.Verg. te Leiden bleken Lepidozia setacea te zijn (W. Meijer).
Lophozia porphyroleuca (Nees)Schiffn. [L.ventricosa (Dicks.) Dum. var. porphyroleuca (Nees)Limpr.] Mosbeek bij Vasse, Twente, Sept. 1951, leg. Bryol.Werkgroep, det. E.Agsteribbe en S. Groenhuijzen, teste W.Meijer
Lophozia silvicola Buch, Beerze Natuurmon. N.Br., voorjaar 1948,

leg. en det. W.Meijer, teste Dr Hans Buch.
Riccia beyrichiana Hampe, zie N.K.A. 58 blz.130, 1951
Riccia huebeneriana Lindenb., " " 58 " 135, "
Riccia rhenana Lorb. ex K.M., " " 58 " 134, "
Riccia subbifurca Warnst. ex. Groz., " " 58 " 126, "
Riccia warnstorfii Limpr., Zuid Limburg, April 1951, leg. Bryol. Werkgroep, det. W.Meijer.

-

Merkwaardige vondsten van inlandse mossen II 2)

Musci

Barbula revoluta (Schrad.) Brid., zie verslag Limburgexc. Buxbaumia 6e jrg. no 1/2 1952.
Campylopus subulatus Schimp., idem.
Didymodon rigidulus Hedw., idem.
Didymodon trifarius Hüb., Stadionterrein in Amsterdam, leg. en det. W.Meijer 1950 en bovendien in Zd Limburg, zie Buxbaumia 6e jrg. 1952, no 1/2.
Eucladium verticillatum (L.) Br.& Sch., zie verslag Zd Limburgexcursie Buxbaumia 6e jrg., no 1/2.
Hymenostomum microstomum (Hedw.) R.Br., idem.
Mnium cinclidioides (Blytt.) Hüb., Malpieven N.Br., 1950, leg. en det. W.Meijer, teste W.D. Margadant.
Orthodicranum flagellare (Hedw.) Loeske, zie verslag van Puttenexc. Buxbaumia 5e jrg. 1951, no 3/4.
Orthodontium lineare Schw., zie diss. W.Meijer: "The Genus Orthodontium", blz. 27, 1951.
Tortula marginata (Br.& Sch.) Spr., zie verslag van Limburgexc., Buxbaumia 6e jrg. 1952, no 1/2.

Hepaticae

Bazzania trilobata (L.) Gray, Heelsumsebeek Geld., 22-2-1950, leg. en det. E. Nannenga-Bremekamp.
Calypogeia arguta Mont. et Nees., Beerze Natuurmonument, N.Br., voorjaar 1948, leg. en det. W.Meijer; zie verder verslag van Puttenexc., Buxbaumia 5e jrg. 1951, no 3/4 en verslag van Limburgexcursie, Buxbaumia 6e jrg. 1952, no 1/2.
Calypogeia Meylanii Buch, Lennisheuvel, N.Br. R 5-12-44, voorjaar 1948, leg. en det. W.Meijer, teste Dr H.Buch.
Fossombronia dumortieri (H.& G.) Lindb., Beerze Natuurmon., N.Br., voorjaar 1948, leg. en det. W.Meijer
Lophozia incisa (Schr.) Dum., Die bij Limmen, N.Holl., 1950, leg.

en det. W.Meijer; veentje bij Akersloot, N.Holl., 1950, leg. en det. W.Meijer.

Lophozia mildeana (Got.) Schiffn., zandgraverij Hargen bij Schoorl, N.Holl., 1951, leg. W.Meijer, det. Dr H.Persson (vindplaats nu verdwenen).

Orthocaulis attenuatus (Mont.) Ev., Heelsumsebeek Geld., Febr. 1950, leg. en det. E.Nannenga-Bremekamp; zie verder verslag Duivelsbergexc., Buxbaumia, 5e jrg. 1951, no 1/2.

Orthocaulis kunzeanus (Hüb.) Buch, zie verslag Dwingeloexc., "Buxbaumia" 4e jrg. 1950, no 2/3. Verder Fochteloërveen Friesland, 1951, leg. en det. D.Giessen en C.Muller, teste W.Meijer en een vindplaats in Nunspeet Geld., 1951, leg. en det. W.Meijer.

Plectocolea hyalina (Lyell) Mitt., zie verslag van Limburgexc., Buxbaumia 6e jrg. 1952, no 1/2.

Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb., Nieuwkoopseplassen, Z.Holl., 1950, leg. en det. W.Meijer; hei bij Katham, N.Holl., 1950, leg. en det. W.Meijer; zandgraverij Hargen bij Schoorl, N.Holl., 1951, leg. en det. W.Meijer; Hol bij Kortenhoef, N.Holl., 1951, leg. en det. W.Meijer.

Sphenolobus minutus (Crant.) Steph., Heelsumsebeek, Geld., Febr. 1950, leg. en det. E. Nannenga-Bremekamp.

-

1) Vervolg van "Nieuwe mossen voor de Nederlandse flora", N.K.A. 57, pag.282, 1950.
2) Vervolg van "Merkwaardige vondsten van Inlandse mossen", N.K.A. 57, pag.307, 1950.

-

Summary:

A list is given of recently discovered species, new for the Netherlands. Blepharostoma trichophyllum should be deleted from the list of indigenous species. A list is also appended of some recently found rare mosses.

E.A.

+ +
+