

LICHENES door Dr R.A. Maas Geesteranus

Opmerkingen

PYRENOCARPEAEPyrenulaceae

- | | | | |
|---|-----------------------------------|----|--|
| x | Arthopyrenia gemmata (Ach.) Mass. | BM | Op overhellende Ulmus-stam in bos, schaduw |
|---|-----------------------------------|----|--|

GYMNOCARPEAEArthoniaceae

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|-----------------------|
| x | Arthonia radiata (Pers.) Ach. | V | Op tak Sambucus nigra |
|---|-------------------------------|---|-----------------------|

Graphidaceae

- | | | | |
|---|----------------------------|----|---------------------------------|
| x | Opegrapha atra Pers. | V | op tak Sambucus nigra |
| | " " | W | aan stambasis Salix, hakhoutbos |
| x | " betulina Sm. | W | aan stambasis Salix, hakhoutbos |
| x | " cinerea Chev. | BM | op Ulmusstam in bos, schaduw |
| x | " subsiderella (Nyl.) Arn. | W | aan stambasis Salix, hakhoutbos |

Collemaaceae

- | | | | |
|---|---|---|--|
| x | Collema tenax (Sw.) Ach.em.Degel.
var.tenax (det. Dr G.Degelius) | B | vochtig, open zand in duinpan achter zeereep |
|---|---|---|--|

Peltigeraceae

- | | | | |
|---|------------------------------|----------|--|
| x | Peltigera canina (L.) Willd. | B | bemoste duinhelling, |
| | " " | BM | tussen Hippophaë |
| x | " " var.rufescens (Weis) | Mudd. BM | bemoste duinhelling |
| x | " polydactyla (Neck.) Hoffm. | BM | bemoste duinhelling |
| x | " " | W | op bemoste Salix stam |
| x | " scabrosa Th.Fr. | B | <u>nieuw voor de flora;</u>
vochtig open zand in duinpan achter zeereep |
| x | " "subcanina" Gyel. | BM | bemoste humeuze zandgrond in gemengd loofbos |

Lecideaceae

- | | | | |
|---|---------------------------------|----|-------------------------|
| x | Lecidea olivacea (Hoffm.) Mass. | BM | op Populus in Duinbosje |
| x | " " | V | op Sambucus nigra |

<i>Lecidea olivacea</i>	S	stambasis <i>Salix spec.</i>
" "	BM	
x <i>Bacidia muscorum</i> (Sw.) Mudd.	BM	op dode mossen in open duin
" " <i>subacerina</i> (Nyl.) Vain.	B	op dode twijgen
subsp. <i>laurocerasi</i> (Del.) Vain.		<i>salix repens</i>
Idem	W.	op <i>Salix spec.</i> , hakh.bos
x <i>Toninia coeruleonigricans</i> (Lightf.) Th.Fr.	B	vochtig open zand in duinvallei achter zeereep
<u>Cladoniaceae</u>		
x <i>Cladonia pyxidata</i> (L.) Fr.	B	bemoste duinhelling
var. <i>chlorophaea</i> Flk.		
x <i>Cladonia pyxidata</i> var. <i>pocillum</i> (Ach.) Flot.	BM	bemoste duinhelling
x <i>Cladonia pyxidata</i> var. <i>pocillum</i>	B	open, vochtig zand in duinvallei acht. zeereep
" " <i>rangiformis</i> Hoffm.	BM	bemoste duinhelling
x " "	B	duinhelling tussen <i>Hippophaë</i> en <i>Salix</i> <i>repens</i>
<u>Pertusariaceae</u>		
<i>Pertusaria amara</i> (Ach.) Nyl.	BM	
x " <i>pertusa</i> (L.) Tuck.	BM	op <i>Quercus</i> -stam in boslaan
<u>Lecanoraceae</u>		
<i>Candelariella vitellina</i> (Ehr.) Müll. Arg. V, W		op <i>Quercus</i> (W)
x <i>Lecania cyrtella</i> (Ach.) Th.Fr.	S	op stam van <i>Populus</i>
<i>Lecanora expallens</i> Ach.	BM, DW	op <i>Ulmus</i> (BM)
x " <i>div. spp.</i>		voorlopig niet gedet.
x <i>Phlyctis argena</i> (Ach.) Flot.	BM	op <i>Populus</i> in bos
<u>Parmeliaceae</u>		
x <i>Candelaria concolor</i> (Dicks.) Stein.	BM	<u>nieuw voor de flora</u>
f. <i>citrina</i> (Krempelh.) Dt. & Sarnth. (det. Dr A.H. Magnusson)		op <i>Ulmus</i> in laan
x <i>Parmelia acetabulum</i> (Neck.) Duby	V	op <i>Sambucus nigra</i>
" "	DW	
x " "	BM	op <i>Ulmus</i> in laan
x " <i>caperata</i> (L.) Ach. (± var. <i>cyllisphora</i> Ach.)	BM	op <i>Populus</i> in bos
<i>Parmelia dubia</i> (Wulf) Schaer	DW, W	op <i>Quercus</i> (W)
" <i>physodes</i> (L.) Ach.	BM	op <i>Quercus</i>

	<i>Parmelia physodes</i> var. <i>labrosa</i> Ach.	W	op <i>Quercus</i>
	" <i>revoluta</i> Flk.	BM	op <i>Quercus</i>
	" <i>subaurifera</i> Nyl.	BM, V, W	op <i>Quercus</i>
x	" " ($\pm$ <i>f. fuliginoides</i> B. de Led.)	BM	op <i>Crataegus monogyna</i>
	" <i>sulcata</i> Tayl.	BM	op <i>Quercus</i>
x	" " <i>f. prolifera</i> Erichs.	BM	op <i>Ulmus</i> in laan
	" <i>trichotera</i> Hul.	BM, W	op <i>Quercus</i>
	" <i>tubulosa</i> (Schaer.) Bitt.	W	op <i>Quercus</i>

Usneaceae

	<i>Evernia prunastri</i> (L.) Ach.	BM, W	op <i>Quercus</i>
x	<i>Ramalina farinacea</i> (L.) Ach.	W	op <i>Quercus</i>
	" "	BM, V	op <i>Quercus</i> (BM)
	" <i>fastigiata</i> (Liljebl.) Ach.	W	op <i>Quercus</i>
	<i>Usnea spec.</i>	W	op <i>Quercus</i>

Teloschistaceae

	<i>Xanthoria parietina</i> (L.) Th. Fr.	BM, V	
x	" <i>polycarpa</i> (Ehrh.) Rieber	V	op dode twijgen <i>Sambucus nigra</i>

Buelliaaceae

x	<i>Buellia canescens</i> (Dicks.) De Not.	BM	op <i>Ulmus</i> -stam in bos, schaduw
x	" <i>griseovirens</i> (Turn. & Borr.) Almb.	BM	op <i>Populus</i> -stam, duinbosje
x	" <i>punctiformis</i> (Hoffm.) Mass.	W	op <i>Salix spec.</i> in hakhoutbosje
	" "	BM, V	op <i>Ulmus</i>

Physciaceae

x	<i>Physcia adscendens</i> (Th. Fr.) Oliv.	V	op takken <i>Sambucus</i> <i>nigra</i>
x	" <i>orbicularis</i> (Neck.) Pötsch	V	op <i>Sambucus nigra</i>
	" <i>f. hueana</i> (Harm.) Erichs.		
	<i>Idem</i>	BM	op <i>Ulmus</i>

N.B. Van de met x gemerkte soorten is het materiaal bewaard gebleven.