

Ges. 41 (1933): 348-350.

2. Die Geschlechterverteilung bei einigen Splachnaceen.

Ber. D. Bot. Ges. 57 (1939): 486-494.

In *Blumea* verschijnt binnenkort een kleine bijdrage van zijn hand over enkele nummers der bovengenoemde Carr-collectie.

Arens was een stille werker, die onze kennis van de bladmos-
sen van het Maleise gebied, speciaal van Sumatra, sterk vermeer-
derd heeft, hoewel dit jammer genoeg nog niet in publicaties is
vastgelegd. Maar bij de bewerking van de mossengeslachten voor de
Flora Malesiana zal steeds weer blijken, hoeveel waardevolle ge-
gevens Arens bijeengebracht heeft.

R. van der Wijk

KORTE BERICHTEN

Soortenrijkdom van onze excursies

Ter vergelijking volgen hieronder de aantallen soorten Bryo-
phyten, gevonden op alle 16 tot nu toe gehouden weekends. Al zegt
zo'n getal ook niet alles, toch is deze vergelijking wel aardig.
Bij Wageningen bedenke men dat hier in het totaal ook soorten ver-
werkt zijn die er op voorafgaande excursies door de Wageningers
zijn gevonden, zodat het getal geflatteerd is.

In volgorde van soortenrijkdom: (v = voorjaar, n = najaar)
Maastricht (v.1951) 160, Putten (v.1950) 155, Boxtel (v.1948) 140,
Wageningen (n.1946) 127, Groningen (n.1952) 120, Bergen (v.1954)
120, Bergeijk (v.1952) 113, Texel (n.1948) 110, Voorne (v.1953)
107, Velp (n.1953) 104, Ootmarsum (n.1951) 104, Nijmegen (n.1950)
101, Montferland (n.1947) 91, Dwingelo (v.1949) 82, Vogelenzang
(v.1947) 69, Zwollerkerspel (n.1949) 67.

J.J. Barkman

Corrigenda. Excursie naar de Zuidoostelijke Veluwezoom

In dit verslag (zie "Buxbaumia" 8e jrg., no 1/2) zijn enige
storende fouten geslopen. In de soortenlijst staat Tortula rura-
lis; dit moet zijn: Tortula muralis. Dan wordt nog vermeld
Neckera complanata var. philippeana. Dit moet echter Neckera
pumila var. philippeana zijn (in de tekst wel zonder fout).

E.A.