

LIJST

VAN DE IN NEDERLAND VOORKOMENDE

BRYOPHYTA

In de eerste jaargang van *Buxbaumia* (1947) is een voorlopige lijst van de inheemse blad- en levermossen opgenomen, gebaseerd op literatuuronderzoek. De verwachting werd toen uitgesproken, dat het aantal namen, dat in de toekomst nog veranderd zou moeten worden, wel niet zo groot zou zijn. Die verwachting is ijdel gebleken. In de eerste plaats was het literatuuronderzoek niet voldoende geweest. Bij de bewerking van de *Index Muscorum* werd het spoedig duidelijk, dat nog veel bladmossen werden aangegeven met namen, die in strijd waren met de geldende nomenclatuurregels. In de tweede plaats zijn na 1947 enkele van die regels gewijzigd, waardoor naamsveranderingen noodzakelijk werden. Zo is de verschijningsdatum van het werk van Hedwig, *Species Muscorum*, dat als uitgangspunt dienst doet voor de nomenclatuur der Bladmossen om praktische redenen vastgesteld op 1 januari 1801 in plaats van op 31 december 1801, zoals eerst was aangenomen. Daardoor werden de namen uit de bryologische werken, verschenen gedurende het jaar 1801 wel geldig, terwijl ze dat te voren niet waren. De lijst van 1947 is ook onvolledig geworden, doordat er na die tijd in ons land een aantal nieuwe mossen zijn gevonden. Dat is vooral het werk van onze Bryologische werkgroep of van enkele harer leden.

Wat de Levermossen betreft, verscheen er in 1954 in de *Acta Botanica Neerlandica* een determineertabel van de geslachten met een opsomming van de inheemse soorten, alles van de hand van W. Meyer. Deze lijst is vrij volledig, omdat ze aangevuld was met de nieuwe soorten. In de navolgende lijst is hiervan een dankbaar gebruik gemaakt.

In 1959 verscheen de herdruk van de Mossentabel van de N.J.N., bewerkt door Margadant. Dit is in wezen een geheel nieuwe uitgave geworden, ook al omdat hierin alle mossen van Nederland zijn opgenomen. Het is voor de namen der Bladmossen van deze tabel jammer dat op het ogenblik van het verschijnen het werk aan de *Index Muscorum* nog niet was afgelopen.

Daardoor zijn er later nog weer naamsveranderingen noodzakelijk geworden. Nu echter is het voorlopige manuscript van de Index klaar. Daarom heeft de redactie van BUXBAUMIA mij gevraagd een nieuwe lijst samen te stellen, vooral ook omdat de lijst van 1947 niet meer beschikbaar is voor de vele nieuwe leden, die onze werkgroep er in de loop der jaren heeft bijgekregen.

De nu gepubliceerde lijst bevat de namen van alle in Nederland voorkomende soorten, ook van die waarvan men niet weet of ze tegenwoordig nog wel in ons land groeien. Het vinden van een nieuwe soort geeft zekerheid, maar het is uiterst moeilijk, feitelijk onmogelijk om met zekerheid vast te stellen, dat een vroeger gevonden soort niet meer in ons land voorkomt.

In de lijst zijn die namen voor een soort vermeld, die in de Index als de meest gangbare zijn opgenomen op grond van de inzichten van die onderzoekers, die zich met een bepaalde groep hebben bezig gehouden. Daarnaast zijn af en toe synoniemen opgenomen. In de eerste plaats zijn dat namen, die vroeger als wettig werden opgevat, maar tegenwoordig op grond van de bestaande regels verworpen moeten worden. In de tweede plaats zijn er taxonomische synoniemen, die wel wettig zijn en dus ook gebruikt kunnen worden in plaats van de eerstgenoemde namen. Dit hangt alleen af van het systematisch inzicht van de onderzoeker. Iemand, die bijv. het afsplitsen van *Schistidium* niet goedkeurt, gebruikt voor de soorten de in deze lijst als synoniemen vermelde namen van *Grimmia*. Een ander verschil kan optreden als een soort als variëteit van een andere soort wordt opgevat of omgekeerd.

De geslachten staan in alfabetische volgorde en zijn onderstreept. De soortsnamen zijn van een stippestreep voorzien, voorzover ze als de juiste zijn opgenomen. De synoniemen zijn tussen haakjes geplaatst en niet onderstreept. Bij een geslacht is soms aangegeven onder welk ander geslacht men soorten kan aantreffen, die vroeger wel eens tot het eerstgenoemde geslacht werden gerekend. De opgenomen variëteiten en ondersoorten (ssp. = subspecies) zijn direct achter een soort vermeld, gescheiden door het + teken. Hierbij is een keuze gemaakt. Niet alle variëteiten zijn opgenomen, maar alleen die welke in een der bovengenoemde werken of lijsten voorkwamen. De betekenis der afkortingen van de auteursnamen is niet aan-

gegeven. Men vindt een lijst van de voornaamste auteurs in de Mossentabel van Margadant. De aanduiding hom. illeg. betekent een onwettig homoniem, d.w.z. als aan een mos een naam gegeven is gelijkluidend met een naam, die reeds tevoren aan een andere soort was gegeven, dan is de laatst gegeven naam onwettig en moet dus door een nieuwe naam worden vervangen. Zo staan er in de lijst onder het geslacht Bryum nog twee namen, n.l. Bryum cirrhatum Hopp. et Hornsch. en Bryum inclinatum (Brid.) Bland., die tevoren reeds wettig bestonden voor een andere soort. Welke nieuwe naam deze twee soorten in de toekomst zullen moeten dragen is nog niet uitgezocht. Daarom zijn deze twee namen hier opgenomen, hoewel ze onwettig zijn.

De lijst van Levermossen heeft minder veranderingen ondergaan. Er is momenteel ook voor deze groep een Index in voorbereiding, n.l. de Index Hepaticarum door BONNER. Hier van is alleen nog maar het deel Plagiochila verschenen, en van dat geslacht komt maar één soort in Nederland voor. Voor de andere levermossen zullen we dus moeten wachten tot de gehele Index Hepaticarum compleet is.

R. van der Wijk

MUSCI - BLADMOSSEN

- Abietinella C. Muell. -- A. abietina (Hedw.) Fleisch.
Acaulon C. Muell. -- A. muticum (Hedw.) C. Muell.
Aloina Kindb. -- A. aloides (Schultz) Kindb. -- A. rigida (Hedw.) Limpr. (A. stellata Kindb.) + var. ambigua (B.S.G.) Craig (A. ambigua (B.S.G.) Limpr.; A. ericaefolia Kindb.).
Amblyodon B.S.G. -- A. dealbatum (Hedw.) P. Beauv.
Amblystegiella Loesk. -- A. subtilis (Hedw.) Loesk.
Amblystegium B.S.G. -- A. juratzkanum Schimp. -- A. serpens (Hedw.) B.S.G. -- A. varium (Hedw.) Lindb.
 Zie ook onder Rhynchostegiella (B.S.G.) Limpr.
Andreaea Hedw. -- A. rothii Web. et Mohr -- A. rupestris Hedw. (A. petrophila Fuernr.).
Anisothecium Mitt. -- A. schreberianum (Hedw.) Dix. (A. crispum Lindb.) -- A. vaginale (With.) Loesk. -- A. varium (Hedw.) Mitt. (A. rubrum Lindb.; A. rufescens (With.) Lindb.; Dicranum rubra Lindb.).
Anomodon Hook. et Tayl. -- A. attenuatus (Hedw.) Hueb. -- A. longifolius (Brid.) Hartm. -- A. viticulosus (Hedw.) Hook. et Tayl.
Antitrichia Brid. -- A. curtispindula (Hedw.) Brid.
Archidium Brid. -- A. alternifolium (Hedw.) Mitt. (A. alternifolium Schimp.; A. globiferum (Bruch) Wijk et Marg.).
Astomum Hamp. -- A. crispum (Hedw.) Hamp.
Atrichum P. Beauv. (Catharinaea Web. et Mohr). -- A. angustatum (Brid.) B.S.G. (A. controversum P. Beauv.) -- A. tenellum (Roehl.) B.S.G. -- A. undulatum (Hedw.) P. Beauv.
Aulacomnium Schwaegr. -- A. androgynum (Hedw.) Schwaegr. -- A. palustre (Hedw.) Schwaegr. + fo. polycephalum (Brid.) Pödp. (Mnium polycephalum Brid.).
Barbula Hedw. -- B. acuta (Brid.) Brid. (B. gracilis Schwaegr. hom. illeg.) -- B. fallax Hedw. -- B. hornschiiana Schultz -- B. revoluta Brid. -- B. unguiculata Hedw. -- B. vinealis Brid.
 Zie ook onder Bryoerythrophyllum Chen, Didymodon Hedw. en Streblotrichum P. Beauv.
Bartramia Hedw. -- B. ithyphylla Brid. -- B. pomiformis Hedw.
Brachythecium B.S.G. -- B. albicans (Hedw.) B.S.G. -- B. glareosum (Spruc.) B.S.G. -- B. mildeanum (Schimp.) Schimp. (B. salebrosum var. palustre Schimp.) -- B. plumosum

- (Hedw.) B.S.G. -- *B. populeum* (Hedw.) B.S.G. -- *B. rivulare* B.S.G. -- *B. rutabulum* (Hedw.) B.S.G. -- *B. salebrosum* (Web. et Mohr) B.S.G. -- *B. starkei* (Brid.) B.S.G.
- Breidleria* Loesk. zie onder Hypnum Hedw.
- Bryoerythrophyllum* Chen -- *B. recurvirostre* (Hedw.) Chen (*B. rubella* Mitt.; *Didymodon recurvirostris* (Hedw.) Jern.)
- Bryum* Hedw. -- *B. alpinum* With. -- *B. angustirete* Kindb. (*B. pendulum* (Hornsch.) Schimp. hom. illeg.; *B. pendulovatum* Wijk et Marg.) -- *B. argenteum* Hedw. -- *B. atrovirens* Brid. (*B. erythrocarpum* Schwaegr.) -- *B. badii* (Brid.) Schimp. (*B. caespiticium* ssp. *badium* (Brid.) Lindb.) -- *B. bicolor* Dicks. -- *B. caespiticium* Hedw. -- *B. capillare* Hedw. + ssp. *elegans* (Nees) Lindb. (*B. elegans* Nees) + fo. *rosulatum* (Mitt.) Podp. (*B. capillare* var. *rosulatum* Mitt.) + ssp. *torquescens* (De Not.) Kindb. (*B. torquescens* De Not.) -- *B. cirrhatum* Hopp. et Hornsch. hom. illeg. -- *B. creberrimum* Tayl. (*B. affinocuspdatum* Wijk et Marg.; *B. affine* Lindb. et Arn. hom. illeg.; *B. cuspidatum* (B.S.G.) Schimp. hom. illeg.) -- *B. cyclophyllum* (Schwaegr.) B.S.G. -- *B. funkii* Schwaegr. -- *B. inclinatum* (Brid.) Bland. hom. illeg. -- var. *litorum* (Bomanss.) Podp. (*B. litorum* Bomanss.) -- *B. intermedium* (Brid.) Bland. -- *B. knowltonii* Barnes (*B. lacustre* (Web. et Mohr) Bland.; *B. planioperculatum* Warnst.) -- *B. marraii* Wils. -- *B. myrorum* (Schimp.) Berk. (*B. murale* Hunt hom. illeg.) -- *B. neodamense* Itzigs. -- *B. pallens* Sw. -- *B. pallescens* Schwaegr. -- *B. pseudotriquetrum* (Hedw.) Gaertn., Meyer et Scherb. (*B. ventricosum* Dicks.) + ssp. *bimum* (Schreb.) Hartm. (*B. bimum* (Schreb.) Turn.) -- *B. turbinatum* (Hedw.) Turn. -- *B. uliginosum* (Brid.) B.S.G. -- (*B. cernuum* (Hedw.) B.S.G. hom. illeg.) -- *B. warneum* (Roehl.) Brid. (*B. flagellare* Brid. hom. illeg.).
- Buxbaumia* Hedw. -- *B. aphylla* Hedw.
- Calliergon* (Sull.) Kindb. -- *C. cordifolium* (Hedw.) Kindb. -- *C. giganteum* (Schimp.) Kind. -- *C. megaphyllum* Mik. -- *C. stramineum* (Brid.) Kindb.
- Calliergonella* Loesk. -- *C. cuspidata* (Hedw.) Loesk.
- Camptothecium* B.S.G. -- *C. lutescens* (Hedw.) B.S.G.
- Zie ook onder Tomenthypnum Loesk.
- Campylium* (Sull.) Mitt. -- *C. chrysophyllum* (Brid.) J. Lange -- *C. elodes* (Lindb.) Kindb. -- *C. hispidulum* (Brid.) Mitt.

- + var. *sommerfeltii* (Myr.) Lindb. -- *C. polygamum* (B.S.G.)
C. Jens -- *C. protensum* (Brid.) Kindb. -- *C. radicale*
(P. Beauv.) Grout (*C. hygrophilum* (Jur.) Kindb.; *Lepto-*
dictyum riparium var. *hygrophilum* (Jur.) Wijk et Marg.)
-- *C. stellatum* (Hedw.) C. Jens.
- Campylopus* Brid. -- *C. brevipilus* B.S.G. -- *C. flexuosus* (Hedw.)
Brid. -- *C. fragilis* (Brid.) B.S.G. + var. *pyriformis*
(Schultz) Agst. (*C. pyriformis* (Schultz.) Brid.; *C. tur-*
faceus Schimp.) -- *C. subulatus* Schimp.
- Catharinea* Web. et Mohr zie onder *Atrichum* P. Beauv.
- Catoscopium* Brid. -- *C. nigritum* (Hedw.) Brid.
- Ceratodon* Brid. -- *C. purpureus* (Hedw.) Brid. + ssp. *conicus*
(Hamp.) Dix.
- Cinclidium* Sw. -- *C. stygium* Sw.
- Cinclidotus* P. Beauv. -- *C. fontinaloides* (Hedw.) P. Beauv.
-- *C. riparius* (Brid.) Arnott. (*C. nigricans* (Brid.) Wijk
et Marg.).
- Cirriphyllum* Grout -- *C. crassinervium* (Tayl.) Loesk. et Fleisch.
+ var. *turgescens* (Mol.) Moenk. -- *C. piliferum* (Hedw.)
Grout.
- Climacium* Web. et Mohr. -- *C. dendroides* (Hedw.) Web. et Mohr.
- Cratoneuron* (Sull.) Spruc. (*Cratoneurum* (Sull.) Roth) --
C. commutatum (Hedw.) Roth (*C. glaucum* Broth.) -- *C. fi-*
licinum (Hedw.) Spruc.
- Cryphaea* Mohr. -- *C. heteromalla* (Hedw.) Mohr (*C. arborea*
(P. Beauv.) Lindb.).
- Ctenidium* (Schimp.) Mitt. -- *C. molluscum* (Hedw.) Mitt.
- Cynodontium* zie onder *Oreoweisia* (B.S.G.) De Not.
- Dialytrichia* (Schimp.) Limpr. -- *D. mucronata* (Brid.) Broth.
- Dicranella* (C. Muell.) Schimp. -- *D. cerviculata* (Hedw.) Schimp.
-- *D. heteromalla* (Hedw.) Schimp. -- *D. subulata* (Hedw.)
Schimp. var. *curvata* (Hedw.) Rabenh. (*D. secunda* (Hedw.)
Kindb. var. *curvata* (Hedw.) Hag.)
Zie ook onder *Anisothecium* Mitt.
- Dicranodontium* B.S.G. -- *D. denudatum* (Brid.) Britt.
- Dicranoweisia* Mild. -- *D. cirrata* (Hedw.) Lindb. -- *D. cris-*
pula (Hedw.) Mild.
- Dicranum* Hedw. -- *D. bonjeanii* De Not. (*D. palustre* B.S.G.)
-- *D. fuscescens* Turn. fo. *falcifolium* (Braithw.) Moenk.
(*D. fuscescens* var. *falcifolium* Braithw.) -- *D. majus*
Turn. -- *D. polysetum* Sw. (*D. rugosum* Brid.; *D. undula-*

tum Ehrh. ex Web. et Mohr hom. illeg.) -- *D. scoparium* Hedw. -- *D. spurium* Hedw. -- *D. tauricum* Sapehin (*D. strictum* Schleich.).

Didymodon Hedw. -- *D. cordatus* Jur. (*D. rigidulus* ssp. *cordatus* (Jur.) Dism.) -- *D. rigidulus* Hedw. (*Barbula rigidula* (Hedw.) Mitt.) -- *D. tophaceus* (Brid.) Lisa (*Barbula tophacea* (Brid.) Mitt.) -- *D. trifarius* (Hedw.) Roehl. (*D. luridus* Hornsch.).

Zie ook onder *Bryoerythrophyllum* Chen en *Oxystegus* (Limpr.) Hilp.

Diphyscium Mohr -- *D. foliosum* (Hedw.) Mohr.

Ditrichum Hamp. -- *D. flexicaule* (Schwaegr.) Hamp. (*Leptotrichum flexicaule* Schwaegr.) + fo. *densum* (B.S.G.) Moerk. (*D. flexicaule* var. *densum* (B.S.G.) Braithw.) -- *D. heteromallum* (Hedw.) Britt. (*D. homomallum* (Hedw.) Hamp.; *Leptotrichum homomallum* (Hedw.) Hamp.) -- *D. lineare* (Sw.) Lindb. (*D. vaginans* (Sull.) Mitt.) -- *D. pallidum* (Hedw.) Hamp. -- *D. pusillum* (Hedw.) Hamp. (*D. tortile* (Schrad.) Brockm. var. *pusillum* (Hedw.) Brockm.).

Dolichotheca (Lindb.) Fleisch. zie onder *Isopterygium* Mitt.

Drepanocladus (C. Muell.) Roth. -- *D. aduncus* (Hedw.) Warnst. -- *D. exannulatus* (B.S.G.) Warnst. -- *D. fluitans* (Hedw.) Warnst. -- *D. lycopodioides* (Brid.) Warnst. -- *D. revolvens* (Sw.) Warnst. + var. *intermedius* (Lindb.) R. Wils. (*D. intermedius* (Lindb.) Warnst.) -- *D. sendtneri* (Schimp.) Warnst. -- *D. uncinatus* (Hedw.) Warnst. -- *D. vernicosus* (Mol.) Warnst.

Encalypta Hedw. -- *E. ciliata* Hedw. -- *E. streptocarpa* Hedw. (*E. contorta* Lindb.) -- *E. vulgaris* Hedw.

Entodon C. Muell. -- *E. concinnus* (De Not.) Par. (*E. orthocarpus* (Brid.) Lindb.).

Enthostodon Schwaegr. zie onder *Funaria* Hedw.

Ephemerella Schimp. zie onder *Ephemerum* Hamp.

Ephemerum Hamp. -- *E. cohaerens* (Hedw.) Hamp. -- *E. recurvifolium* (Dicks.) Boul. (*Ephemerella recurvifolia* (Dicks.) Schimp.) -- *E. serratum* (Hedw.) Hamp.

Eucladium B.S.G. -- *E. verticillatum* (Brid.) B.S.G.

Eurhynchium B.S.G. -- *E. striatum* (Hedw.) Schimp.

Zie ook onder *Oxyrrhynchium* (B.S.G.) Warnst. en onder *Rhynchostegiella* (B.S.G.) Limpr.

Fissidens Hedw. -- *F. adianthoides* Hedw. -- *F. bryoides* Hedw.

+ ssp. *incurvus* (Roehl.) Bertsch (*F. incurvus* Roehl.) +
 var. *gymnandrus* (Buse) Ruth. -- *F. crassipes* B.S.G. --
F. cristatus Mitt. (*F. decipiens* De Not.) -- *F. exilis*
 Hedw. -- *F. minutulus* Sull. ssp. *pusillus* (Wils.) Wiket
 Marg. (*F. pusillus* (Wils.) Mild.) -- *F. osmundoides* Hedw.
 -- *F. taxifolius* Hedw.

Fontinalis Hedw. -- *F. antipyretica* Hedw. + ssp. *kindbergii*
 (Ren. et Card.) Card. (*F. kindbergii* Ren. et Card.) --
F. squamosa Hedw.

Funaria Hedw. -- *F. fascicularis* (Hedw.) Lindb. (*Entosthodon*
fascicularis (Hedw.) C. Muell.) -- *F. hygrometrica* Hedw.
 -- *F. obtusa* (Hedw.) Lindb. (*Entosthodon obtusus* (Hedw.)
 Lindb.).

Georgia C. Muell. zie onder *Tetraphis* Hedw.

Grimmia Hedw. -- *G. cripita* Brid. - *G. pulvinata* (Hedw.) Sm.
 + var. *africana* (Hedw.) Hook. f. et Wils. (*G. orbicularis*
 Bruch.) - *G. trichophylla* Grev.
 Zie ook onder *Schistidium* Brid.

Gymnostomum Nees et Hornsch. -- *G. calcareum* Nees et Hornsch.

Gyroweisia Schimp. -- *G. tenuis* (Hedw.) Schimp.

Habrodon Schimp. -- *H. perpusillus* (De Not.) Lindb.

Hedwigia P. Beauv. -- *H. ciliata* (Hedw.) P. Beauv. (*H. albi-*
cans Lindb.).

Helodium Warnst. -- *H. blandowii* (Web. et Mohr) Warnst. (*H.*
lanatum (Brid.) Broth.).

Heterophyllum (Schimp.) Kindb. -- *H. haldanarium* (Grev.)
 Fleisch.

Homalia (Brid.) B.S.G. -- *H. trichomanoides* (Hedw.) B.S.G.

Homalothecium B.S.G. -- *H. sericeum* (Hedw.) B.S.G.

Homomallium (Schimp.) Loesk. -- *H. incurvatum* (Brid.) Loesk.
 (*Hypnum incurvatum* Brid.).

Hookeria Sm. -- *H. lucens* (Hedw.) Sm.

Hygroamblystegium Loesk. -- *H. fluviatile* (Hedw.) Loesk. --
H. tenax (Hedw.) Jenn. (*H. irriguum* (Hook. f. et Wils.)
 Loesk.).

Hygrohypnum Lindb. -- *H. luridum* (Hedw.) Jenn. (*H. palustre*
 Loesk.).

Hylocomium B.S.G. -- *H. splendens* (Hedw.) B.S.G.

Zie ook onder *Loeskeobryum* Fleisch.

Hymenostomum R. Brown. -- *H. microstomum* (Hedw.) R. Brown.

-- *H. tortile* (Schwaegr.) B.S.G.

Zie ook onder *Weisia* Hedw.

Hypnum Hedw. -- *H. cupressiforme* Hedw. + var. *ericetorum* B.S.G. fo. *filiforme* (Brid.) Podp. + var. *imbricatum* Boul. + ssp. *imponens* (Hedw.) Boul. (*H. imponens* Hedw.) + var. *lacunosum* Brid. + var. *longirostre* B.S.G. + var. *resupinatum* (Tayl.) Schimp. + fo. *tectorum* (Brid.) C. Jens. (*H. cupressiforme* var. *tectorum* Brid.) -- *H. lindbergii* Mitt. (*Breidleria arcuata* Loesk.; *Breidleria patientiae* Wijk et Marg.; *Hypnum arcuatum* Lindb. hom. illeg.)

Isopterygium Mitt. -- *I. elegans* (Brid.) Lindb. -- *I. seligeri* (Brid.) Dix. (*Hypnum seligeri* Brid.; *Dolichotheca silesiaca* (P. Beauv.) Fleisch.).

Isothecium Brid. -- *I. myosuroides* Brid. -- *I. myurum* Brid. (*I. viviparum* Lindb.).

Leptobryum (B.S.G.) Wils. -- *L. pyriforme* (Hedw.) Wils.

Leptodictyum (Schimp.) Warnst. -- *L. riparium* (Hedw.) Warnst. + fo. *trichopodium* (Schultz.) Moenk. (*L. trichopodium* (Schultz.) Warnst.).

Zie ook onder *Campylium* (Sull.) Mitt.

Leptodon Mohr -- *L. smithii* (Hedw.) Web. et Mohr.

Leptodontium (C. Muell.) Lindb. -- *L. flexifolium* (With.) Hamp.

Leptotrichum Hamp. zie onder *Ditrichum* Hamp.

Leskea Hedw. -- *L. polycarpa* Hedw.

Leucobryum Hamp. -- *L. glaucum* (Hedw.) Aongstr.

Leucodon Schwaegr. -- *L. sciuroides* (Hedw.) Schwaegr.

Loeskeobryum Fleisch. -- *L. brevirostre* (Brid.) Fleisch. (*Hylocomium brevirostre* (Brid.) B.S.G.).

Meesia Hedw. -- *M. triquetra* (L.) Aongstr. -- *M. uliginosa* Hedw. (*M. trichodes* Spruc.).

Mnium Hedw. -- *M. affine* Funck. + var. *elatum* B.S.G. (*M. seligeri* Jur.) + var. *rugicum* (Laur.) B.S.G. -- *M. cinctoides* Hueb. -- *M. cuspidatum* Hedw. -- *M. hornum* Hedw. -- *M. marginatum* (With.) B. Beauv. (*M. serratum* Brid.) + var. *riparium* (Mitt.) Husn. (*M. riparium* Mitt.) -- *M. pseudopunctatum* Bruch et Schimp. (*M. subglobosum* B.S.G.) -- *M. punctatum* Hedw. -- *M. rostratum* Schrad. (*M. longirostre* Brid.) -- *M. stellare* Hedw. -- *M. undulatum* Hedw.

Myrinea Schimp. -- *M. pulvinata* (Wahlenb.) Schimp.

Neckera Hedw. -- *N. complanata* (Hedw.) Hueb. -- *N. crispa* Hedw. -- *N. pennata* Hedw. -- *N. pumila* Hedw. + var. *pilifera* Jur. (*N. pennata* var. *philippeana* (B.S.G.) Mild.).

Oligotrichum Lam. et Cand. -- O. hercynicum (Hedw.) Lam. et Cand. (O. incurvum (Brid.) Lindb.).

Oreowesia (B.S.G.) De Not. -- O. bruntonii (Sm.) Mild. (Cynodontium bruntonii (Sm.) B.S.G.).

Orthodicranum (B.S.G.) Loesk. -- O. flagellare (Hedw.) Loesk. -- O. montanum (Hedw.) Loesk.

Orthodontium Schwaegr. -- O. lineare Schwaegr.

Orthothecium B.S.G. -- O. intricatum (Hartm.) B.S.G. (O. irroratum (C. Muell.) Wijk et Marg.).

Orthotrichum Hedw. -- O. affine Brid. + ssp. fastigiatum (Brid.) Hartm. (O. fastigiatum Brid.) -- O. anomalum Hedw. -- O. cupulatum Brid. + var. riparium Hueb. (O. nudum Dicks.; O. cupulatum var. nudum (Dicks.) Lindb.) -- O. diaphanum Brid. -- O. lyellii Hook. et Tayl. + var. laeve Barkm. -- O. obtusifolium Brid. (Stroemia obtusifolia (Brid.) Hag.) -- O. patens Brid. -- O. pulchellum Brunt. -- O. pumilum Sw. var. fallax (Bruch) Kickx -- O. rivulare Turn. -- O. schimperii Hammar (O. pumilum Dicks. hom. illeg.) -- O. speciosum Nees -- O. sprucei Mont. -- O. stramineum Hornsch. -- O. striatum Hedw. -- O. tenellum Brid. + var. decepiens Vent. fo. gemmiferum Barkm.

Oxyrrhynchium (B.S.G.) Warnst. -- O. praelongum (Hedw.) Warnst. (Eurhynchium stokesii (Turn.) B.S.G.) -- O. pumilum (Wils.) Loesk. (Eurhynchium pumilum (Wils.) Broth; Rhynchostegiella pumila (Wils.) Fleisch.; O. pallidirostrum (Brid.) Wijk et Marg.) -- O. schleicheri (Hedw.f.) Roell (Eurhynchium schleicheri (Hedw.f.) Mild.) -- O. speciosum (Brid.) Warnst. (Eurhynchium speciosum (Brid.) Mild.) -- O. swartzii (Turn.) Warnst.

Oxystegus Hilp. -- O. cylindricus (Brid.) Hilp. (Trichostomum cylindricum (Brid.) C. Muell.; Trichostomum tenuirostre (Hook. et Tayl.) Lindb.; Didymodon cylindricus (Brid.) B.S.G.) -- O. sinuosus (Mitt.) Hilp. (Barbula sinuosa (Mitt.) Grav.).

Paludella Brid. -- P. squarrosa (Hedw.) Brid.

Phascum Hedw. -- P. curvicolle Hedw. -- P. cuspidatum Hedw. (P. acaulon With.) + var. piliferum (Hedw.) Hook. et Tayl. (P. piliferum Hedw.).

Philonotis Brid. -- P. caespitosa Jur. -- P. fontana (Hedw.) Brid. + var. capillaris (Lindb.) Braithw. (P. capillaris (Lindb.) -- P. marchica (Hedw.) Brid.

- Physcomitrella B.S.G. -- P. patens (Hedw.) B.S.G.
Physcomitrium (Brid.) Fuernr. -- P. eury stomum Sendtn. -- P. pyriforme (Hedw.) Hamp. -- P. sphaericum (Ludw.) Fuernr.
Plagiotheciella Broth. zie onder Plagiothecium B.S.G.
Plagiothecium B.S.G. -- P. curvifolium Limpr. -- P. denticulatum (Hedw.) B.S.G. -- P. laetum B.S.G. -- P. latebricola B.S.G. (Plagiotheciella latebricola (B.S.G.) Fleisch.) -- P. roeseanum B.S.G. -- P. ruthei Limpr. P. succulentum (Wils.) Lindb. (P. sylvaticum var. succulentum (Wils.) Spruc.) -- P. sylvaticum (Brid.) B.S.G. + var. neglectum (Moenk.) Koppe -- P. undulatum (Hedw.) B.S.G.
Platygyrium B.S.G. -- P. repens (Brid.) B.S.G.
Platyhypnidium Fleisch. -- P. riparioides (Hedw.) Dix. (P. rusciforme Fleisch.).
Pleuridium Brid. -- P. acuminatum Lindb. (Phascum subulatum Web. et Mohr hom. illeg.) -- P. subulatum (Hedw.) Rabenh.
Pleurochaete Lindb. -- P. squarrosa (Brid.) Lindb.
Pleurozium Mitt. -- P. schreberi (Brid.) Mitt.
Pogonatum P. Beauv. -- P. aloides (Hedw.) P. Beauv. -- P. nanum (Hedw.) P. Beauv. (P. subrotundum Lindb.) -- P. urnigerum (Hedw.) P. Beauv.
Pohlia Hedw. -- P. bulbifera (Warnst.) Warnst. (Webera bulbifera Warnst.) -- P. campototrachela (Ren. et Card.) Broth. (P. annotina Loesk. hom. illeg.) -- P. cruda (Hedw.) Lindb. (Webera cruda (Hedw.) Hueb.) -- P. elongata Hedw. (Webera elongata (Hedw.) Schwaegr.) -- P. grandiflora Lindb. f. -- P. nutans (Hedw.) Lindb. (Webera nutans Hedw.) -- P. prolifera (Kindb.) Broth. (Webera prolifera Kindb.).
Polytrichum Hedw. -- P. commune Hedw. -- P. formosum Hedw. (P. attenuatum Brid.) -- P. juniperinum Hedw. + ssp. strictum (Brid.) Nyl. et Sael. (P. strictum Brid.) -- P. longisetum Brid. (P. gracile Dicks.; P. marginatum Brid.) -- P. piliferum Hedw.
Pottia (Reichenb.) Fuernr. -- P. bryoides (Dicks.) Mitt. -- P. davalliana (Sm.) C. Jens. (P. minutula (Schwaegr.) Hamp.; P. rufescens (Schultz) Warnst.) -- P. heimii (Hedw.) Hamp. -- P. intermedia (Turn.) Fuernr. (P. truncata ssp. intermedia (Turn.) Dix.) -- P. lanceolata (Hedw.) C. Muell. + var. gasilieni (Vent.) Corb. -- P. starkeana (Hedw.) C. Muell. -- P. truncata (Hedw.) B.S.G. (P. truncatula (With.)

Buse).

Pseudephemerum (Lindb.) Hag. -- P. nitidum (Hedw.) Reim. (P. axillare (Dicks.) Hag.).

Pseudoscleropodium (Limpr.) Fleisch. -- P. purum (Hedw.) Fleisch.

Pterygoneurum Jur. -- P. lamellatum (Lindb.) Jur. -- P. ovatum (Hedw.) Dix. (P. cavifolium Jur.).

Ptilium De Not. -- P. cristacastrensis (Hedw.) De Not.

Pylaisia B.S.G. -- P. polyantha (Hedw.) B.S.G.

Pyramidula Brid. -- P. tetragona (Brid.) Brid.

Racomitrium Brid. -- R. aciculare (Hedw.) Brid. -- R. canescens (Hedw.) Brid. -- R. fasciculare (Hedw.) Brid. -- R. heterostichum (Hedw.) Brid. + var. obtusum (Brid.) Delogne (R. obtusum (Brid.) Brid.) -- R. lanuginosum (Hedw.) Brid. (R. hypnoides Lindb.).

Rhodobryum (Schimp.) Hamp. -- R. roseum (Hedw.) Limpr.

Rhynchostegiella (B.S.G.) Limpr. -- R. compacta (Hook.) Loesk. (Amblystegium compactum (Hook.) Aust.) -- R. curviseta (Brid.) Limpr. -- R. tenella (Dicks.) Limpr. (R. algeriana (Brid.) Warnst.).

Rhynchostegium B.S.G. -- R. confertum (Dicks.) B.S.G. -- R. megapolitanum (Web. et Mohr) B.S.G. -- R. murale (Hedw.) B.S.G. -- R. rotundifolium (Brid.) B.S.G.

Rhytidiadelphus (Warnst.) Warnst. -- R. loreus (Hedw.) Warnst. -- R. squarrosus (Hedw.) Warnst. -- R. triquetrus (Hedw.) Warnst.

Rhytidium (Sull.) Kindb. -- R. rugosum (Hedw.) Kindb.

Schistidium Brid. -- S. apocarpum (Hedw.) B.S.G. + var. bistratosum (Barkm.) Wijk comb. nov. (Grimmia apocarpa Hedw. var. bistratosa Barkm., Acta Bot. Neerl. 3: 128. 1954) + var. confertum (Funck) Moell. (Grimmia conferta Funck) -- S. maritimum (Turn.) B.S.G.

Scleropodium B.S.G. -- S. caespitosum (C. Muell.) L. Koch (S. caespitosum B.S.G.) -- S. touretii (Brid.) L. Koch (S. illecebrum B.S.G.).

Scorpidium (Schimp.) Limpr. -- S. scorpidioides (Hedw.) Limpr.

Seligeria B.S.G. -- S. calcarea (Hedw.) B.S.G. -- S. recurvata (Hedw.) B.S.G.

Sphagnum L. -- S. compactum Lam. et Cand. -- S. contortum Schultze -- S. cuspidatum Hoffm. -- S. dusenii (C. Jens.) Russ. et Warnst. -- S. fimbriatum Wils. -- S. fuscum

(Schimp.) Klinggr. -- *S. girgensohnii* Russ. -- *S. hakkodense* Warnst. et Card. -- *S. imbricatum* Russ. (alleen subfossiel in het mosveen) -- *S. magellanicum* Brid. (*S. subbicolor* Hamp.) -- *S. molle* Sull. -- *S. nemoreum* Scop. (*S. acutifolium* Ehrh.; *S. schimperi* (Warnst.) Roell; *S. tenerum* Warnst. hom. illeg.) -- *S. palustre* L. (*S. cymbifolium* (Ehrh.) Hedw.) -- *S. papillosum* Lindb. -- *S. plumulosum* Roell (*S. nemoreum* var. *subnitens* (Russ. et Warnst.) Marg.; *S. subnitens* Russ. et Warnst.) -- *S. pulchrum* (Lindb.) Warnst. -- *S. recurvum* P. Beauv. + ssp. *amblyphyllum* (Russ.) Warnst. -- *S. riparium* Aongstr. -- *S. rubellum* Wils (*S. subtile* (Russ.) Warnst.) -- *S. squarrosum* Crome -- *S. subsecundum* Nees (*S. aquatile* Warnst.) + var. *auriculatum* (Schimp.) Lindb. (*S. auriculatum* Schimp.) + var. *inundatum* (Russ.) C. Jens. (*S. inundatum* Russ.) + var. *obesum* (Wils.) Schimp. (*S. crassicladium* Warnst.; *S. obesum* Wils.; *S. turgidum* (C. Muell.) Roell) + var. *platyphyllum* (Lindb.) Card. (*S. platyphyllum* Lindb.) cens. (Nees et Hornsch.) Warnst. -- *S. tenellum* Hoffm. (*S. moluscum* Bruch) -- *S. teres* (Schimp.) Aongstr.

Splachnum Hedw. -- *S. ampullaceum* Hedw.

Streblotrichum P. Beauv. -- *S. convolutum* (Hedw.) P. Beauv. (*Barbula convoluta* Hedw.).

Stroemia Hag. hom. illeg. zie onder *Orthotrichum* Hedw.

Tetraphis Hedw. -- *T. pellucida* Hedw. (*Georgia pellucida* (Hedw.) Rabenh.).

Thamnium B.S.G. -- *T. alopecurum* (Hedw.) B.S.G.

Thuidium B.S.G. -- *T. recognitum* (Hedw.) Lindb. + var. *delicatum* (Hedw.) Warnst. (*T. delicatum* (Hedw.) Mitt.) + ssp. *philibertii* (Limpr.) Dix. (*T. philibertii* Limpr.) -- *T. tamariscinum* (Hedw.) B.S.G.

Tomenthypnum Loesk. -- *T. nitens* (Hedw.) Loesk. (*Camptothecium nitens* (Hedw.) Loesk.).

Tortella (Lindb.) Limpr. -- *T. flavovirens* (Bruch) Broth. (*Trichostomum flavovirens* Bruch) -- *T. fragilis* (Hook. et Wils.) Limpr. -- *T. inclinata* (Hedw. f.) Limpr. -- *T. tortuosa* (Hedw.) Limpr.

Tortula Hedw. -- *T. guepinii* (B.S.G.) Broth -- *T. intermedia* (Brid.) De Not. (*T. montana* (Nees) Lindb. hom. illeg.) -- *T. laevipila* (Brid.) Schwaegr. -- *T. latifolia* Hartm. -- *T. marginata* (B.S.G.) Spruc. -- *T. muralis* Hedw. + var.

aestiva Hedw. (T. aestiva (Hedw.) P. Beauv.) -- T. papillo-
 sa Wils. -- T. ruralis (Hedw.) Gaertn., Meyer et Scherb.
 + var. ruraliformis (Besch.) Wildeman (T. ruraliformis
 Besch.; T. ruralis var. arenicola Braithw.; T. ruralis
 ssp. ruraliformis (Besch.) Dix.) + var. alpina Wahlenb.
 (T. ruralis var. norvegica (Web.) Moenk.) -- T. subulata
 Hedw. -- T. virescens (De Not.) De Not. (T. pulvinata
 (Jur.) Limpr.; T. ruralis var. virescens De Not.)

Trematodon Michx. -- T. ambiguus (Hedw.) Hornsch.

Trichodon Schimp. -- T. cylindricus (Hedw.) Schimp.

Trichostomum Bruch -- T. crispulum Bruch + var. brevifolium
 (C. Muell.) B.S.G.

Zie ook onder Oxystegus Hilp. en Tortella (Lindb.) Limpr.
Ulota Mohr -- U. bruchii Hornsch. -- U. coarctata (P. Beauv.)
 Hammar (U. ludwigii (Brid.) Brid.) -- U. crispa (Hedw.)
 Brid. (U. ulophylla (Web. et Mohr) Broth.) + ssp. inter-
 media (Schimp.) Herib. (U. intermedia Schimp.) -- U. cris-
 pula Bruch (U. crispa var. crispula (Bruch) Hammar) --
 U. phyllantha Brid.

Webera Hedw. zie onder Pohlia Hedw.

Weisia Hedw. -- W. controversa Hedw. (W. viridula Brid.) --
 W. rutilans (Hedw.) Lindb.

Zie ook onder Hymenostomum R. Brown.

Zygodon Hook. et Tayl. -- Z. forsteri (With.) Mitt. -- Z. vi-
 ridissimus (Dicks.) Brid. + var. viridissima (Z. viri-
 dissimus var. occidentalis Malta) + var. stirtonii (Schimp)
 Hag.

HEPATICAЕ - LEVERMOSSEN

Alicularia Corda zie onder Nardia Gray.

Anthoceros L. -- A. crispulus (Mont.) Douin (A. multifidus Lindbg.) -- A. laevis L. (Phaeoceros laevis (L.) Prosk.) + ssp. carolinianus (Michx.) Marg. -- A. punctatus L.

Barbilophozia Loesk. -- B. barbata (Schmid.) Loesk. (Lophozia barbata (Schmid.) Dum.) -- B. lycopodioides (Wallr.) Loesk. (Lophozia lycopodioides (Wallr.) Cogn.).

Bazzania Gray. -- B. trilobata (L.) Gray.

Blasia L. -- B. pusilla L.

Blepharostoma Dum. -- B. trichophyllum (L.) Dum.

Blyttia Gottsche zie onder Pallavicinia Gray.

Calypogeia Raddi (Kantia Gray) -- C. arguta Mont. et Nees -- C. fissa (L.) Raddi -- C. neesiana (Mass. et Car.) K. Muell. -- C. sphagnicola (Arn. et Perss.) Warnst. et Loesk. -- C. trichomanis (L.) Corda.

Cephalozia Dum. -- C. bicuspidata (L.) Dum. + var. lammersiana (Hueb.) Breidl. (C. lammersiana (Hueb.) Spruc.) -- C. connivens (Dicks.) Spruc. -- C. macrostachya Kaal. -- C. media Lindb.

Zie ook onder Cladopodiella Buch.

Cephaloziella (Spruc.) Schiffn. -- C. elachista (Jack) Schiffn. -- C. hampeana (Nees) Schiffn. -- C. rubella (Nees) Warnst. -- C. starkei (Funck) Schiffn.

Chiloscyphus Corda -- C. pallescens (Ehrh.) Dum. (C. polyanthus var. pallescens (Ehrh.) Hartm.) -- C. polyanthus (L.) Corda + var. rivularis (Schrad.) Nees (C. rivularis (Schrad.) Loesk.).

Cladopodiella Buch. -- C. fluitans (Nees) Buch. -- C. francisci (Hook.) Buch (Cephalozia francisci (Hook.) Dum.).

Conocephalum Wigg. -- C. conicum (L.) Dum. (Fegatella conica (L.) Corda).

Diplophyllum Dum. -- D. albicans (L.) Dum. -- D. obtusifolium (Hook.) Dum.

Eucalyx Breidl. zie onder Plectocolea Mitt.

Fegatella Raddi zie onder Conocephalum Wigg.

Fossombronia Raddi -- F. angulosa (Dicks.) Raddi -- F. dumortieri (Hueb. et Genth) Lindb. (F. foveolata Lindb.) -- F. pusilla (L.) Dum. -- F. wondraczekii (Cord.) Dum.

Frullania Raddi -- F. dilatata (L.) Dum. -- F. tamarisci (L.) Dum.

Geocalyx Nees -- G. graveolens (Schrad.) Nees.?

Gymnocolea Dum. -- G. inflata (Huds.) Dum.

Haplozia Dum zie onder Plectocolea Mitt. en Jungermannia L.

Isopaches Buch -- I. bichenatus (Schmid.) Buch (Lophozia bichenata (Schmid.) Dum.).

Jungermannia L. -- J. caespiticia Lindbg (Haplozia caespiticia (Lindbg) Dum.; Solenostoma caespiticium (Lindbg) Steph.).

Zie ook onder Plectocolea Mitt. en Metzgeria Raddi.

Kantia Gray zie onder Calypogeia Raddi.

Leiocolea (K. Muell.) Buch -- L. badensis (Gottsche) Joerg. (Lophozia badensis (Gottsche) Schiffn.) -- L. muelleri (Nees) Joerg. (Lophozia muelleri (Nees) Dum.).

Lejeunea Lib. -- L. cavifolia (Ehrh.) Lindb. ?

Lepidozia (Dum.) Dum. -- L. reptans (L.) Dum.

Zie ook Telaranea (Spruc.) Schiffn.

Leptoscyphus Mitt. zie Mylia Gray.

Lophocolea Dum. -- L. bidentata (L.) Dum. -- L. cuspidata (Nees) Limpr. -- L. heterophylla (Schrad.) Dum. -- L. minor Nees.

Lophozia Dum. -- L. capitata (Hook.) K. Muell. (L. mildeanum (Gottsche) Schiffn.) -- L. excisa (Dicks.) Dum. -- L. incisa (Schrad.) Dum. -- L. marchica (Nees) Steph. ? -- L. silvicola Buch -- L. ventricosa (Dicks.) Dum. + var. porphyroleuca (Nees) Hartm. (L. porphyroleuca (Nees) Schiffn.).

Zie verder onder Barbilophozia Loesk.; Isopaches Buch;

Leiocolea (K. Muell.) Buch en Orthocaulis Buch.

Lunularia Dum. -- L. cruciata (L.) Dum.

Madotheca Dum. zie Porella L.

Marchantia L. -- M. polymorpha L.

Marsupella Dum. -- M. emarginata (Ehrh.) Dum. -- M. funckii (Web. et Mohr) Dum.

Metzgeria Raddi -- M. conjugata Lindbg. -- M. fruticulosa (Dicks.) Evans (Jungermannia furcata var. aeruginosa Hook.) -- M. furcata (L.) Dum.

Microlejeunea (Spruc.) Steph. -- M. ulicina (Tayl.) Evans.

Microlepidozia (Spruc.) Joerg. zie onder Telaranea (Spruc.) Schiffn.

Moerckia Gottsche -- M. flotowiana (Nees) Schiffn.

Mylia Gray -- M. anomala (Hook.) Gray (Leptoscyphus anomalus (Hook.) Lindb.) -- M. taylorii (Hook.) Gray (Leptoscyphus taylorii (Hook.) Mitt.).

Nardia Gray -- N. geoscyphus (De Not.) Lindb. (Alicularia geoscyphus De Not.) -- N. scalaris (Schrad.) Gray (Alicularia scalaris (Schrad.) Cord.).

Nowellia Mitt. -- N. curvifolia (Dicks.) Mitt.

Odontoschisma Dum. -- O. denudatum (Mart.) Dum. -- O. sphagni (Dicks.) Dum.

Orthocaulis Buch -- O. attenuatus (Mart.) Evans (Lophozia gracilis (Schleich.) Steph.) -- O. floerkii (Web. et Mohr) Buch (Lophozia floerkii (Web. et Mohr) Schiffn.) -- O. kunzeanus (Hueb.) Buch (Lophozia kunzeana (Hueb.) Evans).

Pallavicinia Gray -- P. lyellii (Hook.) Gray (Blyttia lyellii (Hook.) Lindb., Gottsche et Nees).

Pellia Raddi -- P. endiviaefolia (Dicks.) Dum. (P. fabroniana Raddi) + fo. fucigera (Hook.) Wijk et Marg. (P. fabroniana fo. fucigera (Hook.) Mass.; Jungermania epiphylla var. fucigera Hook., Brit. Jungerm. T. 47 f. 18. 1816). -- P. epiphylla (L.) Corda -- P. neesiana (Gottsche) Limpr.

Phaeoceros Prosk. zie onder Anthoceros L.

Plagiochila Dum. -- P. asplenoides (L.) Dum.

Plectocolea Mitt. -- P. crenulata (Sm.) Evans (Haplozia crenulata (Sm.) Dum.; Solenostoma crenulata (Sm.) Mitt.) + fo. gracillima (Sm.) Wijk et Marg. (Haplozia crenulata fo. gracillima (Sm.) Hook.; Jungermania gracillima Sm., Engl. Bot. 21: t. 2238. 1805) -- P. hyalina (Lyell) Mitt. (Eucalyx hyalinus (Lyell) Breidl.).

Porella L. -- P. laevigata (Schrad.) Lindb. (Madotheca laevigata (Schrad.) Dum.) -- P. platyphylla (L.) Lindb. (Madotheca platyphylla (L.) Dum.) + ssp. baueri (Schiffn.) Vandenberghen (P. baueri (Schiffn.) Evans).

Preissia Corda -- P. quadrata (Scop.) Nees.

Ptilidium Nees -- P. ciliare (L.) Nees -- P. pulcherrimum (Web.) Hamp.

Radula Dum. -- R. complanata (L.) Dum.

Reboulia Nees -- R. hemisphaerica (L.) Raddi.

Riccardia Gray (Aneura Dum.) -- R. incurvata Lindb. -- R. latifrons (Lindb.) Lindb. (Aneura latifrons Lindb.) -- R. multifida (L.) Gray -- R. palmata (Hedw.) Carr. -- R.

- pinguis (L.) Gray -- R. sinuata (Dicks.) Trev.
Riccia L. -- R. beyrichiana Hamp. -- R. bifurca Hoffm. --
R. canaliculata Hoffm. -- R. ciliata Hoffm. -- R. crys-
tallina L. -- R. fluitans L. (Ricciella fluitans (L.) A.
 Braun) + var. duplex (Lorb.) Wijk et Marg. (Ricciella du-
plex (Lorb.) Jans. et Wacht.) -- R. frostii Aust. -- R.
glauca L. -- R. hueberiana Lindbg. -- R. rhenana Lorb.
R. sorocarpa Besch. -- R. subbifurca Warnst. -- R. warn-
storffii Limpr.
Ricciella A. Braun zie onder Riccia L.
Ricciocarpus Corda -- R. natans (L.) Corda.
Scapania Dum. -- S. compacta (Roth) Dum. -- S. curta (Mart.)
 Dum. -- S. irrigua (Nees) Dum. -- S. nemorosa (L.) Dum.
 -- S. undulata (L.) Dum. ?
Solenostoma Mitt. zie onder Jungermania L. en Plectocolea
 Mitt.
Sphaerocarpus Boehm. -- S. michelii Bell. -- S. texanus Aust.
Sphenolobus (Lindb.) Steph. -- S. minutus (Crantz) Steph.
 Zie ook onder Tritomaria (Schiffn.) Loesk.
Targionia L. -- T. hypophylla L.
Telaranea (Spruc.) Schiffn. -- T. setacea (Web.) K. Muell.
 (Lepidozia setacea (Web.) Mitt.; Microlepidozia setacea
 (Web.) Joerg.) -- T. silvatica (Evans) K. Muell.
Trichocolea Dum. -- T. tomentella (Ehrh.) Dum.
Tritomaria (Schiffn.) Loesk. -- T. exsecta (Schmid.) Loesk.
 (Sphenolobus exsectus (Schmid.) Steph. -- T. exsectiformis
 (Breidl.) Loesk. -- T. quinqueidentata (Huds.) Besch. ?