

CINCLIDOTUS RIPARIUS MET KAPSELS GEVONDEN

door A. Touw

In Buxbaumia 17 (1963) 99 werd uiteengezet, dat *Cinclidotus fontinaloides* en *C. riparius* in vegetatieve toestand vaak niet met zekerheid van elkaar kunnen worden onderscheiden. Wanneer *C. fontinaloides* normaal ontwikkeld is, is deze soort goed te herkennen, maar er komen vormen van voor, welke sprekend gelijken op *C. riparius*. Planten met de vegetatieve kenmerken van *C. riparius* zijn meer dan eens in ons land verzameld, maar al dit materiaal is steriel en het voorkomen van deze soort in ons land werd daarom door mij in twijfel getrokken. Als reactie op deze uitspraak werd mij door de heer B.J. Reichgelt materiaal met kapsels van *C. riparius* toegezonden, dat door hem in september 1962 werd verzameld, op een krib in de Waal bij Nijmegen! Evenals *Fontinalis fructificans* *Cinclidotus* wanneer de planten gedurende lange tijd droog liggen en bij het zoeken naar kapsels heeft men dus de meeste kans op succes na een langdurige droogteperiode.

Summary:

Fruiting specimens of *Cinclidotus riparius* have been found for the first time in the Netherlands by B.J. Reichgelt near Nijmegen, on basalt blocks of a breakwater in the River Waal.