

K o r t e m e d e d e l i n g e n

EEN BUITENGEWONE VINDPLAATS VAN AULACOMNIUM PALUSTRE
door J.A.C. Veth en A.N. Koopmans

Sinds meerdere jaren maakten wij wandelingen in het fraaie natuurpark Berg-en-Bos te Apeldoorn en verzamelden daar tal van lever- en bladmossen. In het jaar 1963 vonden wij daar in het bos aan een dwarspad van de Harpweg Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. De determinatie was vrij zeker, doch de vindplaats was noch moerassig, noch zeer vochtig en daarom zonden we het mos op aan Dr. B.O. van Zanten, die met de determinatie accoord ging.

Maar onlangs, 27 mei 1965, troffen wij dit mos voor de tweede maal aan, niet in enkele exemplaren, doch oppervlakken van bijna 1 m² bedekkend, aan de Moslaan tussen Vaccinium Myrtillus aan de droge rand van een dennebos. De zoden waren 8 cm hoog en fraai groen. Kapsels ontbraken.

Steeds hadden we Aulacomnium palustre op moerassige plaatsen ontmoet, o.a. aan de Heelsumer beek en jaren geleden zag één onzer het op tal van moerassige plaatsen in Friesland. "The Student's Handbook of British Mosses" van Dixon geeft als vindplaats op: "bogs". Limpricht vermeldt: "in Wald- und Torfsümpfen und auf sumpfigen Wiesen von der Norddeutschen Tiefebene bis auf den Hochalpen durch das ganze Gebiet allgemein verbreitet." De Prodrromus Florae Batavae Vol. II, Pars I, Editio altera (1893) geeft op: "in de duinen, op moeras- en veengronden en in vochtige bossen. De soortnaam paluster wijst op een moerassige standplaats.

Het bos in Berg-en-Bos is niet moerassig of vochtig. Géén der genoemde werken geeft droge bossen op. De vindplaats is dus wèl buitengewoon. Dit moge ons kleine artikeltje rechtvaardigen.

Noot:

Ook in de directe omgeving van de hoog gelegen Emmapyramide bij Rozendaal bij Velp is Aulacomnium palustre gevonden in een omgeving overeenkomend met die, hierboven beschreven. (Red.)