

page 15, ligne 22:

il faut lire var. plumosum Bryol.germ., au lieu de var. plumulosum Bryol.germ.

page 15, ligne 31:

presque toujours fibrillées, rarement sans fibres; lorsqu'elles le sont, elles le sont de façon très variable, jusqu'au $1/4$, la $1/2$ ou les $3/4$ (description de *S.laxifolium*).

page 16, ligne 13:

S.laxifolium var. plumulosum (Schimp.) De Zuttere; basonyme *S.cuspidatum* var. plumulosum Schimper, dans Histoire nat. des sphaignes, 1857).

page 17, ligne 7:

var. cuspidatum f. fibrosum De Zuttere: *Sphagno cuspidato* simile; a cuspidato foliis caulinis semper superne fibrosis differt. Diffère de *S.cuspidatum* par ses feuilles caulinaires fibrillées dans la partie supérieure.

page 18, ligne avant-dernière:

lire acidité maximum au lieu de minimum.

page 19, pour *S.pulchrum* (Lindb.) Warnst., les exemplaires d'herbier de Cornet et de Gravet se trouvent au Jardin botanique de l'Etat, à Bruxelles.

page 19, ligne dernière:

Brasschaet, au Klein Schietveld (van Hecke, in herb. S. Henry, No. 51, août 1963.

page 21, Ia et Ib:

lire: parois des cellules hyalines en contact

J'espère que ces quelques précisions satisferont certains botanistes mais ne feront que grandir l'intérêt à porter aux sphaignes.

Ph. De Zuttere

OPROEP

Er bestaan plannen voor de uitgave op korte termijn van een herziene herdruk van de Mossentabel van W.D. Margadant. Deze uitgave zal waarschijnlijk tot stand komen door samenwerking van de N.J.N. en de K.N.N.V. Margadant heeft reeds toegezegd tijd te willen besteden aan een herziening.

Het bestuur van de Bryologische Werkgroep nodigt hierbij