

toont. Al het beschikbare materiaal is naar het Rijksherbarium gezonden.

E. C. H. Kolvoort

Sphagnum molle op Schiermonnikoog.

Van Zanten heeft indertijd (Buxbaumia, jrg. 17 3/4) de vondst van drie Sphagnumsoorten op het eiland opgegeven, en ook vermeld dat eerder nog een andere soort gevonden is. In 1964 heb ik deze vier soorten alle in het Grieglop gevonden, en bovendien nog Sphagnum molle. Van Zanten zelf heeft de determinatie bevestigd. Hij noemt deze vondst echter niet in de aanvullingen op de lijst van aanwinsten voor het eiland. Het materiaal is aanwezig in het herbarium van het Botanisch Museum (Inst. v. Systematische Plantkunde) te Utrecht onder No. 181483 B 21 Sept. 1965.

J. A. Hoekstra

Boekbespreking

Prof. Dr. A. Boros, Bryogeographie und Bryoflora Ungarns.

Uitg. Akadémiai Kiadó, Publishing House of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest V. Áltómany U. 21 1968, 466 pp en 88 afbeeldingen. Prijs \$ 16.00.

Nadat in 1953 "Bryophyta Hungariae" verschenen was, hetgeen in het Hongaars gesteld was, is nu, voorzien van de laatste gegevens, dit boek verschenen en wel in de Duitse taal zodat het nu ook toegankelijk is geworden voor de buitenlandse bryologen. Bryogeographie und Bryoflora Ungarns is het resultaat van een onderzoek van 40 jaren en omvat alle geografische landschappen (vlakten, gebergten enz.) van Hongarije vanuit een bryologisch standpunt bezien.

Na een korte inleiding en een hoofdstukje over de geschiedenis van het mossenonderzoek volgt een uitvoerige en interessante beschrijving over de oecologie van de Hongaarse mossen.

De schrijver vestigt vooral de aandacht erop om elk biotoop