

- (1) De taxonomie van deze twee soorten is nog zeer moeilijk te preciseren. *S. laxifolium* C. Müll., waarvan ik melding in een vorig nummer (BUXBAUMIA, 20, 1-2, pp. 15-26 en 3-4, pp. 98-99, 1966), en in overige publicaties heb gemaakt, zou in feite Hoffmann's *S. cuspidatum* zijn. Daarentegen zou mijn *Sphagnum cuspidatum* Hoffm. (kleine stengelbladen zonder draden, chlorophylcellen op dwarse doorsnede aan beide kanten vrij, enz.) iets anders zijn. Ik hoop deze moeilijkheid in een aanstaande publicatie te kunnen behandelen.

Summary

A list is given of *Sphagna* collected by the author in the Netherlands in 1967 and 1968. Particulars about the taxonomy of *S. laxifolium* C. Müll. and *S. cuspidatum* Hoffm. will be given in a forthcoming publication.

*

KORTE MEDEDELINGEN

Riccia sorocarpa in plaats van *Riccia glauca*. (Rectificatie)

In de mededeling betreffende de vondst van *Sphaerocarpus Michelii* in Buxb. 22 (1968) 34 werd *Riccia glauca* genoemd als tezamen voorkomend met *Sphaerocarpus*.

Dit najaar werd weer gezocht, doch *Sphaerocarpus* werd niet weer gevonden, wel goed ontwikkelde *Riccia*'s. Nu zijn de rozetvormende *Riccia*'s niet altijd gemakkelijk met zekerheid te determineren zonder goede microscopische preparaten. Uit microtoomcoupes is thans gebleken, dat we niet met *R. glauca*, doch met *R. sorocarpa* te doen hebben. De thalluslobben zijn diep en scherp gevoerd. Vrijwel alle topcellen van de "peilers" waren vergaan, slechts dicht bij de groeipunt waren nog enige bolvormige cellen te zien. De ruwe sporen zijn 60 - 80 μ in doorsnede.

E.C.H. Kolvoort