

Aanvulling op de soortenlijst van de voorjaarsexcursie naar de omgeving van Nijmegen in 1968.

Bij het door F. Muller verzamelde materiaal bleken nog de volgende soorten voor te komen.

Calypogeia neesiana en *Tortula subulata* van de Hellekuil.

Ook kunnen de ?? achter de *Drepanocladus lycopodioides* vervallen daar hiervan nu bewijsmateriaal bij Muller aanwezig en gecontroleerd is. Deze soort werd bij de Hatertsevennen verzameld.

S.G.

*

Rhacomitrium heterostichum (Hedw.) Brid.

In "Buxbaumia" 22, nr. 1/2-1968, verscheen een lijst van de mossen gevonden op het terrein van de werkhaven te Hellevoetsluis. Aan deze lijst op pag. 25 l.c. dient nog toegevoegd te worden: *Rhacomitrium heterostichum* (Hedw.) Brid. Deze soort verzamelde ik met Drs. A. Touw tijdens een excursie op het onderzochte terrein in april 1968. Merkwaardig is, dat wij deze *Rhacomitrium*, die als kalkmijndend bekend staat, verzamelden van een kalksteenblok (!). Deze kalksteenblokken zijn afkomstig uit de kalksteengroeve bij Beez, in de Belgische Ardennen, waar de soort algemeen voorkomt.

P. de Meij.

*

Een nieuw bryologisch tijdschrift.

De bryologisch-lichenologische werkgroep voor Midden-Europa heeft een nieuw tijdschrift "HERZOGIA" doen verschijnen, uitgegeven door Prof. Dr. Follmann, Dr. Frey, Dr. Koppe, Prof. Dr. Poelt en Dr. Schultze-Motel. De werkgroep stelt zich voor een vruchtbare