

RECENTE VONDST VAN POTTIA BRYOIDES (DICKS.) MITT.
IN WESTELIJK ZEEUWS-VLAANDEREN.

door P. Roorda van Eysinga.

Bij het nawerken van het materiaal van een steekproef nabij een bunker, die op het punt stond te verdwijnen, bleek een polletje *Pottia* aanwezig te zijn met een wat *Phascum cuspidatum*-achtig uiterlijk. Microscopische determinatie leverde op: *Pottia bryoides*. Drs. A. Touw was zo vriendelijk de determinatie te controleren, en het nog vrij jonge materiaal te vergelijken. Bovendien deelde hij mee geen nadere gegevens te hebben over latere vondsten, na het afsluiten van zijn artikel in *Buxbaumia* van 1963 (1). Dit zou dus de derde bekende vondst van deze eeuw zijn, ná Zwolle 1906, en Kims-werd (Fr.) 1931. Bovendien qua ligging "in goed gezelschap", gezien de vijf vermeldingen op Zuid-Beveland over 1839-41. Naslag in de Belgische flora (2) leverde in de nabijheid nog op: Oostende (zeedistrict) 1933, en Antwerpen zonder datum.

Gegevens vondst:

Cadzand Z. VI. Herdijkte Zwarte Polder. Op grond; naast bunker. KQ: 18/379. IVON : 47-58. 23-1-1965. (Nr. 65-41.)

Met kapsels; jonge planten.

Aanvulling :

Op open plek tussen brokstukken beton, naast bunker. Vaste dichte bodem, kleiig, aflopend (geen stagnatie regenwater). Grondwaterstand geschat 40 à 60 cm onder maaiveld. Open water vlakbij. Lichte saliniteit niet uitgesloten (3).

Bunker inmiddels opgeblazen en geruimd; terrein geëgaliseerd.

- (1) A. Touw. *Buxbaumia* 17, 1/2; 82-100.
- (2) Flore Générale de Belgique. Bryophytes, Vol. II (1964); p. 324-325.
- (3) Moeilijk er geen rekening mee te houden. Brak tot zout polder-water is normaal. Zie bijv. J.H. Snijders in Landbouwvoorlichting Okt. 1960, p. 524-540, met 'n cijfer voor 1959 (droge zomer) in dit gebied van meer dan 5000 mg Cl per liter !
(NaCl + MgCl₂.)

Summary

Pottia bryoides (Dicks.) Mitt. is very rare in The Netherlands. In this century only two finds have been recorded. A third locality is now given: "Cadzand; Zeeuws-Vlaanderen-1965.", in the extreme south-west of our country, close to the coast and near the Dutch-Belgian frontier. The specimen was young and fruiting.

BRYOLOGISCHE NOTITIES UIT HET GOOI

door J. Frencken.

In de vijf en twintig jaar, dat ik nu in 't Gooi woon is hier heel wat veranderd. Het is er, zoals bijna overal, veel voller geworden. Eigenlijk té vol. Toch ben ik in die jaren deze streek erg gaan waarderen. Dat komt vooral door de grote verscheidenheid aan terreinen, die we zo in een straal van 15 à 20 km rond Hilversum aantreffen. Een jaar of tien geleden heb ik het plan opgevat 't Gooi (s.l.) floristisch eens te gaan inventariseren met behulp van de bekende IVON-streeplijsten. Dat dwong me niet alleen bepaalde gebieden regelmatig te bezoeken, doch ook alles wat er groeide op naam te brengen. Door de grote variatie van biotopen kreeg ik hierdoor een wat betere soortenkennis van de Phanerogamen.

Van de Cryptogamen had ik toen nog weinig kaas gegeten. Dat was jammer, want mossen bijvoorbeeld kwam ik bijna overal tegen. Dank zij echter de Bryologische Werkgroep van de KNNV kon ik de studie van de mosflora een jaar of wat geleden krachtig ter hand nemen. En daarvan heb ik nooit spijt gehad. Integendeel: ik kon nu tenminste ook de mossen gaan noteren. Dit inventarisatiewerk heeft de laatste paar jaar wat aardige vondsten opgeleverd, al zijn het dan niet zulke enorme ontdekkingen.

Een gebied waar ik vaak kom is de kuststrook tussen Naarden en Oud-Valkeveen. Langs de kust ligt een rietmoeras, dat landinwaarts overgaat in een min of meer kalkhoudende zanddijk. Eigenlijk is het meer een talud, waar de Meent weer op aansluit. Op dit dijkje groeit onder meer de Blauwe Zeedistel en de Kruisdistel. Van dit gebied heb ik al meer dan 200 hogere planten kunnen aanstrepen op mijn hoklijst. Daarnaast ook een 25-tal mossen. Op het talud staat veel *Hypnum cupressiforme* var. *lacunosum*. Tussen het riet is *Calliergonella cuspidata* zeer algemeen. Een paar jaar geleden had ik echter het geluk daar ook *Eurhynchium speciosum* te vinden. Aanvankelijk twijfelde ik nog aan de juistheid van mijn determinatie (de soort schijnt in Nederland zeer zeldzaam te zijn), doch op een van de Amsterdamse werkavonden van de Bryologische Werkgroep heb ik de vondst laten controleren. Het is inderdaad *Eurhynchium speciosum*. Ik moet dit gebied nog verder uitkammen, want het zit vol verrassingen. Vorig jaar vond ik er onder elzen tientallen exemplaren van de mooie paarse fungus *Lactarius lilacinus*.

"Over-Holland" langs de Vecht is ook nog steeds een trekpleister. Dit gebied kunnen we eigenlijk niet tot 't Gooi rekenen.