Jan G. Sloff • Bergen op Zoom

Floristische Vondsten te Oisterwijk.

Hoe bekend Oisterwijk ook mag zijn als vacantie-verblijfplaats en hoe vaak daar in de buurt ook door excursies en kampen gezocht is, tot heden heeft nog nooit iemand het ondernomen een lijst samen te stellen en te publiceren van de daar gevonden planten. Het enige, dat zowat dienst kan doen, is het overzicht van de resultaten van de excursie naar Oirschot door de Ned. Botanische Ver. in de zomer van 1941, welk overzicht thans in druk is voor het Nederl. Kruidkundig Archief van 1942. Verder kunnen we op het Rijksherbarium te Leiden nog vergelijken met de manuscriptgegevens, bijeengebracht door de I.V.O.N., waar de verspreiding per „kwartierhok" van ruim 1 vierk. K.M. op kaartjes is ingetekend met aanvullende gegevens, aan de literatuur ontleend.

Als we onze vondsten uit 1942 daarmee vergelijken, dan blijkt, dat we verschillende minder algemene planten weer hebben teruggevonden.

In het Staalbergven bleek het biesvarentje (*Isoëtes lacustre fm. rectifolium*), dat daar het eerst voor opgegeven is in 1921 door Thijsse in D.L.N. 26 blz. 342, nog steeds voor te komen. De eerste keer, dat we in het vrij koude water daar een duikje namen, brachten we alleen oeverkruid (*Litorella uniflora*) boven, de tweede keer troffen we de juiste plek en kregen we, behalve *Lobelia*, ook hele weiden van Isoëtes onder de voeten en dus ook in handen.

Grasachtig Fonteinkruid *(Potamogeton gramineus)* voor Oisterwijk bekend door vondst van Posthumus in 1897 (herb. Ned. Bot. Ver.) en opgaven van Heinsius in 1918 en Heimans in 1921, werd weer teruggevonden.

De zeldzame Langbladige Zonnedauw *(Drosera anglica)*, die in 1910 voor Oisterwijk genoteerd is door de excursie van de Ned. Bot. Ver., en die later nog door Kruseman en door Thijsse is opgegeven, is ook weer verzameld en wel bij het Belversven, dus wat oostelijker dan vroeger.

In 1936 is door Thijsse voor Oisterwijk genoemd het zeldzame Stofzaad (*Monotropa Hypopitys*). Wij konden ex. terugvinden bij het Brouwkuipven.

Een heel oude vondst uit de omgeving van het kamp was het Genadekruid (*Gratiola officinalis*). Die plant is in 1874 door van der Sande Lacoste verzameld in de Beerse te Spoordonk, dat is

tussen Moergestel en Oirschot. In 1941 is die plant precies op dezelfde plek teruggevonden door de excursie van de Ned. Bot. Ver. Ook tijdens ons kamp hebben we de plant weer gezien. Het op dezelfde plek groeiende Rijstgras *(Leersia oryzoides)* was tijdens het kamp nog niet in bloei; eind Augustus heb ik het er wel gezien.

Een aardige vondst was ook die van de kamilsoort *Anthemis mixta*. Sinds geruime tijd wordt die zo hier en daar adventief gevonden, maar sinds een jaar of vijf is die plant van Noord-Limburg uit bezig westwaarts op te dringen langs weg- en akkerranden. Wij vonden ex. op twee plekken beoosten Oisterwijk.

Nieuwe vondsten voor de omgeving deden we ook tijdens het kamp. Zo troffen we bewesten het Belversven vrij talrijk witbloeiende ex. aan van het Smalbladige Wilgeroosje *(Epilobium angustifolium fl. alb.)* In 1917 verzamelde ik precies op dezelfde plek wilgeroosjes voor mijn herbarium. Toen waren er geen witbloeiende te vinden !

Ten slotte vallen nog twee mooie vondsten te vermelden, die tijdens het kamp zijn meegebracht, maar waarvan ik de juiste vindplaats niet weet. Willen deelnemers, die zich daarvan nog iets herinneren, mij dat opgeven, liefst met een kaartschetsje erbij! Dat betreft de Lavendelheide *(Andromeda polifolia)*, die ergens beoosten de Beerse is gevonden. En dan de Marjolein *(Origanum vulgare)*, die bij Oisterwijk wel verdwaald lijkt. In het Krijt- en Löss-district van Zuid Limburg is de soort algemeen, in het Fluviatiele district van Nederland komt hij plaatselijk veel voor, maar in het Kempische District is de plant een vreemde verschijning. Daar hoort de Lavendelheide meer thuis !

J. Daams • Eindhoven

De mycologie in het Leiderskamp.

Het vochtige weer in de weken voor het Leiderskamp heeft er toe bijgedragen, dat de zwammenflora voor den tijd van het jaar zich buitengewoon ontwikkeld had. Tijdens de excursies hebben we dan ook veel gezien, terwijl de tentoonstellingstafel steeds blijk van de groote verscheidenheid gaf.

De excursies tijdens het kamp hadden het voordeel,dat het aantal soorten niet zoo overstelpend groot was, als tijdens het echte seizoen. Dan verliest de beginner gauw zijn hoofd, bij het zien van zooveel variatie. Nu was er een beperkt aantal soorten, dat we telkens weer zagen.