tussen Moergestel en Oirschot. In 1941 is die plant precies op dezelfde plek teruggevonden door de excursie van de Ned. Bot. Ver. Ook tijdens ons kamp hebben we de plant weer gezien. Het op dezelfde plek groeiende Rijstgras *(Leersia oryzoides)* was tijdens het kamp nog niet in bloei; eind Augustus heb ik het er wel gezien.

Een aardige vondst was ook die van de kamilsoort *Anthemis mixta*. Sinds geruime tijd wordt die zo hier en daar adventief gevonden, maar sinds een jaar of vijf is die plant van Noord-Limburg uit bezig westwaarts op te dringen langs weg- en akkerranden. Wij vonden ex. op twee plekken beoosten Oisterwijk.

Nieuwe vondsten voor de omgeving deden we ook tijdens het kamp. Zo troffen we bewesten het Belversven vrij talrijk witbloeiende ex. aan van het Smalbladige Wilgeroosje *(Epilobium angustifolium fl. alb.)* In 1917 verzamelde ik precies op dezelfde plek wilgeroosjes voor mijn herbarium. Toen waren er geen witbloeiende te vinden !

Ten slotte vallen nog twee mooie vondsten te vermelden, die tijdens het kamp zijn meegebracht, maar waarvan ik de juiste vindplaats niet weet. Willen deelnemers, die zich daarvan nog iets herinneren, mij dat opgeven, liefst met een kaartschetsje erbij! Dat betreft de Lavendelheide *(Andromeda polifolia)*, die ergens beoosten de Beerse is gevonden. En dan de Marjolein *(Origanum vulgare)*, die bij Oisterwijk wel verdwaald lijkt. In het Krijt- en Löss-district van Zuid Limburg is de soort algemeen, in het Fluviatiele district van Nederland komt hij plaatselijk veel voor, maar in het Kempische District is de plant een vreemde verschijning. Daar hoort de Lavendelheide meer thuis !

J. Daams • Eindhoven

De mycologie in het Leiderskamp.

Het vochtige weer in de weken voor het Leiderskamp heeft er toe bijgedragen, dat de zwammenflora voor den tijd van het jaar zich buitengewoon ontwikkeld had. Tijdens de excursies hebben we dan ook veel gezien, terwijl de tentoonstellingstafel steeds blijk van de groote verscheidenheid gaf.

De excursies tijdens het kamp hadden het voordeel,dat het aantal soorten niet zoo overstelpend groot was, als tijdens het echte seizoen. Dan verliest de beginner gauw zijn hoofd, bij het zien van zooveel variatie. Nu was er een beperkt aantal soorten, dat we telkens weer zagen.

Ik wil hier niet een opsomming geven van al de soorten, die we gevonden hebben. Slechts enkele wil ik noemen.

Van de aardige vondsten wil ik noemen : *Rhizina inflata*, de oliebolzwam, die ditmaal op een brandplek gevonden is, hoewel ik hem hier nogal eens op levende dennen aantrof. Deze zwam komt in Brabant veel voor.

Een andere typische Ascomyceet was *Macropodia macropus*, het schoteltje-op-steeltje, die we vonden langs de Rozep. *Plicaria badia*, de groote bruine bekerzwam, vonden we op verscheidene plaatsen, bij voorkeur in greppels.

In greppels vonden we ook heel veel het mooie witte trechtertje, *Omphalia scyphoides*, dat volgens Cool en v. d. Lek niet algemeen is, maar dat ik hier elk jaar in groote aantallen op tallooze plaatsen aantref.

Mooi was ook een groot exemplaar van *Daedaleopsis confragosa*, de roodporie-houtzwam.

Zoo waren er meer aardige zwammetjes : *Marasmius scorodonius*, de knoflookhoornsteel ; *Tremella mesenterica*, de gele trilzwam; *Pluteus cervinus*, de mooie rose sporige hertenzwam ; *Calocera viscosa*; *Clavaria cristata*, de korrelige Hertentruffel, *Elaphomyces granulatus ;* bij toeval gevonden natuurlijk, evenals *Rhizopogon rubescens*, een schijntruffel, met zijn typische in roseroodachtige gangen verdeeld vruchtlichaam, dat we uit een greppelrandje peuterden.

Niet te vergeten verder de kleine stinkzwam, *Mutinus canius*, benevens de groote stinkzwam, *Phallus impudicus* en de prachtige gele *Russula claroflava*, die we vlak bij de vennen vrij veel aantroffen.

Er is ook duchtig met ijzersulfaat gewerkt, om *Russula cyanoxantha* en *xerampelina* te onderscheiden van de rest van het welbekende nekbrekende geslacht Russula.

Opvallend veel mooie tolzwammen hebben we gezien. In groote hoevelheden troffen we aan : *Amanita rubescens, Amanitopsis vaginata* en *Boletus variegatus*. Er zijn trouwens veel Boleten gevonden. Ik noem ze hier op : *Boletus badius, édulis, élegans, granulatus, lureus, miniatoporus, piperatus, rufus, scaber, subtomentosus, variegatus*. Dat is een niet gering aantal.

Er is verder een prachtexemplaar gevonden van *Polyporus elegans*, dat zijn naam werkelijk eer aandeed. Dit is en vrij zeldzame zwam in ons land.

De mycophagen onder ons hebben natuurlijk genoten van de Cantharellen, die, hoewel ze niet overvloedig voorkwamen, toch door de ijverig speurende liefhebbers in voldoende hoeveelheid meegenomen zijn.

Opvallend veel slijmzwammen vonden we ook. Helaas waren we niet in staat om ze te determineeren. Vooral de gele massa's, die door de bevolking met den naam „heksenboter" worden aangeduid, zagen we veel. Die zouden - 't is een onsmakelijk verhaal - ontstaan zijn tijdens de nachtelijke festijnen van de heksen, die daarbij zooveel eten naar binnen hadden geslagen, dat zij op de terugweg door de lucht vliegende misselijk geworden, de spijzen weer uitbraakten. Vandaar de vreemde plaatsen, waar men deze slijmzwammen aantreft. Lees er Teirlinck's „Flora Magica" maar eens over na.

Wat het mycologische deel van het Leiderskamp betreft, kunnen we wel tevreden zijn. In totaal hebben we ± 100 soorten gevonden, die gemakkelijk te determineeren waren met het Paddenstoelenboekje van Cool en van der Lek, met Ricken's Vademecum en met Ricken's Blätterpilze.



Kolkven te Oisterwijk.

(*Foto Mej. Els de Vries*)

Wim Margadant • Aerdenhout
Dr. R. v. d. Wijk • Groningen

De Vegetatie van het Vennenlandschap.

Hoewel elk ven zijn eigen bijzondere bekoring heeft, bestaande uit de dikwijls verrassende ligging in het landschap en de gevarieerde vegetatie, zijn een aantal vennen samen te vatten. Zo werd