


tijd om een en ander nauwkeurig te volgen — nogmaals enkele hagedissen en kikkers opgenomen, wat wij door een merkbaar toenemen van de lichaamsomvang en het verdwijnen van de slachtoffers konden vaststellen. Voordien was het ons — ondanks herhaalde pogingen — nimmer gelukt een adder tot voedselopname te bewegen. Wel hebben we de ervaring opgedaan, dat het voeren van levende muizen tot gevolg kan hebben, dat de muis de adder doodt of zelfs verslindt, hetgeen trouwens overeenstemt met de ervaring van anderen.

Hoewel onze waarnemingen aan etende slangen op verschillende punten afwijken van dat wat er in de literatuur vermeld is, moeten we hierbij niet uit het oog verliezen, dat beide slangen hongerig waren en bovendien geprikkeld door elkaars aanwezigheid, waardoor de vlotte voedselopname eventueel wel verklaarbaar wordt.

P. Vroegindeweij
A. K. Vogelaar

Insectenbezoek op rondbladig wintergroen



De flora van Heimans, Heinsius en Thijssse vermeldt van deze plant (*Pirola rotundifolia*), dat ze zelden door insecten wordt bezocht, en er meestal zelfbestuiving plaats vindt. Ook E. Heimans zegt in zijn boekje „In de Duinen”: „Zou ik nu eindelijk eens een bestuiver kunnen bespeuren? Honderd maal heb ik er geduldig bij zitten wachten, nog nooit heb ik een vlieg of bij of wesp, of welke bloembestuiver ook er op zien neerstrijken” en even verder vervolgt hij: „Andere natuurvrienden zijn gelukkiger geweest, die hebben wel zo nu en dan een zweefvlieg of hommelt de *Pirola* bloemen zien bestuiven”.

Dit geluk viel ons op 8 aug. j.l. ten deel toen wij aan het Groene strand van Voorne een Aardhommel (*Bombus terrestris*) de bloempjes van *Pirola* zagen bezoeken. En geen vluchtig bezoekje, neen, de hommelt werkte rustig bloempje na bloempje af, ijverig het stuifmeel verzamelend.

Jammer dat wij vanwege onze tijd daar niet lang konden verblijven. We hadden er zo graag een uurtje aan besteed om te zien of het bij deze ene hommelt is gebleven.