

zijn, worden ze thans op het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek te Wageningen nader bestudeerd. In het kader van dit onderzoek zullen gegevens omtrent het voorkomen en de mate en wijze van optreden in ons land bij klaver, maar ook bij andere plantesoorten, zeer welkom zijn. Eventueel wordt ook gaarne levend of gedroogd materiaal ter verificatie van de oorzaak ontvangen.

Het adres van de schrijver is: Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, Binnenhaven 4a, Wageningen.

LITERATUUR

BECKER, R. — 1941. Untersuchungen über die Blüh- und Befruchtungsverhältnisse und die Blütenmissbildungen des Weissklee (*Trifolium repens* L.). Der Futtersaatbau 1 (4) : 33—117.

BOS, L. — 1957. Heksenbezemverschijnselen bij *Tropaeolum majus* L. Tijdschrift Planteziekten 63 : 24.

BOS, L. — 1957. Heksenbezemverschijnselen, een pathologisch-morfologisch onderzoek. Meded. Landbouwhogeschool, Wageningen 57 (1) : 1—79.

BOS, L. — 1957. Plant teratology and plant pathology. Tijdschrift Planteziekten 63 : 222—231.

DOCTERS VAN LEEUWEN, W. M. — 1957. Gallenboek, 2e dr. Zutphen.

EVENHUIS, H. H. — 1958. Investigations on a leafhopper-borne clover-virus. Proceedings 3rd Conf. Potato Virus Diseases Lisse-Wageningen 1957 : 251—254.

EVENHUIS, H. H. — 1958. De vectoren van het bloemvergroeningsvirus van klaver. Tijdschrift Planteziekten 64 : 335—336.

PENZIG, O. — 1921—1922. Pflanzen-Teratologie, 2e Aufl. Berlin.

SCHOLTEN, E. J. H. — 1904. Vergroende bloemen. De Levende Natuur 8 : 211—213.

VRIES, H. DE — 1896. Een epidemie van vergroeningen. Bot. Jaarboek Gent 8 : 66—91.



B. J. Wieland Los:

Over het vroegere voorkomen van *Veronica* in ons land

In het artikel van de heer Clason over onze *Veronica*'s in het januari-nummer 1959 staat o.a. vermeld, dat van dit geslacht, voor zover hem bekend, in ons land nog geen (sub)fossiele vondsten zijn gedaan. Dit is nu echter wel het geval. Dr Beyerinck vermeldt nl. in deel I van zijn werk *De subfossiele plantenresten in de terpen van Friesland en Groningen* (1929) een zaad van akkerereprijs (*Veronica agrestis* L.), dat hij aantrof in het bovenste gedeelte van de terp te Arum (tussen Franeker en Bolsward gelegen). Helaas weten wij niet goed hoe oud de vondst-laag is.

Zelf kwam ik tijdens mijn palaeobotanische onderzoekingen tussen Noordwijk en Petten *Veronica* ook slechts zelden tegen, nl. één zaad in een humeuze laag op het voormalige buiten „Rooswijk” te Velsen en twee zaden in een post-Middeleeuwse IJ-afzetting (veenslik) op het tunnelterrein in dezelfde gemeente. De soort- c.q. groepsbepaling moet in beide gevallen nog geschieden.