


Maandblad van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
gevestigd te Amsterdam

De grauwe franjepoot (*Phalaropus lobatus*)

Op de slikkige oevers van één der poelen op de heide van Deurswoude, het grote heideveld in de Friese wouden, ontdekten wij op de zonnige morgen van 22 juni j.l. dit kwieke, kleurige vogeltje. Door de kijker waren de aftekeningen van zijn mooi zomerkleed duidelijk te onderscheiden, de grijswitgestreepte rug, de witte hoog opgeheven stuit als het beestje zwom, de prachtig warme bruine hals met de grote witte keelvlak. Met de fijne half lange priemsnavel werd de oever en de ondiepe oeverkanten nauw-



De Franjepoot in zomerkleed

Tekening: M. J. C. Kolvoort

keurig afgezocht. Alles vlug en beweeglijk, lopend en zwemmend. Er was een tweetal, vermoedelijk een paartje, maar onderscheid tussen de geslachten was niet waar te nemen. Het was de eerste maal, dat ik dit sierlijke vogeltje in onze streken (dat is het Friese land) heb waargenomen. Volgens de Vogelgids ligt zijn broedgebied in de toendra's, rond de Noordelijke IJszee, op IJsland en de Faroër, het noordelijk deel van Ierland en rond de Finse Golf. Is dan reeds in juni de broedtijd voorbij? Of zouden dit éénjarige vogels zijn, die pas na de tweede winter tot broeden komen?

Drachten, 26 juni 1967

D. Joustra