

Nachtegalen en terreinbehandeling

Enige tientallen jaren behandel ik de hoge zandheuvel van het Bio-Vacantieoord in Bergen aan Zee, het z.g. Russenduin.

Vroeger was dit kaal, daarna, vóór mijn tijd, is het met dennen beplant, die eerst goed groeiden maar het nu afleggen tegen de zeewind en de dennenscheerder. Om te voorkomen, dat het terrein voor de vacantiëkolonie niet 'onleefbaar' wordt, tracht ik, niet zonder succes, het afstervende naaldhout om te zetten in loofhout.

Daarvoor is grondverbetering nodig want de gewone duinheesters vragen een voedselrijker grond, waaronder kalk, dan in dit arme duinzand aanwezig was. Meer naar het zuiden zit van nature meer schelpgruis in het zand, ten noorden van Bergen aan Zee begint het kalkarme 'Waddendistrict'. Hulp heb ik in dit opzicht gehad van een installatie voor de zuivering van het rioolwater, die plaatselijk wel eens van het goede te veel gaf: manshoge brandnetels, die hier en daar, later in de zomer wel eens gemaaid werden. Sproeien met herbiciden was hier, gelukkig, niet nodig.

Het gevolg van dit alles is geweest, dat de bewoners van de Fasantenlaan (die langs het terrein loopt) de nachtegaal, die verdwenen was aan de westkant van Bergen aan Zee waar het dennenbos niet hersteld werd, deze nu horen ten oosten van die laan, op het terrein van het Bio-Vacantieoord. Hoewel nog jong, is het bostype een weinig te vergelijken met het Ulmion, het Iepenverbond, dat elders langs de binnen-duinrand aanwezig is en waar de nachtegaal voorkomt.

Kan deze waarneming bijdragen tot onze kennis over de achteruitgang van de nachtegaal? Want de nestkastjes, die opgehangen zijn kunnen de nachtegaal als grondbroeder natuurlijk niet geholpen hebben.

Wordt in veel parken het terrein niet te 'netjes' gehouden en wordt niet in veel gevallen onnodig gespreid?

Over het verband tussen het een en ander zou ik graag het oordeel horen van een kenner van de biologie van de nachtegaal. Want de voedselbron van deze soort, de insectenfauna, moet toch ook gunstig beïnvloed zijn door een andere, rijkere vegetatie. Zou het aanbeveling verdienen er bepaalde insecten, als mieren te brengen in dit geïsoleerde terrein, ook om de vertering van het strooisel te bevorderen? Ook hierover graag het oordeel van een kenner van deze materie.

Rockanje

C. Sipkes

Problemen rondom de Lepelaar

Bij alle vogelaars is het genoegzaam bekend, dat het er met de broedvogelstand van de Lepelaar in ons land helaas niet rooskleurig voorstaat. In verband hiermee zijn wij reeds jaren geleden begonnen een onderzoek in te stellen naar de mogelijke oorzaken van deze achteruitgang. Hierbij bleek onder meer belangrijk, waar de vogels tijdens hun verblijf in ons land buiten hun broedkolonies verblijven.

Om ons inzicht te verruimen richten wij een

vriendelijk verzoek tot u ons te melden, waar u in het jaar 1970 buiten de broedplaatsen Lepelaars op rust- en fourageerplaatsen hebt aangetroffen, met vermelding van datum, aantallen en eventuele andere bijzonderheden.

Vooraf de waarnemingen vanaf juli tot de herfsttrek zijn ons zeer welkom. U kunt ons zeer gerieven uw bevindingen te sturen naar het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, afd. Zeist, Laan van Beek & Royen 40-41 t.a.v. J. J. C. Tanis.