

hadden verwacht, en daarmede was onze jachtdag besloten en namen we de terugtocht aan, met magere buit, met een nat pak, maar wat mij althans betreft, met een aangename herinnering aan al 't geen ik die dag had gezien. Als ik eens in de

gelegenheid kom, zei ik tot mijzelve, ga ik er des zomers heen voor die rietzangers. Tot dusverre heeft die gelegenheid zich echter niet voorgedaan.

Doorn, 21 Juli 1897.

MR. R. BARON SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG.



Bekende groeiplaatsen der tot de bijgenoemde familiën behorende planten.

Familie Hypericineeën.

1. Hypericum.

H. humifusum L. Op drogen zandgrond. Limburg (vrij alg.), Vucht, Eindhoven, Oudenbosch (alg.), Werkendam, Nijmegen (Berg en Dal, Beek, St. Anna, Heumen, Malden, Groesbeek, Hatert), Arnhem, Velp, Rheden, Brummen, Zutphen, Wolfheze, Terborg, Varsseveld, Winterswijk, Lochem, Apeldoorn, Beekberger woud, Voorthuizen, Epe, Wissel, Harderwijk (Heerden, 's Heerenloo, Hulshorst), Utrecht, Zeist, Maarsbergen, Deventer, Delden, Borne, Haaksbergen, Heemze, Steenwijkerwold, Friesland; Noordwijkerhout, Walcheren, Hulst.

H. perforatum L. Droge grasgrond, aan wegen. Overal en algemeen, doch niet op de Noorzee-eilanden.

H. quadrangulum L. Aan slootkanten en op beschaduwde, vochtige plaatsen. Limburg (vrij alg.), den Bosch, Hilvarenbeek, Eindhoven, Breda (Liesbosch, Ulvenhoutse bosch), Nijmegen (Ubbergen, Beek), Brummen, Twello, Achterhoek (Terborg, Winterswijk), Apeldoorn (Beekbergen, Ankelaar), Harderwijk (Hulshorst), Doorn, Colmschate, Delden, Haaksbergen, Langelo, Kampen, Zalk, Steenwijkerwold, Gramsbergen, Anerveen, Meppel, de Wouden in Friesland, Zuid Beveland.

H. tetrapterum Fr. Aan slootkanten, op vochtige moerasige plaatsen. Algemeen en overal.

H. pulchrum L. Op beschaduwde droge plaatsen. Limburg (vrij alg.), Breda (Liesbosch, Ulvenhoutse bosch), Nijmegen (Beek, Groesbeek, Wijchen, Hatert, Malden, Heumen, Ubbergen, Berg en Dal), Velp, Beekhuizen, Bosschen van Doreweerd en Staveren, Ederbosch, Terborg (Paascheuvel), Winterswijk (Willinkhof), Apeldoorn (langs rijweg Soerensche bosch bij tol Hoenderloo), Loenen, Garderen bij Barneveld (Speelderbosch), Deventer, Zwolle, Hellendoorn, Tankenberg, Staphorstse bosch, Havelterberg, Gieten, Bosch v. Rijn (Gaasterland), Oude Mirdum en Sondel, Oost Zeeuwsch Vlaanderen.

H. montanum L. Op beschaduwde, droge grond. Gulpen, Wijre, St. Pietersberg, Valkenberg, Hussenberg, Bissen, Meerssen, Bunde, Nijmegen (Hengstdal), Molengang, huis te Ubbergen), Arnhem, Wageningsche berg, Doreweerd, Hoenderloo.

H. hirsutum L. Op drogen, hoogen boschgrond. Gulpen, Wijre, Valkenburg, Gronsveld, Meerssen, Bunde, Sittard, Mook, Beugen, Boxmeer, Gassel, Nijmegen (Kasteel te Heumen), Zutphen (Wildenborch).

H. Elodes L. Moerassige veenstreken. Bergen, Stamprooi, Venraai, Velden, Arcen, Well, Boxmeer (heide te St. Antonie), Vucht, Oosterwijk, Eindhoven, Breda (Galdersche heide), Oudenbosch (alg.), Nijmegen (Wijchensche venen, Hatertsche broek, slootkanten te Wijchen), Voorst, Terborg, Zevenaar, Doetinchem, Varsseveld, Winterswijk, Lichtevoorde (zwarte veen bij Harreveld), Eibergen, Ruurlo, Lochem, Staveren, (Princenmeer), Apeldoorn (Beekbergen, Zutphense weg, Bleekermeer te Uttel), Woudenberg, Maarn, Maarsbergen, Deventer, Almelo, Borne, Oele, Lutte, Oldenzaal, Hardenberg, Loozen, Oranjewoud, Bergumerheide, Veenwouden, Hilversum (meent), Oost Zeeuwsch Vlaanderen.

Familie Frankeniaceeën.

1. Frankenia.

F. pulverulenta L. Zandgronden naar de zeekust. Alleen bij Leiden op steenhoopen aan de Spanjaardbrug en bij Zwijndrecht gevonden.

Familie Elatineeën.

1. Elatine.

E. Hydropiper L. Op moerassige plaatsen, aan sloot- en rivierkanten. Bosch (fort Isabel), Cromvoort, Vlijmen, Groot Deuteren, Oosterhout, Raamsdonk, Zeist, Driebergen, Oudwijk (Ezelsdijkje), Dordrecht (Merwede), Papendrecht, Sliebrecht, Krimpen aan de Lek.

E. triandra Schk. Vindplaatsen als de vorige. Alleen bij Dordrecht (Merwede), Papendrecht, Sliebrecht en Krimpen aan de Lek gevonden.

E. hexandra D. C. Vindplaatsen als de vorige. Bosch (fort Isabel), Spoordonk (langs de Beers), Uddelermeer, kanaal van Apeldoorn naar Dieren en naar Vaassen, Epe (plas achter het kerkhof), Kootwijk (grijze veen).

Familie Malvaceeën.

1. Malva.

M. Alcea L. Op ruige plaatsen, langs wegen en dijken. Meerssen, Beek, Elsloo, Mook (Maasdijk), Oudenbosch (zeldz.), Nijmegen (Beek, Heumen, Waaldijk te Weurt, Kweldam en Warthuiserstraat te Beuningen), Deventer, Katwijk (kanaal), Vianen (Hagestein).

M. moschata L. Op grazige en ruige plaatsen, aan heggen. Zuid Limburg (krijtheuvels), Breda (wallen), Nijmegen (Oosterhoutse bosch, Beek, Ubbergen, Ooische waard, Lent), Elst, Brummen (weilanden aan den IJssel), Bilt, Doorn, Ter Heel (Dr.), Goutum (Galamastate), Nieuwersluis (batterijen), Katwijk (kanaal), Leiden, Haagsche schouw, Blauwkapel, West Zeeuwsch Vlaanderen (zeldz.).

M. crispa L. Verwilderd bij Dockum en Haarlem (Spaarne). *M. sylvestris* L. Aan dijken, langs wegen, op bouwland en bij menselijke woningen. Overal en algemeen.

M. vulgaris Fr. Op dezelfde plaatsen als de vorige. Overal en algemeen.

M. rotundifolia L. Onbebouwde plaatsen, langs wegen. Maastricht (St. Antoniusseiland), Blerik, Utrecht, Deventer, (Pothoofd), Haag, Middelburg (terrein Meelfabriek).

2. Althaea.

A. officinalis L. Moerassige plaatsen naar den zeekant. Vollenhove, Schokland, Franeker, Marken, Koog aan de Zaan, Diemen, Amsterdam (Y), Gorkum, Rockanje (meertje), geheel Zeeland beh. St. Philipsland.

A. hirsuta L. Op kalk en mergelgrond. Bij ons alleen aan de oevers van de Waal en bij Hilligersberg (wegkant langs de Rotte, aan de zijde van het weiland).

3. Hibiscus.

H. Trionum L. Aan het Pothoofd te Deventer gevonden.

Familie Geraniaceeën.

1. Geranium.

G. rotundifolium L. Aan wegen, op ruige plaatsen. Maastricht, St. Pietersberg. Apeldoorn (opslag in den tuin Marocco).

G. phaeum L. Boschachtige streken, bij ons misschien alleen verwilderd, Maastricht, Boxtel, Utrecht, Maarssen (Timmermanslaan), Breukelen (Nijenoord), Huis te Zuilen, Montfoort, Ittersum bij Zwolle, Groningen, Cornjum, Wieuwerd, Leeuwarden (Princetuin), Heemstede (bosschen), Leiden, Walcheren.

G. pratense L. Beschaduwde, grazige plaatsen. Vucht, Hees, Kuilenburg (zeldzaam), Zutphen, Gorsel, Baarn, Utrecht, Zeist (Wulvenhorst), Jutphaas, Zwolle, Kampen, Friesland, Haarlemmerhout, Delft, Dordrecht, Vianen, Zwijndrecht, Walcheren, Zuid-Beveland.

G. sanguineum L. Behoort thuis op zonnige berghellingen. Bij ons alleen St. Pietersberg (kasteel van Castert), Bunnik (aan den Krommen Rijn).

G. dissectum L. Op bouwland, aan wegen, slootkanten. Limburg (alg.), den Bosch, Oudenbosch (alg.), Nijmegen (Oosterhoutsche bosch, sloot te Beuningen), Winterswijk, Apeldoorn (zeldz.), Utrecht, Maarssen, Wijhe, Raalte, Kampen, Vollenhove, Meppel, Wollega, Hardegarijp, Leeuwarden, Schiermonnikoog (bij het dorp), Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel, Wieringen, Velzen, Haarlem, Amsterdam, Leiden, Haagsche bosch, Dordrecht, Brielle, geheel Zeeland.

G. columbinum L. Op zandgrond. Gulpen, St. Pieterberg, Maastricht, Valkenburg, Utrecht (Vossegat), Deventer, Franeker, Haarlem, Leiderdorp, 's Gravensande (korenland), Zuid-Beveland, Zeeuwsch-Vlaanderen.

G. pyrenaicum L. Aan wegen en spoorlijnen (aangevoerd). Maastricht (Maasdijk bij de grens), Kuilenburg (Lekdijk), Leeuwarden (vuilnishoop achter de haven), Overveen (Duinvlief), Piet Gijzenbrug (station), Leiden.

G. pusillum L. Op ruige plaatsen en vochtigen zandgrond. Limburg (vrij alg.), Eindhoven, Oudenbosch (alg.), Zutphen, (bouwland), Terborg, Apeldoorn, (vrij alg.), Harderwijk, (vrij zeldz.), de Bilt, Hoorn, Deventer, Delden, Wijhe, Kampen, Kallenkote, Meppel, Koevorden, Groningen, Friesland, (o. a. Wollega), Schiermonnikoog (dorp), Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel, Urk, Heilo, Alkmaar, Velzen, Heemstede, Haarlem, Amsterdam, Hilversum, 's Graveland, Leiden, Westland, Voorne (zeldz.), geheel Zeeland, behalve Tholen.

G. molle L. Aan wegen en dijken, op bouwland. Limburg (vrij alg.), den Bosch, Oudenbosch, (alg.), Nijmegen, (alg.), Kuilenburg, Terborg, Eibergen, Apeldoorn, Harderwijk (alg.), de Bilt, Wijhe, Tongeren, Delden, Oldenzaal, Hengelo, Steenwijkerwold, Kallenkote, Rottum, Schiermonnikoog (dorp), Terschelling, Vlieland, Texel, Urk, Wieringen, Alkmaar, Heilo, Kennemerland, Bloemendaal, Amsterdam, Leiden, Westland, Voorne, geheel Zeeland.

G. lucidum L. Droge, beschaduwde gronden. Zeist, Driebergen (over bosch van Dennenburg), Breukelen (Nijenoord, Vechtvliet), Hilversum.

G. Robertianum L. Beschaduwde, grazige plaatsen op zandgrond. Limburg (alg.), den Bosch, Oudenbosch, Bergen-op-Zoom, Nijmegen (alg.), Winterswijk, Groenlo, Eibergen, Borculo, Apeldoorn, (zeldz.), Epe, Harderwijk, (niet zeldz.), Tongeren, Delden, Bakkum, Woolde, Twikkel, Borne, Nieuwkerkerveen, Oldenzaal, Poppe, Steenwijkerwold, Wieringen, (tusschen Westerland en Hipolitushoef), Bergen, Heilo, Alkmaar, Kennemerland, Leiden, Westland, Voorne, (alg.), geheel Zeeland.

2. Erodium.

E. malacoides Willd. Op onbebouwde plaatsen. Alleen gevonden achter Clingendael bij den Haag.

E. cicutarium L'Herit. Op zandige akkers en grazige plaatsen. Limburg (alg.), Vucht, Oudenbosch (alg.), Nijmegen (alg.), Wageningsche berg, Terborg, Winterswijk, Groenlo, Eibergen, Lochem, Voorst, Apeldoorn (klaverland), Harderwijk (vrij alg.), Heino, Delden, Hengelo, Tankenberg, Zwolle (Konijnenbelten), Kampen, Steenwijkerwold, Ane, Koevorden, Dalen, Emmen, Wollega, Teritsert, Schiermonnikoog, Ameland, Terschelling (vuurtoren, Grie), Vlieland, Texel, Wieringen, Urk, algemeen en overal in de duinstreek, Amsterdam (Parkweg), Hilversum, Piet Gijzenbrug (station), Brielle, geheel Zeeland beh. St. Philipsland.

E. cicutarium a. pimpinellifolium Willd. Baarlo, Blerik, Velden, Hamert, Nijmegen, Apeldoorn, Delden, Haaksbergen, Vollenhove, Eeze, Terschelling, Alkmaar, Heilo, Amsterdam (buiten de Muiderpoort), Rozenburg.

E. moschatum L'Herit. Op onbebouwde plaatsen. Utrecht, Zwolle (achter den Kranenburg), Heemstede (bij binnen-duinen), Leiden, 's-Hage (duinen), Schouwen, Duiveland (zeldz.), Wissekerke (heggen).

Familie Oxalideeën.

1. Oxalis.

O. Acetosella L. In vochtige boschachtige streken. Limburg, (alg.), Nijmegen, (Beek, Ubbergen), Arnhem, (achter Sons-

beek), Velp, Doetinchem (Montferland), Lichtevoorde, Winterswijk (Willinkhof), Wolfhezen (Bosch), Apeldoorn (Loo, Beekbergen), Harderwijk (Essenburg), Amersfoort (Heiligeberg), Heino, Delden, Hengelo, Oele, Bakkum, Brinkhuis, Twikkel, Oldenzaal, Heemse, Ane, Meppel, (Staphorstsche bosch), Weerdinge, Heerenveen, Bontebok, Oldeberkoop, Rijnsburg, Haagsche bosch, Koudekerke.

O. stricta L. In bouwland, vooral in moestuinen, ook in heggen. Limburg (vrij alg.), Hintham, Oudenbosch (alg.), Nijmegen, Terborg, Winterswijk, Groenlo, Lochem, Apeldoorn, Harderwijk, Doorn, Deventer, Delden, Hengelo, Borne, Hasselo, Weinsthag, Oldenzaal, Kampen, Steenwijkerwold, Giethoorn, Gramsbergen, Meppel, Koevorden, Zwinderen, Hoogeveen, Mildam, Vlieland, Alkmaar, Heilo, Blaricum, Hilversum, Leiden, Schouwen, Duiveland, Tholen, Walcheren, Zuid Beveland, Zeeuwsch Vlaanderen.

O. corniculata L. In moestuinen. Beek, St. Jans Geleen, Oudenbosch (vrij alg.), Raalte, Wijhe, Texel, Texel, Amsterdam (moestuin Verwerspad), Zuid Beveland (Zwake), Walcheren, Axel, Hoek.

Familie Lineeën.

1. Linum.

L. catharticum L. Vochtige zand- en heigrond, ook in de duinen. Gulpen, Eidsen, St. Pietersberg, Maastricht, Gronsveld, Oud Valkenburg, Valkenburg, Meersen, Bunde, Beek, Elsloo, Sittard, Plasmolen (veenachtig weiland), Vuchtsche heide, Nijmegen, (Weurt, Oosterhout, Bommel, Neerboschebroek), Winterswijk, Apeldoorn, Wisselsche veen, Hattum, Harderwijk, (Groentjes, Oostermee, Hiendermeen), Amersfoort, Zeist, Westbroek (veen), Deventer (Brinkgreve), Diepenveen, Delden, Hengelo, Weinsthag, Hollenbergerveld, Nieuwkerkerveen, Zalk, Steenwijkerwold, Giethoorn, Meppel, Weerdinge, Rottum, Teritsert, Schiermonnikoog, Ameland, Terschelling (West Terschelling), Vlieland, Texel, Kallantsoog, Petten, Kennemerland, Haarlem, Wassenaar, Voorne, geheel Zeeland beh. St. Philipsland.

2. Radiola.

R. linoides Gm. Vochtige zand- en heidegrond. Mook (Plasmolen), Eindhoven, Vuchtsche heide, Oudenbosch (niet zeldz.), Nijmegen (Wijchen, Hatert, Heumen), Rheden, Winterswijk, Eibergen, Warnsveld, Apeldoorn (alg.), Epe, Wisselscheveen, Harderwijk (niet zeldz.), Zeist, Driebergen, Almelo, Vriezenveen, Delden, Hengelo, Bakkum, Woolde, Hasselo, Weinsthag, Haaksbergen, Lutte, Poppe, Steenwijkerwold, Kallenkote, Eesveen, Meppel, Koevorden, vele plaatsen in Drenthe, Teridsert, Schiermonnikoog, Ameland, Terschelling (Groene strand), Vlieland, Texel, Schoorl, Bergen, Hilversum, Noordwijk, Westland, Schouwen, Duiveland, Walcheren.

Familie Balsamineeën.

1. Impatiens.

I. Noli tangere L. Op beschaduwde, grazige plaatsen, in heggen. Gulpen, Kerkrade, Beek, Elsloo, Nijborg, Well, Haarsteeg, Heusden, Nijmegen (Beek, Ubbergen), Arnhem, Rheden, Middachten, Dieren, Ulenpas, Warnsveld, Zutphen, Tiel, Kuilenburg, Borculo, Raarlo, Teuge, Ermelo, Vreeland, Deventer, Terwolde, Zwolle, Delden, Twikkel, Oldenzaal, Bakkum, Kampen, Giethoorn, Meppel, Assen, Paterswolde, Wollega, Leeuwarden, Haarlem (Schalkwijk), Heemstede, Bennebroek.

I. parviflora D. C. Op ruige plaatsen. Bij ons alleen onder struiken aan een binnengracht te Kuilenburg.

Familie Polygalaceën.

1. Polygala.

P. amara L. Vochtige plaatsen. Alleen bij Vucht (heide), Harderwijk, Hartekamp, (Veluwe), aan de Slochte, tusschen Bierum en Franeker gevonden.

P. depressa Wenderoth. Op vochtigen heide- en veengrond. Vijlen, Ambij, Velden, Mook (Plasmolen, veen), Oosterwijk, Baarle-Nassau, tusschen Putten en Ossendrecht, Nijmegen (Berg en Dal), Ede; Harderwijk (Hiendermeen, Essenburg, Oostermee), Nijkerk, de Bilt (Groot Pannegat), Amersfoort, Zeist, Wezepe, Hardenberg, Gramsbergen, Valthe, Groningen en Friesland.

P. vulgaris L. Open grazige zand- en heidegrond. St. Pie-

tersberg, Valkenburg, Meerssen, Sittard, Mook (Plasmolen), Oudenbosch (alg.), Nijmegen, Terborg, Epe (Wisselsche veen), Harderwijk, Zeist, Heino, Almelo, Hengelo, Hollandsche en Zeeuwsche duinen, ook van de Noordzee eilanden, Blaricum.

P. comosa Schk. Open grazige zand- en heidegrond. Bij ons alleen uit het bosch bij Cau (Limburg) en van Terschelling bekend.

H. HEUKELS.

(Wordt vervolgd.)



M A A R T.

In de tuin

is ontzettend veel te doen. Vooreerst moet overal waar 't kan, de grond losgewoeld of omgespit worden, zonder een al te groote slachting aan te richten onder de in de grond verborgen knollen, bollen of wortelstokken. De meeste zullen zich echter wel bemerkbaar gemaakt hebben, 't is anders altijd goed, de plek, waar iets zit, door middel van een naamhoutje aan te wijzen. Zorg voor flinke bemesting en geef uw planten eens een nieuwe plaats of nieuwe aarde; ze houden over 't algemeen van afwisseling. Met snoeien en stekken kan worden voortgegaan. Maak voor 't uitzaaïen van zomerbloemen zaadbedjes van fijne, korrelige aarde gereed; zorg ook er voor dat de zaadjes met een dun laagje aarde bedekt worden; 't gaat keurig netjes met een zeefje.

De dekking wordt weggenomen van de bloembolbedden. Overal steken de geel-groene spitsen op. Na zachte winters zijn de bloemen al te zien. In 't eind van de maand bloeien al crocus, blauwe druifjes, blauwe seilla's, en als 't zacht weer is ook hyacinten, tulpen en narcissen, naast gele Primula's en blauwe of roode Hepatico's.

Papavers kunnen al gezaaid worden, en ook de zomerbloemen die de catalogi van de handelaars als daarvoor geschikt opgeven. Asters beter eerst in Mei. Op de bloemarkt zijn al goed bewortelde overjarige planten, zoo als Vergeet-mij-niet, Anjers, Aardbeien, Duizendschoon te krijgen om in de tuin over te brengen.

Ook Dahlia, knollen en liliëbollen. Gladiolus moet er nu op zijn laatst in, en de Kaapsche Hyacint (*Galtonia candicans*).

De kamerplanten

vereischen nu ook bemesting en verpotting; draag zorg voor goede draineering van de potten. Houd ook steeds wat tabakswater, zeepsop, of aftreksel van quassia-hout gereed voor het bestrijden van bladluizen, schildluizen, wol-luizen en trips.

In de kamer waar niet gestookt wordt, bloeien de late soorten van hyacinth, tulpen en narcissen. De allerlaatste en allermooiste is de witte Narcis poeticus met zijn lak-rood-gerand kroontje.

De Alpenviooltjes (*Cyclamen*) met hun vreemde op pluimbollen lijkende bloemen, zijn bijna uitgebloeid en moeten hoe langer hoe minder water hebben; maar ze mogen niet uitdrogen want in de rustperiode sterven de wortels van de knollen niet af; zooals bij vele knollen of bolplanten wel het geval is.

Buitenlandsche primula's de laagbloemige chineesche in alle tinten van rood, de hoogstengelige lichtlila primula, kunnen, nadat ze voor 't venster hun moois hebben getoond in de tuin gezet worden en bloeien dan soms nog een eind in de zomer door.

Wie hooge zonnige vensters heeft, moet eens de proef nemen met tropische slingerplanten *Mina lobata* en *Cobaea* te zaaien.

In houten kistjes kunnen voor 't venster Phlox, Lobelia, Petunia, Petunia's en andere voor nachtvorsten gevoelige

planten uitgezaaid worden. De sterkste kiemplanten moeten afzonderlijk in potjes worden gezet, om eind April of begin Mei, naar de weergesteldheid, in de volle grond te worden geplant. Wie een koud kasje in de tuin heeft kan dadelijk daarin overplanten.

In de bloemwinkels

stellen de kweekers nu de mooiste producten van hun kunst ten toon. Heerlijke rose-witte, tulpvormige magnolias sneeuwballen (Geldersche rozen), zoo groot als een vuist en sering in vele tinten van purper tot wit, prachtige varens en orchideeën. De rozen prijken overal in de zeldzaamste en kostbaarste soorten. Vooral Marechal Niel, de prachtige gele klimroos, die in onze tuin niet bloeien wil daar de knoppen niet tegen koude regen kunnen. In daartoe ingerichte kassen kan een stuit wel eens duizend bloemen dragen, waarvan de mooiste in sommige jaren met een gulden per stuk betaald worden.

Het aquarium

kan thans als gevuld worden, enkele waterplanten komen al op, halfontplooide winterknoppen van Duitblad en Blaasjeskruid drijven aan de oppervlakte en zijn er gemakkelijke buit. De bodemplant moet men nog met inspanning zoeken. Maar 't wemelt al in de sloot van allerhande waterkevers, pikzwarte, gerande en wat al soorten er meer zijn; ook van salamanders en andere amfibieën die hun winterslaap uit hebben. Met het schepnet zijn ze niet moeilijk te vangen.

De aquarium-dieren die bij ons thuis den winter hebben doorgebracht moeten nu volop voeder, liefst aardwormen, hebben; daar altijd nog opnieuw vorst verwacht kan worden is het goed, zoodra de grond even los genoeg is, aardwormen te spitten en die in een blikken bus met koffiedik thuis te bewaren. Dat koffiedik is een probaat middel tegen schimmel en de wormen worden er dik, vet in. Dek het dik met wat vochtige dorre bladeren. De visschen krijgen hun eetlust ook langzamerhand terug.

Het terrarium

krijgt zijn bewoners ook weer te logeeren. Hagedissen en hazelwormen zijn al wakker. In de duinen en op de heide zijn nu nieuwe logé's het makkelijkst te snappen. Met de eerste warme dagen komen ze te voorschijn en zijn dan lang zoo schuw niet als later. De amfibieën moeten nog niet in 't terrarium, tot Mei is hun plaats in 't aquarium.

De verzamelaar van insecten

zal denklijk nog druk bezig zijn met de vele corveetjes, die ik in de vorige aflevering aan zijn geëerde aandacht heb aanbevolen. Wij durven daarom bijna niet met wat nieuws aankomen. En toch moet er nog wat bij. Ontwerp eens een lijst van uw desiderata, niet ten dienste van St. Niklaas, want die komt, zooals we door veeljarige ervaring weten, toch vooreerst niet terug, nu hij er pas geweest is. Maar ten gebruike van u