

Voor bezoekers van Zuid-Limburg.

Wij herinneren eraan, dat onze ontdekking van de Eikelmuis (*Eliomys nitela*) vermeld in *De Levende Natuur* deel III blz. 123, nog altijd nadere bevestiging vereischt.

Wie zijn vakantie in Zuid-Limburg doorbrengt, kan zich dus zeer verdienstelijk maken met te probeeren eenige van deze fraaie diertjes levend of dood, maar liefst levend, te



De Eikelmuis.


bemachtigen en ze op te zenden of desnoods in persoon over te brengen aan den Dierentuin van Natura Artis Magistra te Amsterdam. 't Is bijna onnoodig te zeggen, dat eventueele onkosten gaarne ruimschoots door de directie vergoed zullen worden. Ook Hazelmuisen en Zevenslapers zullen dankbaar worden aanvaard.

JAC. P. THIJSSSE.

Helmtiek.

Inliggend zend ik het cadaver van een mij geheel onbekend en m.i. zeer merkwaardig insect.

Dit diertje had zich vastgehecht in den schouder van een kind en had zich vervolgens volgezogen met bloed. Het had zich zoo diep ingedrongen in het vleesch, dat deszelfs kop niet meer te zien was. Het kind klaagde van pijn in den schouder en de ouders meenden bij nadere beschouwing, aanvankelijk niet anders, of er formeerde zich daar een soort puist of wrat aangezien het diertje door het ingezogen bloed bolrond en donkerbruin van kleur was. Rondom de plaats waar het diertje zat liet zich een harde schijf voelen. Daar het kind bleef klagen, reeds drie dagen lang, kwamen de ouders op het idee om dit vreemd verschijnsel met eene sterke loupe te bezichtigen, en zagen toen aldaar, dat die vreemde puist, een diertje was.



Schapenteek. $\times 2$ Direct trachtte men toen het insect uit het vleesch te trekken, hetgeen echter lang niet gemakkelijk ging, daar het diertje zich verbaazend vastgewerkt had.

Door het diertje met de nagels aan te pakken is het na flink trekken dan toch eindelijk gelukt. Uit het wondje scheidde zich een kleurloos vocht af.

Gaarne zou ik van u inlichting ontvangen over dit vreemde bloedorstige insect.

Utrecht.

J. FLIPS.

Het diertje, dat uw kind heeft geplaagd is een schapenteek (*Ixodes reduvius*) behoorende tot de orde der mijten. Op Texel noemden wij dit dier „helmtiek” (omdat 't veel in 't helmgras zat) en we waren er geweldig bang voor, want 't is inderdaad geen pretje, om door zijn scherpen zuignut

te worden aangetast. Bovendien kun je ze maar zeer moeilijk verwijderen en daarbij blijft dan weer meestal de zuignut in de wond zitten, wat weer ontsteking en verzwering ten gevolge kan hebben.

Laat men de dieren lang genoeg zitten, dan zuigen ze zich vol en vallen eindelijk van hun slachtoffer af. Dan blijven ze zoolang liggen, tot ze weer uitgeteerd en ingekrompen zijn en dan kruipen ze op kruiden en heesters en loeren daar op de voorbijgaande dieren om er zich weer op vast te hechten. Behalve schapenteeken komen in ons land o. a. ook nog duiventeecken, runderteecken en hondenteecken voor, de laatste tasten ook het meest den mensch aan. ZIE blz 186

JAC. P. T.

De Koekoek (*Cuculus Canoris*).

Een mijner kennissen vond onlangs tusschen het kreupelhout een omgekeerd mandje waaronder een nest van een roodstaartje (*Ruticilla phoenicura*).

In het nest lag te midden der blauwe eitjes een pas uitgekomen koekoeksjong.

Het mandje werd weer over het geheel gezet en na eenigen tijd terugkomende bevond hij het jong belangrijk gegroeid en de blauwe eitjes gebroken naast het nest.

Ten derde male terugkomende zag hij, dat de koekoek zijn volle wasdom had bereikt en gevangen zat, daar de opening waardoor de pleegmoeder gewoon was binnen te komen voor hem te klein bleek.

Toen de mand een weinig opgelicht werd vloog de gevangene gezond en wel de wijde wereld in.

Hieruit zou men kunnen opmaken, dat een koekoeksei korter bebroed behoeft te worden dan dat van een roodstaartje, immers

het is niet aan te nemen dat — mocht soms het eerste in een leeg nest gelegd zijn — de pleegmoeder op het vreemde ei zou gaan broeden, alvorens haar eigen eieren gelegd te hebben.


Jammer dat de waarnemer de uitgeworpen eieren niet onderzocht heeft om te constateeren, in hoeverre deze bebroed waren.

Den Haag.

C. STOLK.

Een vreemde pinksterbloem.

's Maandags moesten wij pinksterbloemen voor school mee brengen. Ik had vergeten ze te plukken. Toen kreeg

**Doorgegroeide Veldkers.**

ik van mijn buurman een plantje. Dit plantje was bij toeval heel vreemd gevormd.

Het vreemde zat hem namelijk in de bloemen. Zij waren

niet gewoon. Toch hadden ze wel 4 bloembladen, 4 kelkbladen, 6 meeldraden, maar geen stamper. In de plaats van deze was er een bloemsteel uit het vruchtbeginsel gegroeid en op dat steeltje was weder een bloem met 4 kelkbladen zonder meeldraden met 8 bloembladen en een stamper. Mijn buurman K. P. beweerde, dat op de weide, waar hij ze vond, er nog meer staan. Zelf heb ik ze er nu van daan gehaald. C. MATTERN.

Een monstrueuse Kievitsbloem.

Van eene goede kennis uit Oegstgeest ontving ik onlangs zeven *Fritillaria's*. Merkwaardig was 't, dat alle fasciatie vertoonden. Zes er van, drie roode en drie witte, hadden een stengel, die uit 2 andere was samengegroeid, en droegen 2 bloemen. Maar No. 7 had niet minder dan vier bloemen en



Bandvorming bij de Kievitsbloem.
Photografie van den heer Stomps.

vertoonde de bandvorming al heel mooi, zooals op bijgaande photo te zien is.

Even wil ik nog opmerken, dat v. Eeden *Fritillaria* ook bij Oegstgeest heeft gevonden, ofschoon in de opgaven van vindplaatsen van Kievitsbloem in een der vorige jaargangen van *De Levende Natuur* dit plekje niet vermeld wordt.

Amsterdam.

Th. J. Stomps.

Drinken voor Vogels.

Omtrent deze gewichtige zaak vinden wij in een zeer interessante brochure van den heer Van Vollenhoven te Nijmegen nog het volgende:

„Aanwezigheid van water is ook een aantrekkingspunt voor vogels en is dit o. m. gebleken bij de totstandkoming van het Apeldoornsche kanaal. Meer nog dan des zomers heeft de vogel 's winters behoefte aan versch water, ten eerste omdat er dan veel open water bevroren is en ten tweede omdat met de vorst veel dierlijk voedsel voor de insecteneters onbereikbaar is. Velen leven dan nog op een harder voedsel als oliehoudende zaden, maar daarvoor is water noodig om het te kunnen verteren. Dorst zal dan ook zeer waarschijnlijk de reden zijn dat het roodborstje des winters tegen de vensterruiten pikt. Het vogeltje ziet de in den winterzon glinsterende vensterruit aan voor een stuk ijs, dat het bij vorst zonder sneeuwval opzoekt, zooals het anders in de sneeuw pikt. Dat de vogels, vooral de scherpbekken, ijs pikken, kan iedereen opmerken als hij zich met de vogelvoeding (waarbij ook het dagelijks gereedhouden van versch water behoort) bezig houdt. Het drinkwater bevriest 's nachts en heeft den volgenden

ochtend putten in het ijs, die tot den bodem van het drinkshoteltje doorgaan.

Ten slotte komt dan nog de voeding van vogels gedurende den winter, waarover wel een afzonderlijk opstelletje noodig is; zij wordt in dit opstel dan ook maar alleen aangehaald om vogels — die eenmaal ter plaatse aanwezig zijn — te houden en dus niet als een vorm van dierenbescherming of als een middel om vogels te lokken. De plaatsing van een nestklos aan een boom, waar vooral *versch* water in de buurt is of waar de zorg voor wintervoeding bestaat, wordt dan ook hierdoor vanzelf aangegeven.”

De heer Van Vollenhoven zendt aan belangstellenden gaarne een gratis-exemplaar van zijne brochure: „De nesteling van nuttige vogels door het aanslaan van nestklossen te Nijmegen en omstreken.” Honderdtallen er van zijn bij hem verkrijgbaar tegen toezending van een postwissel groot f 1.60. T.

Laat in dezen drogen zomer ieder, die ervoor in de gelegenheid is, toch er om denken, de vogels te helpen aan frisch drinkwater!

Carabus Clathratus.

In de vorige afl. zeide ik, dat *C. Clathratus* een nachtdier is, maar dit is niet geheel juist, want eenige weken later in den paartijd kwamen mijn kevers ook bij dag te voorschijn, vooral 2 exemplaren die beschadigde pooten hadden. Zij haalden ook wormen uit 't water, en paarden zelfs bij dag en op de vangplaats ving ik er één, die door 't gras scharrelde, terwijl ik in boomstronken noch onder graspollen er meer één kon vinden. Misschien dat ze alleen in den paartijd bij dag te voorschijn komen, maar dat moet ik afwachten.

LEEFMANS.


Heukels' Schoollora, 9de druk.

Het verheugt ons, al weer een nieuwen druk van dit werk te kunnen aankondigen; 't is ons een bewijs, dat de belangstelling in de natuur nog steeds toeneemt.

Een aanbeveling behoeft dit uitmuntende werk stellig niet meer. E. Hs.

In den komkommertijd.

Het merkwaardige Augurkje van den vorigen komkommertijd is dit jaar volkomen in de schaduw gesteld door de hierbij afgebeelde record-monster-augurk, ons gezonden



Vierdubbele Augurk met bladeren.

uit Loosduinen. Bij 't opensnijden bleek de vrucht geheel loos te zijn. Ook in de bovenverdiepingen school niets.

E. Hs.