

*Kemphaan.* — De kemphaantjes broeden op de weilanden, in gezelschap van Kievitten, tureluurs en grutto's. De vier eieren vindt men in het begin van Mei.

*Turaluur en Grutto.* — Broedplaatsen als boven. De vier eieren vindt men in de tweede helft van April en worden met de Kievitseieren medegeraapt.

*Wulp.* — In tegenstelling met de verwante soorten zoeken de wulpen juist de eenzaamheid. Ze broeden talrijk in de duinen en op de heidevelden, doch niet in elkanders nabijheid. Eenmaal vond ik een wulpennest midden tusschen een aantal nesten van de zilvermeeuw. Omstreeks half April vindt men de vier eieren, soms iets vroeger, als het voorjaar bijzonder gunstig is.

*Zilvermeeuw.* — De zilvermeeuwen broeden in kolonies in de Hollandsche duinen, doch niet op Texel (? T.) en aan den Hoek van Holland. Het groote, uit helm vervaardigde nest bevindt zich op de hellingen of op vlakke duintoppen. In het einde van Mei bevat het twee of drie eieren.

*Kokmeeuw.* — De kokmeeuwen leggen hunne kolonies aan in moerassen. De nesten bevatten omstreeks midden Mei 3 eieren.

*Vischdiefje.* — De vischdiefjes broeden in groote menigte op de Noordzee-eilanden en aan den Hoek van Holland, zoowel op het breede strand als op de geestgronden en in de polders. Het legsel van drie eieren vindt men tegen het einde van Mei. Slechts zelden vond ik in de nesten eenige aanduiding, dat de vogel moeite had gedaan een onderlaag voor de eieren aan te brengen.

*Dwergstern.* — De nesten der dwergsterntjes vindt men aan den Hoek van Holland steeds op het strand, slechts weinig boven de hoogwaterlijn. In het laatst van Mei bevatten de nesten drie eieren, waarvan de kleur merkwaardig goed met die der omgeving overeenkomt.

*Zwarte Stern.* — De zwarte sterns vormen kolonies in meren en veenplassen. In Limburg en Oostelijk Noord-Brabant zijn ze bijv. talrijk in de ondiepe plassen op de heide. De drie eieren vindt men omstreeks midden Mei op drijvende biezten.

*Bergeend.* — De Bergeenden broeden in konijnsholen. Het nest bevindt zich ongeveer een meter van den ingang. Het legsel van 10 à 12 eieren is in de tweede helft van Mei voltallig.

*Wilde Eend.* — De wilde eenden broeden evengoed langs de wateren in het polderland als midden in de duinen tusschen doornstruiken en helm. Zijn de jongen uitgekomen, dan trekt de heele familie landwaarts om de dichtstbijzijnde sloot op te zoeken. Ik vond wel eendennesten in de laatste duinenrij, waar op eenige kilometers afstand geen zoet water te vinden was. De 10 à 14 eieren vindt men in het midden van April.

*Fuut.* — De fuut broedt nog vrij talrijk op onze plassen en meren. Het nest bevindt zich meestal midden op het water tusschen eenige rietstengels en is slechts een slordige hoop dood riet en biezten. In het begin van Mei bevat het nest drie eieren, die door de modderige, natte omgeving vuile, bruine vlekken vertoonen.

Venloo.

P. TESCH.



#### Tegenwoordige stand van bij Wageningen voorkomende vogelsoorten, in vergelijking met vorige jaren.

Kauw, stationair; Roek, toenemend; Kraai, afnemend; Ekster, sterk afnemend; Vlaamsche gaai, weinig broedend, op najaarstrek afwisselend; Wielewaal, stationair; Grauwe Klauwier, toenemend; Spreeuw, in 1907 beslist minder dan in 1906; Groenling, toegenomen; Vink, in 1907 minder dan in 1906; Barmstijse, op den trek sterk verminderd; Kneutje, toegenomen; Ringmusch, sterk toegenomen; Huismusch, stationair; Rietgors, toegenomen; Geelgors, stationair; Leeuwerik, stationair; Kuifleeuwerik, stationair; Boomleeuwerik, toegenomen; Witte Kwikstaart, stationair; Gele Kwikstaart, toenemend; Boompieper, stationair; Graspieper, stationair; Boomkruipertje, afgenomen; Boomklever, afgenomen; Koolmees, sterk afgen.; Pimpelmees, sterk afgenomen; Zwartkopmees, sterk afgenomen; Kuifmees, iets toegenomen; Staartmees, afgenomen; Goudhaantje, afgenomen; Winterkoninkje, stationair; Bastaardnachtegaal, toegenomen; Grasmusch, stationair; Braamsluiper, weinig; Zwartkop, weinig; Tuinfluiter, stationair; Fluiter, weinig; Fitis, zéér veel; Tjiftjaf, iets toegenomen; Spotvogel, iets toegenomen; Rietzanger, toegenomen; Karekiet, weinig; Kleine Karekiet, stationair; Boschrietzanger, stationair; Koperwiek, op den trek in aantal sterk wisselend; Merel, sterk toegen.; Groote Lijster, wordt hier *hoogst zelden* gezien; broedt hier *niet*; Zanglijster, op voorjaarstrek 1907 *bijzonder weinig*; als broedvogel sterk toegenomen; Kramsvogel, op den trek sterk wisselend; Nachtegaal, afgenomen; in 1907 minder dan in 1906; Roodborstje, stationair; Witgesterd Blauwborstje, komt hier *niet* voor; Gekraagde Roodstaart, toegenomen; Zwarte Roodstaart, iets toegenomen; Tapuit, afgenomen; Paapje, zéér veel; Roodborst-Tapuit, toegenomen; Grauwe Vliegenvanger, stationair; Zwartgrauwe Vliegenvanger, afgenomen; Boerenzwaluw, verminderd; wellicht door verdwijning van broedgelegenheden = vermindering van schaapskooien en tabaksschuren; Huiszwaluw, stationair; Bergzwaluw, afgenomen; door normaliseering van den Rijn verdwenen vele broedplaatsen aan de oevers; Groene Specht, afgenomen; Groote bonte Specht, stationair; Kleine bonte Specht, stationair; Draaihals, stationair; Koekoek, iets toegenomen; Gierzwaluw, verminderd; nestgelegenheden verdwenen; Nachtzwaluw, stationair; IJsvogel, toegenomen; Steenuil, stationair; Boschuil, iets toegenomen; Sperwer, toegenomen; Buizerd, in 1907 op den trek talrijker dan ooit; Boomvalk, afgenomen; Torenvalk, afgenomen; Woudduif, in 1907 *belangrijk minder* dan in 1906; Boschfazant, toegenomen; Patrijs, toegenomen; Kwartel, *zéér sterk* afgenomen; worden bijna niet meer gehoord; Blauwe Reiger, sterk afgenomen; Ooievaar, geleidelijk verminderd; Waterhoentje, toenemend; Meerkoet, afgenomen; Kievit, afnemend; Kemphaan, in 1907 *talrijker* dan vroeger; Grutto, toenemend; Tureluur, stat.; Wulp, in voorjaar 1905 en najaar van 1905 op 1906 *bijzonder veel*; van 1906 op 1907 nagenoeg *niet* gezien; een enkel paar broedt in de Geldersche vallei; Kokmeeuw, in voor- en najaar talrijker dan vroeger; Vischdiefje, sterk afgenomen; Zwarte Zeezwaluw, sterk wisselend; heeft hier in de laatste jaren *nimmer* een broedkolonie van eenige beteekenis gehad; Wilde Gans, op den trek in aantal nog al afwisselend; Wilde Eend, toegenomen; Zomertaling, toegenomen.

#### Stand van enkele broedvogels bij Kerkwerve (Schouwen).

Groote Zeezwaluw, toegenomen; Vischdiefje, *verminderd*, maar *toegenomen* op *Duiveland*; Kopmeeuw, in dit jaar (1907) *buitengewoon talrijk*; Tureluur, Kemphaan, Grutto, Kluit, Scholekster, Kievit, *alle belangrijk afgenomen* in vergelijking met vroegere jaren. In de duinen bij Haamstede in 1907 de *Kievit talrijker* dan in andere jaren; (als oorzaak wordt opgegeven, dat de eieren dáár minder druk worden gezocht; Wulp, *niet* bij Kerkwerve; wel in de duinen, maar *weinig*).

A. A. VAN PELT LECHNER.