

Vogelbevolking van Nederland.

Ingevolge uw aanvraag in het Juni-nummer van *D. L. N.* zend ik u hierbij een lijstje omtrent het naar mijne meening voorkomen als *broedvogel* van de daarop vermelde soorten.

Mijne waarnemingen betreffen de streek ten N. begrensd door Beverwijk, ten O. door Halfweg, ten Z. door Vogelenzang en ten W. door de zee.

Soorten die niet op deze lijst voorkomen, heb ik niet als broedvogel waargenomen in deze streek.

Nachtegaal, zeer veel; Roodborstje, gewoon doch niet veel; Gekraagde roodstaart, veel; Tuinfluiter, zeer veel; Grasmusch, zeer veel; Braamsluiper, niet veel, doch tamelijk gewoon; Spotvogel, veel; Fluiter, gewoon, doch alleen in tamelijk groote bosschen met hooge boomen. Schijnt te vermeerderen; Fitis, zeer veel; Tijftjaf, gewoon; Goudhaantje, niet veel, toenemend; Winterkoning, veel; Karekiet, gewoon; Kleine karekiet, veel; Boschrietzanger, weinig; Sprinkhaanrietzanger, tamelijk veel in de duinen; Bastaardnachtegaal, veel; Paapje, gewoon; Roodborsttapuit, niet veel; Tapuit, zeer veel; Groote lijster, gewoon, doch niet talrijk; Zanglijster, zeer veel; Merel, zeer veel; Koolmees, veel; Zwartkopmees, niet veel, doch tamelijk gewoon; Pimpelmees, gewoon; Kuifmees, zeldzaam; Zwartgevekte staartmees, gewoon; Boomklever, gewoon; Boomkruipertje, gewoon; Grauwe vliegenvanger, veel; Boerenwaluw, veel; Huiswaluw, weinig, schijnt te verminderen; Oeverwaluw, gewoon, vermeerdert flink; Gierzwaluw, alleen nestelend aan eenige groote gebouwen in Haarlem, maar daar ook tamelijk veel; Nachtzwaluw, gewoon, schijnt te vermeerderen; Grauwe klauwier, veel, schijnt er op vooruit te gaan; Wielewaal, gewoon; Spreeuw, Witte kwikstaart, veel; Gele kwikstaart, gewoon; Boompieper, veel; Graspieper, gewoon; Veldleeuwerik, zeer veel; Kuifleeuwerik, weinig; Boomleeuwerik, gewoon; Rietgors, gewoon; Geelgors, gewoon; Vink, veel; Huismus, enorm veel; Ringmusch, zeer veel; Kneutje, veel; Putter, zeldzaam; Groenling, gewoon; Roek, in Haarlem enkele goed bevolkte kolonies; gaat er goed op vooruit sinds de nesten niet meer uitgestooten worden; Kraai, veel; Kauw, zeer veel; Ekster, gewoon; Vlaamsche gaai, niet veel meer; vermindert de laatste jaren, dank zij ijverige vervolging; Groote bonte specht, gewoon; Kleine bonte specht, niet veel, doch vermeerdert wel; Groene specht, weinig; Koekoek, veel; IJsvogel, weinig; Kleine boschduif, tamelijk gewoon; vermeerdert; Woudduif, zeer veel; Tortel, veel; Boomvalk, weinig; Torenavalk, weinig; Kerkuil, weinig; Ransuil, zeldzaam; Boschfazant, zeer veel; Patrijs, gewoon; Blauwe reiger, gewoon, doch slechts enkele kolonies; Ooievaar, gewoon, vermeerdert echter niet; Kwartelkoning, weinig; Waterral, zeldzaam; Waterhoentje, veel; Meerkoet, gewoon, doch niet veel; Scholekster, gewoon; Kievit, veel; Strandplevier, gewoon; Kempahaan, gewoon; Tureluur, veel; Grutto, veel; Wulp, veel; dat hij sterk afneemt zooals u schrijft in *D. L. N.* van Juni 1907 geloof ik niet, het komt mij tenminste voor dat er nog evenveel van die vervelende dieren in 't duin zitten als 5 à 6 jaar terug; Vischdiefje, gewoon; Noordsche zeezwaluw, ik zie in den broedtijd wel eens Noordsche zeezwaluwen boven de singels in de stad vliegen, het is dus niet onmogelijk dat zij hier in den omtrek broeden, maar makkelijk uit te maken zal het niet zijn, daar zij zoo veel op de vorige gelijken en men hier op de broedplaatsen van St. Hironde de vogels niet zoo dichtbij te zien krijgt, dat men er eventueel een St. Macrura tusschen zou herkennen; Zwarte zeezwaluw, zeldzaam; Zilvermeeuw, weinig; Kokmeeuw, weinig; Wilde eend, gewoon.

A. TRAANBERG.

Vogelwereld.

Ingevolge het verzoek in de Juni-aflevering van *D. L. N.* zend ik hiernevens een lijstje mijner waarnemingen over 1903/07 omtrent den stand der vogelbevolking in Heerlen en de naaste omgeving.

Tot nadere toelichting deel ik u mede, dat het aantal vogels over 't algemeen afneemt, hetgeen m. i. toe te schrijven is aan het omhakken van het prachtige woeste Streeperbosch, en de onbedwingbare manie van de, hier in 't mijn-district steeds toenemende, bevolking om zangvogels te vangen en in kooitjes te houden.

De korhoenders in de bosschen van den heer Menten te Nieuwenhagen zijn niet uitgepoot als jachtvogels, maar sedert 2 jaar daar aangekomen als zwervelingen uit het noorden.

Heerlen en omstreken.

Akkerleeuwerik, talrijk; Boomkruiper, niet veel; Boomklever, niet veel; Bonte kraai, niet voorkomend; Bonte specht, weinig; Boompieper, vrij veel; Braamsluiper, vrij veel; Bastaard-nachtegaal, zeer talrijk; Boerenwaluw, zeer talrijk; Ekster, buitengewoon veel; Fitis, niet veel; Fluiter, tamelijk veel; Fazant, gefokt als jachtvogel; Goudhaantje, tamelijk veel; Groene specht, zeer talrijk; Grasmusch, talrijk; Gekraagde roodstaartje, zeer talrijk; Geelgors, zeer talrijk; Grauwe vliegenvanger, talrijk; Groote lijster, tegenwoordig vrij veel; Huismus, steeds meer in getal; Huiswaluw, vrij talrijk (of talrijker); Houtduif, zeer veel; Havik, zeldzaam; Koolmees, zeer veel; Kuifmees, zeldzaam; Kauwtje, zeer veel; Keep, vrij zeldzaam; Kuifleeuwerik, zeer talrijk; Koekoek, vrij talrijk; Kleine boschduif, eenige exempl. Amsterrade; Kerkuil, vrij zeldzaam; Kwartel, nogal voorkomend; Korhoen, 7 exempl. Nieuwenhagen; Koperwiek, vrij zeldzaam; Kramsvogel, afwisselend; Meerkol, zeer talrijk '03 '06 nu '07 bijna verdwenen; Nachtegaal, zeer talrijk; Ooievaar, zeer zeldzaam; Oeverwaluw, moet hier en daar voorkomen; Pimpelmees, zeer talrijk; Patrijs, zeer talrijk; Ringmusch, vrij zeldzaam; Roodborstje, vrij talrijk; Roek, zeer talrijk ('07 minder); Reiger, uiterst zeldzaam; Staartmees, talrijk; Spreeuw, zeer talrijk '07 veel minder; Schildvink, zeer talrijk, doch afnemend; Spotvogeltje, vrij talrijk; Steenuil, talrijk; Sperwer, vrij zeldzaam; Tijftjaf, zeer veel; Tuinfluiter, niet talrijk; Tapuit, vrij zeldzaam; Tortelduif, zeer veel; Torenavalk, niet voorkomend; Winterkoning, zeer veel; Weidepieper, zeer veel; Witte kwikstaart, tamelijk veel; Wielewaal, zeldzaam; Waterhoentje, vrij veel bij Schaesberg; Velduil, tamelijk veel; IJsvogel, vrij zeldzaam; Zwarte mees, zeldzaam; Zwarte kraai, vrij veel; Zanglijster, vrij zeldzaam; Zwart roodstaartje, zeldzaam.

Heerlen.

D. FLEES.

Griffier Kantongerecht.

Een nieuw middel tegen verspekken.

Het onooglike en lastige glimmend fettig worden van vlinderlijven en vleugels waarvoor sommige soorten veel meer vatbaar zijn dan andere, heeft aan vele verzamelaars wat hoofdbreken gekost. Ter Haar in zijn bekend handboek raadt een 4-tal ontsmettingsmiddelen aan. Eenvoudig en goedkoop is het volgende:

Men neemt een lege, schone carbidbus of een stopfles en vult die voor $\frac{3}{4}$ met gasoline, vervolgens verzwaart men een leeg lucifersdoosje met hagelkorrels of stukjes ijzer en steekt den vlinder, die de kuur noodig heeft, er bovenop. Doosje met vlinder laat men nu voorzichtig op den bodem van bus of fles zakken, zodat de hele vlinder onder de gasoline zit. Men sluit de bus of fles goed dicht en zet haar dan ongeveer een week lang weg. Daarna kan de vlinder er uitgehaald worden; in een oogenblik is hij droog, van alle vet ontdaan en glimt als een nieuw exemplaar. Ook voor wespen zou dit aan te raden zijn.

Denekamp.

BERNINK.

Bericht aan allen die me hun naamkaartje zonden.

Het aantal belangstellenden in mijn plan was zóó groot, dat ik met vertrouwen op succes de lijsten durf bewerken. Het is echter een zeer tijdroovend werk en daarom voorzie ik dat ze niet vóór 1908 gereed zullen zijn. Alsdan hoop ik in de eerste plaats u allen een exemplaar te zenden. Mochten nog meerderen ervan willen profiteren, dat zij dan hun verlangen kenbaar maken. De lijsten vermelden bloeitijden en vindplaatsen met tal van biologische bijzonderheden en een vertaling der Hollandsche namen.

Wie wil mij helpen aan bloeitijd en tegenwoordige vindplaats van de volgende planten:

Erica carnea, *Euphrasia lutea*, *Euphrasia Rostkoviana*, *Euphrasia verna*, *Gilia achillaefolia*, *Gnaphalium purpureum*, *Hesperis tricuspidata*, *Isoetes echinospora*, *Isoetes lacustris*, *Lathyrus hirsutus*, *Lemna arrhiza*, *Linaria chalapensis*, *Lithospermum purpureo-coeruleum*, *Lycopodium annotinum*, *Oenothera laciniata*, *Phleum graecum*, *Plantago cynops*, *Plantago Lagopus*, *Polygonum Bellardii*, *Rumex acutus*, *Salvia aethiopsis*, *Salvia glutinosum*, *Salvia Horminum*, *Silene muscipula*, *Stachys italicus*, *Veronica austriaca*, *Vinca major*.

't Is natuurlijk mijne bedoeling niet, dat iemand deze *alle* invult, maar slechts die, welke men weet of gemakkelijk kan naslaan.

Ambt Doetinchem.

A. JOMAN.