

**Ornithologische waarnemingen.**

Zooals bekend is, nestelen meezen, althans de Pimpels, uitsluitend in bosschen en tuinen, dus in hout.

Den 14den Juli jl. ontdekte ik in een der beide groote lantaarnpalen (met vier branders) op de Grootte Markt alhier en wel in die vlak bij het hôtel Des Pays Bas een nestje van de *Pimpelmees* (*Parus coeruleus*) met jongen.

Voorzeker weer een niet alledaagsch verschijnsel in de Vogelwereld, dat dit vogeltje de voorkeur gaf aan eenen ijzeren paal op een groot steenen plein in het centrum der stad, alwaar het op marktdagen wemelt van menschen.

Het Pimpeltje kon nauwelijks van boven door de kleine opening onder de groote lantaarn en zag er dan ook uit als een vogel, die geducht aan het ruien was. Aan beide zijden van het marktplein bevindt zich een rij boomen, waaruit het meesje telkens voedsel haalde zijne kinderen. Het viel mij op, dat het geregeld uit den lantaarnpaal eene streng horizontale lijn beschreef naar de boomen links en rechts. (De meesjes hebben het kunstlicht zeker verkozen boven de diepe duisternis van den nacht).

Helaas merkte ik eenige dagen daarna niets meer van dit gelukkige huisgezin. Men begrijpt dus wel, wat er is gebeurd. We kunnen, jammer genoeg, niets anders bekenen, dat de meesjes hier wel wat al te onvoorzichtig te werk gingen, te veel vertrouwen stelden in *onze* kinderen.

Ten slotte wil ik nog even melding maken van eene zeer verrassende waarneming op 4 Juli jl. In den tuin van mijn buurman, alwaar dagelijks een paartje *Grauwe Vliegenvangers* (*Muscicapa grisola*) met kroost vertoefde, dat door de ouders vlijtig werd gevoederd, ontdekte ik één jong exemplaar, dat uit de verte geleek op een gele kanarie en geheel niet paste bij zijne broertjes en zusjes. Natuurlijk moest ik het mijne er van hebben en met den kijker de jongen dichter bij halende, zag ik tot mijne groote verbazing inderdaad een *Grauwen Vliegenvanger* in nestvederpakje met vuilwitte kop (tot aan den rug), ergo een begin van albinisme. Even later kon ik mij nog eens van heel nabij overtuigen, dat ik goed gezien had.

Arnhem, 18 Juli 1909.

T. E. BOUMA.

**Mexikaansche Springboontjes.**

Een van mijn vrienden bracht het vorig jaar van de Londensche tentoonstelling een aardigheidje mee, zooals men haast op iedere tentoonstelling er een of ander vindt.

't Waren een paar Mexikaansche springboontjes, kleine lichte zaaddoosjes die onder dien naam verkocht werden. Ze leken wel iets op lichtgekleurde koffieboontjes waarvan er drie een vrucht gevormd hadden, glad van oppervlak met op den bollen kant een naad en aan de andere zijde een niervormig vlakje iets lichter van tint en zachter dan de verdere schil (fig. 2).

De aardigheid was nu dat die boontjes, als men ze rustig op een bord legde, liefst op een warm plekje, na eenigen tijd begonnen te springen, soms een paar millimeter hoog en zich zoo in alle richtingen over 't bord bewogen. Ik



begreep dadelijk, dat er 't een of ander insect in zat en toen ze ten laatste niet meer *spring*levend waren heb ik er een open geknipt en vond een klein lichtbruin popje dat nog al beweeglijk was (fig. 1).

Ik bewaarde ze verder in een doosje met gaas en nu 10 Juli vond ik daarin een grijs gewolkt vlindertje (fig. 5.) Na eenigen tijd zag ik No. 2 te voorschijn komen uit zijn deurtje (fig. 3.) No. 1 was blijkbaar uit de opening gekomen die ik geknipt had. Binnen het zaaddoosje zat een dun wit, eivormig spinseltje, gesponnen aan de sponning van het deurtje. Blijkbaar was dit deurtje, dat volmaakt rond was, gemaakt voor de verpopping want in de woning van No. 1 die er geen gebruik van had gemaakt ging het deurtje open toen ik er van binnen met een speld tegen drukte. Van buiten was niets te zien geweest.

Zouden er onder onze inlandsche insecten ook niet zijn die dergelijke spring oefeningen vertoonen bijv. de rups van de blaaskelkvlinder. Heeft iemand al reeds iets daaromtrent waargenomen?

Ook de knoppen van meidoorns kunnen bewegen; er zitten eveneens larven in. H.

**Vergroeide kersen.**

Gisteren kwamen mij toevallig een paar vreemd vergroeide kersen in handen. De steeltjes zijn in de lengte in



elkaar gegroeid en de vruchten geheel afzonderlijk rijp geworden.

Utrecht.

P. LEENDERS JR.

**Schildpad.**

In *De Levende Natuur* van Januari 1909 staat een artikel over 't vinden van schildpadden in ons land. Ook hier in 't noorden van Groningen — ten zuiden van Oldenzijl — werd eenige jaren geleden zoo'n beest gevonden. 't Was eveneens een moerasschildpad, een *Emys Europaea*. 't Dier werd op den laten avond gevangen, terwijl 't over de weg kuierde. Op die plaats kronkelt zich een oud rivierveld door 't land, het Starterhuistermaar. Vlak daarbij zijn diepe kleigaten, waartusschen met riet begroeide walleitjes; ook elders veel riet en ruigte; een dorado voor wilde eenden en waterhoenders. De schildpad werd meegenomen en heeft nog, gebonden aan een touw, een tijdlang geleefd in en bij de gracht van een boerderij.

Uithuizen.

H. VAN ZANTEN.

**Een nieuwe (?) wandaad van den eekhoorn.**

Als eierenuthaler en moordenaar van jonge vogeltjes stond de eekhoorn reeds lang bekend. Nu wordt hij echter ook schadelijk door het vernielen van vruchten, en wel voornamelijk van appels en peren. Hij bijt nl. deze vruchten door, eet alleen de pltten op, en de rest wordt weggeworpen. Vooral in deze streek, waar veel eekhoorns voorkomen, wordt hij op deze wijze een groote plaag voor de eigenaars van tuinen en boomgaarden.

Lunteren (Veluwe).

W.

**Overvloed van Stinkzwammen.**

Een belangstellend lezer zond ons uit Assen een vijftal duivelseieren, afkomstig van een plek in 't bosch bij Assen niet ver van het nieuwe kerkhof aan den Beilerweg, waar op een driehoekig plekje 100 M. lang en met een basis van 25 M. niet minder dan 248 volwassen exemplaren stonden met nog 115 duivelseieren. Die vijf zijn in mijn tuin uitgekomen en hebben een week lang bezigheid gegeven aan de roodstaartjes en vliegenvangers, die er op de ongewoon groote hoeveelheid vliegen kwamen azen. Th.

**De zaaiers.**

Onder een groepje sparren en beuken, waar 's nachts veel vogels rusten, vond ik in Augustus de volgende kiemplantjes: lijsterbes, meidoorn, berberis, Geldersche roos, klimop, kamperfoelie, hulst, asperge, salomonszegel, stekelbladige berberis, wollige sneeuwbal. Ik heb nog nooit zooveel kiemplantjes van onze wilde berberis gezien als dit jaar. Daarentegen is in dezen herfst de oogst van berberisvruchten zeer schraal, ook de Geldersche roos draagt lang zoo overvloedig niet als in vorige jaren.

Onder die donkere sparren staan die kiemplantjes echter allesbehalve voordeelig. Het zaaisel kan eerst tot zijn recht komen als de hooge boomen geveld worden of omwaaien. Er staan op die plek ook al salomonszegeltjes van tien jaar oud, maar die hebben het toch nog niet tot bloeien kunnen brengen. T.