

Reigerkoloniën. — Op het buiten Windesheim bij Zwolle is een groote reigerkolonie, niet ten genoegen van den eigenaar van 't buiten.
Haarlem.

LEON. A. SPRINGER.

„Mesosporen” bij *Puccinia* sp. — In Rabenhorst's Kryptogamen-Flora band I (Pilze door Dr. G. Winter, Leipzig 1880) vind ik vermeld, dat zoog. „mesosporen” voorkomen, die als eencellige teleutosporen kunnen worden beschouwd, doch somtijds in bouw hiervan aanmerkelijk afwijken, van de beteekenis scheen niets bekend. Zou iemand mij thans hierover nader kunnen inlichten, of enkele soorten noemen, waarbij dergelijke sporen zijn waargenomen?
Rotterdam.

J. M. v. D. HOUTEN

A A N G E B O D E N :

Voor de meestbiedende de jaargangen 12, 13, 14 en een abonnement van D. L. N. F. W. Bonnet, Weesperzijde 12, Watergraafsmeer.

C O R R E S P O N D E N T I E.

Het adres van den heer De Klerk (zie vorige afl.) is niet Rotterdam, maar Den Bosch.

C. J. v. d. K. te O. De op een lijster gelijkende vogel met korte staart, vrij grooten kop, gevlekten rug en bruinachtige slagpennen is wel een jonge spreeuw geweest, in overgang tot najaarskleed.

T.

v. L. te Alkmaar. Hier in Bloemendaal hebben ook de sparren, zilversparren en larixen dit voorjaar niet gebloeid, wat na de overvloedige vruchtdracht van verleden jaar ook wel te verwachten was. Kruisbekken zien wij nog elken dag; 't is maar jammer, dat wij geen nest hebben kunnen vinden.

T.

A. W. K. te Goes. Uw dier is een draadworm: (*Gordius*). Uw tuin moet nog al laag liggen; want zij komen alleen in zeer vochtige landen voor, waarschijnlijk door dieren waarin ze parasiteerden daar bij regenweer (plassen) gedeponeed.

E. H.

E. Smit te Stadskanaal. Uw draadje is de groote draadworm *Gordius Aquaticus*, een parasiet uit waterkevers.

E. H.

W. L. B. te Brummen. Stellig een winterkoninkje. Kœkskes op zijn Geldersch zal wel könnikskes = könninkjes moeten beduiden.

E. H.

Arina. Het fotografeeren van broedende vogels behoeft in geen enkel opzicht de dieren te schaden, dat hangt geheel af van de meerdere of mindere beschaving, fijngevoeligheid en vindingrijkheid van den fotograaf.

T.

Vergroeiing. — Gaarne zou ik van u vernemen, of het iets bijzonders is, dat 2 bloemen van een hyacint aan elkaar gegroeid zijn, en dat 2 bloemen van een tulp op één stengel zitten, zooals ik in 't Vondelpark eens zag.

B. H. M.

Dergelijke verdubbelingen en vergroeiingen zijn altijd uitzonderingen en dus bijzonder; al zijn het juist geen zeldzaamheden.

E. H.

Kuifmees. — Toen ik gisteren in een dennebosch wandelde, zag ik een kuifmees uit een boomstronk vliegen, er naar toe gaande bevond ik dat er een nest in was met 5 jongen.

Daar ik niet geloof, dat zij hier veel broeden, schrijf ik u dit even. Gaarne zou ik weten of dit meer gebeurt.

Amersfoort.

C. MAHLER.

De kuifmees is bij ons een zeldzame vogel.

E. H.

Kieuwpoot. — Zeer aangenaam zou het mij zijn, van u eenige inlichtingen te ontvangen aangaande het volgende: Ik zette vier kieuwpooten in mijn aquarium en vond na een paar minuten iets op den bodem, dat ik geen beteren naam weet te geven dan het kleed, het omhulsel van een kieuwpoot. Kan dit in verband staan met een vervelling? Ook in de sloot vond ik zulke omhulsels.

Nuland.

F. v. PINXTEREN.

Dit zijn inderdaad de afgeworpen pantsers van de kieuwpoot (*Apus productus*). Ik heb het vervellen herhaaldelijk waargenomen. Het schild is dubbel en het splitst aan den onder-rand; daar kruipt het dier uit zijn huid en verschijnt dadelijk in een lichter gekleurde nieuwe.

E. H.

Verdubbeling en vergroeiing. — Van den heer Uylings onderwijzer te Amsterdam ontving ik een gewone gele lischplant waarvan een der bloemen meer dan verdubbeld was: achtvoudig in alle deelen; dit is wel iets zeldzaams.

Verder eenige Vingerhoedskruiden met een groote regelmatige topbloem; dit is geen zeldzaamheid; deze monstrositeit wordt in de kweekerijen vaak aangetroffen.

E. H.