

schrijft mij nog nader, dat de beste tijd voor het verzamelen is Juli, Aug. en nog Sept.; de plant heeft dan **vrucht** en meestal nog, of weer bloem.

Als zij, die vast van plan zijn den heer R. te helpen, mij even bericht sturen, zal ik de namen opzenden en desgewenscht later ook de planten. H.

Een afwijking. — Verleden jaar al had ik in dit tijdschrift een kleine mededeeling willen doen aangaande een bos primula's, die wij in den tuin hebben. Ik heb dat toen niet gedaan, omdat een kennis van me, een bloemist, zei, dat het heelemaal niets bijzonders was. Niemand echter, wien ik er ook later opmerkzaam op maakte, had ooit zoo'n vorm gezien en zoo waag ik het nu, op gevaar af niet veel bijzonders te zeggen.



Bandvorming van Ganzebloem (zie blz. 123).

Dit bos Primula's dan vertoont (en vertoonde verleden jaar) een eigenaardige afwijking in de kelk: deze is n.l. aan het veranderen, zoowel wat vorm als wat kleur betreft. En niet alle kelken veranderen in dezelfde mate. Geen enkele in normaal. Bij de minst gevarieerde vertoont de vijfstandige kelk op verschillende plaatsen de kleur van de bloemkroon. (Bij één bloempje aan zoo'n schermpje bevond zich tusschen de vijf tanden in nog een blaadje zonder spitse punt en met de kleur van de bloemkroon).

Van deze minst gevarieerde vormen loopen de afwijkingen tot een tweede kroon, afwisselend met en onder de eerste geplaatst. Enkele bloempjes zijn er, waarvan deze nieuwe kroon volkomen den vorm heeft van de gewone er boven, met geen enkel tandje meer en volkomen dezelfde teekening. Bij andere zijn op de plaats van de hartvormige insnijdingen op den top nog een paar tandjes aanwezig, die de vroegere



kelk verraden. Ook het kleine ringetje van kroonschubben is bij dezen vervormden kelk duidelijk waar te nemen.

Die overgangen zijn wel eigenaardig. 't Vorig jaar kwam ze ook voor en 't lijkt of ze van de eene zijde der plant naar de andere verlopen. En hoe dat te verklaren, gegroeid als ze zijn uit één wortelstok?

Jammer, dat de vermeerdering door zaad zoo moeilijk zal gaan; 't is natuurlijk maar een vorm, de langstijlige. 'k Zal trachten illegitieme bestuiving te bewerken. Vlaardingen. W. H. PADMOS.

Dergelijke monstruose Primula's zijn in den handel.

H.

Naar aanleiding van de nieuwe vogelwet. — Naar aanleiding van het ingediend Wetsontwerp houdende Bepalingen tot bescherming van in het wild levende vogels, hebben wij de eer de aandacht op de volgende omstandigheden te vestigen.

In Art. 5 wordt voorgesteld te vergunnen het rapen van meeuweieren van 10 Mei—15 Juni.

Behalve van kieviten en van meeuwen wordt het rapen van alle andere vogeleieren absoluut verboden, behalve in het geval van Art. 15.

Het Waterschap Schouwen bezit sinds onheugelijke tijden zoogenaamde vogelarijen, die in den regel voor 14 jaren worden verpacht.

Dit zijn: De eerste inlaag van Flauwers, groot 32 H.A., verpacht voor f 311, 's jaars; de tweede inlaag, groot 28 H.A., verpacht voor f 241, en de derde inlaag, groot 31 H.A., verpacht voor f 151.

Pachters zijn van ouder tot ouder dezelfde families, die met beleid en oordeel de eieren rapen, daar het hun eigen belang is, den vogelstand goed te houden. In deze inlagen broeden hoofdzakelijk Kokmeeuwen (*Larus ridibundus*) en de Groote- en Kleine Star (*Sterna*).

Bovendien komen nog in het Waterschap Schouwen buiten de inlagen eenige lage moerassige perceelen voor, die ook als vogelarij verpacht worden en waarin broeden: de Kluit (*Recurvirostra avocetta*); de Grutto; het Daakje (*Totanus calidris*); de Scholekster (*Haematopus ostralegus*); de Kempphaan en de Koet. Slechts enkelen dezer broeden ook in de inlagen.

Wanneer nu de wet voortaan alleen toelaat het rapen van meeuweieren, zal dit een noodlottigen invloed hebben op alle andere vogelsoorten hierboven genoemd, want de pachters zullen deze zooveel mogelijk verjagen, om het nestelen van meeuwen, de eenige soort die hun profijt geeft, aan te moedigen.

Gevolg zal zijn, dat de Sterna's en de kluiten, die toch reeds zeldzaam zijn, binnen eenige jaren geheel zullen zijn verdwenen.

Aan de thans gevolgde wijze van verpachting en de oordeelkundige behandeling der pachters is zonder twiifel te danken, dat de Sterna's en de Kluiten, die nu in ons land zeer zeldzaam zijn geworden, in Schouwen nog groote broedkolonies hebben. Het komt ons wenschelijk voor, juist met 't oog op wat het wetsontwerp bedoelt, dat die broedkolonies in stand blijven, wat niet 't geval zal zijn, als de pachter voortaan alleen over meeuweieren mag beschikken.

Wij hebben de eer op deze gronden u te verzoeken het daarheen te willen leiden, dat, of in Art. 15 behalve meeuwen, ook genoemd worden Starren, Kluiten, Grutto's, Daakjes, Scholeksters, Kemphanen en Koeten of dat in Art. 15 wordt opgenomen een tweede alinea van deze strekking, dat, waar van ouds vogelarijen bestaan, vergunningen tot het rapen van eieren van evengenoemde vogels kunnen worden verleend of dat met name voor de vogelarijen van en in Schouwen zulks wordt toegestaan.

De tijd van het rapen is voor meeuwen voor Schouwen te laat, wanneer deze eerst 10 Mei begint, en zou volgens onze pachters moeten zijn voor meeuwen van 15 April—15 Juni, voor de overigen van 1 Mei—1 Juni.

Een warm of koud voorjaar heeft op de eieren een grooten invloed en waar de meeuwen altijd het eerst beginnen te leggen, zou eene bepaling van 10 Mei als aanvangstermijn in warme jaren veel te laat zijn; de vogels waren dan reeds aan het broeden en alleen door alle eieren te vernielen, zou men ze dan kunnen bewegen weer te gaan leggen. Ook dat is zeer zeker niet de bedoeling.

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Schouwen:

A. J. F. FOKKER, Voorzitter.

D. VAN DER VLIET, Ontv.-Griffier.

Zierikzee.

Fossielen. — In antwoord op een stukje van Dr. Calkoen in de Januari-aflevering zend ik nevensgaande plaatjes van fossielen in vuursteen, hier op de heide gevonden. Het eerste vertoont een zevental indrukseksels, waarschijnlijk van planten. Het uilenkopje is vermoedelijk van dezelfde soort als de teekening van genoemde aflevering. De daar besproken sponsfossielen vind ik hier vaak, zoowel in de koolzure kalk aan de oppervlakte, als op de breukvlakten.



E. J. H. SCHOLTEN.

Het ringen van in het wild levende vogels. — Zoowel tot het verkrijgen van betrouwbare gegevens omtrent het trekken der vogels, alsmede tot het bepalen van den juiste ouderdom, waarop bij sommige vogelsoorten het volkomen vederkleed wordt aangelegd, is het op jeugdigen leeftijd voorzien van een gemerkten aluminium voetring een middel, dat thans meer en meer wordt toegepast en dat reeds, vooral met betrekking tot den vogeltrek, zeer belangrijke resultaten gegeven heeft. Door het ringen van jonge ooievaars in het nest b.v. heeft men den weg, die deze vogels naar hunne winterkwartieren volgen en de winterkartieren zelve met zekerheid kunnen bepalen en ook kunnen aantoonen, dat de ooievaars in de streek, waar zij zijn uitgebroed, weder terugkeeren.

