

bewandelde, want er was geen der ouden bij. Vroeger heeft deze echte boschvögel hier, zoover ik weet, nooit in de stad gebroed, in den omtrek (Wageningsche Berg, Oranje-Nassau's Oord Keyenberg, Grebbeberg) natuurlijk wel. Ik heb zoo'n idee, dat het met die klevers net zoo zal gaan als indertijd met spreeuwen, merels, zanglijsters e. a. Wie daarom nog iets merkt van het broeden van den blauwspecht, vooral in de steden, moet er toch eens mededeeling van doen ('t zij aan de redactie of aan mij) dan kunnen we nagaan, of m'n voorspelling juist is.

Wageningen.

A. B. WIGMAN.

**Anemone Sylvestris en Peperkers bij Leiden.** — Hierbij zend ik u een anemone, gevonden op 't landgoed Oud-Poelgeest. Verscheidene ex. kwamen er voor. Zou u mij in *D. L. N.* er even over willen inlichten? Een mijner leerlingen, (Chr. kweekschool te Leiden) bracht mij de Peperkers, *Lepidium latifolium*, in de flora met z. z. z. aangeduid.

Leiden.

J. DE JONG SAAKES.

Uw anemone is niet de gewone boschanemone, maar *Anemone sylvestris*, die bij ons niet in het wild voorkomt.

H.

**Paarse Boksbaard.** — In de geïllustreerde flora van 1909 staat op blz. 1043 dat een paarse boksbaard alleen gekweekt of in 't geheel niet meer bij ons voorkomt en op blz. 1064 dat die plant vroeger bij ons gekweekt en nog wel eens als verwilderd exemplaar teruggevonden is (Zeeland).

Bij dezen meld ik u echter, dat deze plant bij minstens 100 exemplaren (te zamen met gele boksbaard) hier aan de zeedijk tusschen Enkhuizen en Andijk te vinden is. Of het verwilderde exemplaren zijn, weet ik niet te zeggen.

Enkhuizen.

DE KONING.

**Literatuur over Hagedissen.** — 1e vraag: Welk werk moet ik raadplegen om antwoord te vinden op onderstaande vragen? Van de familie *Lacertidae* wilde ik gaarne het volgende weten: 1o. Welke zijn de namen van de geslachten dezer familie? 2o. Van de geslachten het kenmerk der soorten waardoor het zich van de overige onderscheidt of waardoor ze zamen dat geslacht vormen en de namenlijst der soorten welke het geslacht vormen. 3o. Van de soorten de opgave der kenmerken waardoor het zich van de overige soorten uit zijn geslacht onderkent en welke verscheidenheden men weer vervolgens in de soort onderscheidt; verder welke eigenaardigheden, verbreidingsgebied en alles wat men van de soort heeft opgemerkt.

2e vraag. In Dr. Bade's Praxis der terrasienskunde staat onder de kleurendrukplaat *Lacerta* var. *lissana*, forma *melisellensis* und *Lacerta litoralis* var. *lissana* W. en in de inhoud staat dat de plaat voorstelt *Lacerta serpa* var. *melisellensis* und *Lacerta fiuma* var. *lissana*; wat beteekent dat, dat is toch niet hetzelfde?

Den Haag.

W. v. H.

Dit alles vindt u in: 1o. Dürigen, Die Amph. u. Reptiliën, Deutschland; voor Europeesche. Verder: a. Mehely Archi- und Neo-lacerten, 1907. Ann. Hist. Mus. Nat. Hung., Budapest (mij niet bekend. H.). b. Cambridge Nat. History, Amphibia and Reptiles VIII.

2o. Ik heb het al lang opgegeven, met Bade *Lacerta*-variëteiten te bepalen.

H.

### CORRESPONDENTIE.

*H. N. de F., Bussum.* De groote oranje vlekken op *Rhamnus* zijn van de zwam: *Puccinia coronata*, waarvan de sporen op rogge overgaan en daar weer voortwoekeren. De kleine oranje stipjes zijn van een andere zwam (*Aecidium rhamni*).

H.

*G. de G., te Vogelenzang.* De op den bodem der sloot door u waargenomen eeuwig kronkelende wormpjes zijn Kokerwormpjes; *Tubifex*. Alleen die speldeknoopvormige kop zal wel op gezichtsbedrog berusten. *Tubifex* zit nl. met de voorste helft van zijn lichaam in het slijk en het wuivende gedeelte is het staartstuk, dat echter aan het einde niet verdikt is. Zoodra in de vragenbus onzer vereeniging plaatsruimte is, wil ik gaarne een en ander over dezen nuttigen sloot- maar lastigen aquariumbewoner meedeelen. Wilt u hem voorloopig eens nader bezien, schep dan met een pannetje wat modder op van de plaats, waar u *Tubifex* ziet (niet te ondiep) en gooi dat in een glaasje. Eerst is het wel een vreeselijke modderboel, maar na eenigen tijd wordt het wel weer helder en u kunt dan de wonderlijke dieren van alle kanten bezien.

Rotterdam.

P. HANNIK.

Het was dus toch *Tubifex*, zooals ik vermoedde en vooropstelde; maar de waarnemer sprak van lange, witte draden. *Tubifex* is bij mij altijd rood, en niet langer dan  $1\frac{1}{2}$  à 2 cm.

E. HEIMANS.

Voorloopig wijzen wij even op het verschijnen van een mooi determineerboekje, door L. Dorsman, voor de schelpen van ons strand. f 1.30 geb.

H.