

In deze vlugschriften wordt eene korte beschrijving gegeven van de levenswijze der insecten, van de schade die zij aanrichten en van de middelen ter bestrijding. De brochures worden, zoolang de voorraad strekt, op aanvraag aan den inspecteur der staatsbosschen en ontginningen te *Utrecht*, gratis aan belanghebbenden toegezonden.

Gele Doovenetel te Bussum. — Hierbij zend ik u een exemplaar van Gele Doovenetel (*Galeobdolon luterum*). Ze groeit hier in Bussum in het wild en beslaat een plek wel van 2 M².
Bussum. R. KOOPMANS.

Windepijlstaart. — Toevallig las ik heden in uw boek »In 't bosch«, dat u gaarne zoudt weten, als er een Windepijlstaartrups op de Wilde Balsemien voorkwam. Hiermede bericht ik u dan, dat ik er op genoemde plant een rups van vond in Thal in Thüringen.
Groningen. E. H. J. WIJNNE.

Stengellooze Pinksterbloem. — Heden met mijn dochter tusschen Haarlemmerliede—Sparndam botaniseerende, vond ik aldaar in een weiland eenige exemplaren van een *Cardamine pratense*, geheel afwijkende van den gewonen vorm, n.m.: de plant was rosetvormig en uit dit roset kwamen twee elk op lange stelen staande bloempjes, op de wijze van *Primula acanulis*. Op een ander exemplaar stonden twee bloempjes op de anders onverdeelde onbebladerde steel. Ik heb van deze rosetvormige plantjes een paar medegenomen en hoop ze in de centrale schooltuin alhier te behouden.

Zijn dergelijke afwijkingen u bekend?

Haarlem.

LEONARD SPRINGER.

In Deel VI van *D. L. N.*, afl. 25, heb ik een dergelijke plant vermeld en geteekend.

De vorm schijnt zeldzaam voor te komen. Ik vond hem in een park.

H.

Gefascieerde Marguerite. — Ingesloten een ganzebloem, door den heer Heuff gevonden. Wat is hier de oorzaak der misvorming.

Groenlo.

C. H. F. A. CORBELIJN BATTARD.

Uw ganzebloem vertoont een sterke fasciatie of bandvorming, een abnormaal verschijnsel dat in dit jaar zeer veel lijkt voor te komen.

H.

Gerande Watertor. — Reitter (*Käferbuch I*, S 232) merkt van *Dytiscus marginalis* op, dat ♀♀ hare eieren vaak aan verschillende lichaamsdeelen der ♂♂ kleven en dat deze die eieren tot het uitkomen meedragen. In verband daarmee berichtte de heer J. den Doop in een verg. der afd. Oost-N. Br. (N. N. V.) dat hij een ♂ gevangen had, waaraan tal van larven zaten.

Ik vind dit een mooie waarneming. Bekend is, dat de waterkevers op warme zomeravonden vaak het water verlaten. Ze komen dan wel eens tegen een verlicht raam of in een openstaande kamer vliegen. En 's morgens kan men ze in allerlei kleine waterplassen enz. vinden. Bij een mijner kennissen, waar in den tuin een vijver is, rijk voorzien van waterinsecten heb ik met de jongens in een gewone regenton wel eens een 20 groote *Dytiscidae* gevangen maar nooit had ik 't geluk aan ♂, dat me zóó of op 't droge in handen viel eieren of larven te vinden.

De lezers moeten hun ervaringen eens meedeelen en er verder op letten. De redactie ruimt hun zeker een plaatsje in.

Uden.

SAMBEER.

Mak kneutje. — Dezer dagen bezorgde een onzer leerlingen mij een heel aardig vogeltje, zooals ik er nog nooit een gezien had. Het diertje was vrij mak. Het liep over mijn hand, alsof het mij reeds jaren kende. Ook at het gretig van een handje kanariezaad. Ik heb het in een kooi gezet, waarin het nu reeds een week vroolijk rondspringt. Het heeft een grijs gegolfd kopje. Aan zijn keel heeft het een donkerroode band. Rug en buik zijn meer bruin met zwarte dwarsbandjes. Het snaveltje is stomp, dus het diertje behoort wellicht tot die vogels, welke zich niet met insecten voeden. Het zingt ook een enkele maal, doch heel zacht. Het geluid heeft wel eenige overeenkomst met het kirren van een duif. Het komt in grootte overeen met een kanarievogeltje, doch is iets kleiner.

Gaarne ontving ik in *D. L. N.* eenig antwoord, wat of dit voor een beestje kan zijn. Zou ik het ook in leven kunnen houden?

Rozenburg.

H. MOERMAN.

Zeer waarschijnlijk een kneutje.

H.

Boomklevers (*Sitta caesia L.*). — Omtrent de boomkleversgeschiedenis (zie de laatste Nos. van *D. L. N.* jaarg. XV, alsmede de eersten van jaarg. XVI) kan ik nog mededeelen, dat ze beslist bij mij in de buurt gebroed hebben, want den 3den Juni ontdekte ik in den tuin een paartje met 5 pas uitgevlogen jongen. Pinkster-Zondag observeerde ik nog een jong ex. in de kastanjeboomen langs onze stadsgracht, dat daar de paden der onafhankelijkheid

bewandelde, want er was geen der ouden bij. Vroeger heeft deze echte boschvögel hier, zoover ik weet, nooit in de stad gebroed, in den omtrek (Wageningsche Berg, Oranje-Nassau's Oord Keyenberg, Grebbeberg) natuurlijk wel. Ik heb zoo'n idee, dat het met die klevers net zoo zal gaan als indertijd met spreuwen, merels, zanglijsters e. a. Wie daarom nog iets merkt van het broeden van den blauwspecht, vooral in de steden, moet er toch eens mededeeling van doen ('t zij aan de redactie of aan mij) dan kunnen we nagaan, of m'n voorspelling juist is.

Wageningen.

A. B. WIGMAN.

Anemone Sylvestris en Peperkers bij Leiden. — Hierbij zend ik u een anemone, gevonden op 't landgoed Oud-Poelgeest. Verscheidene ex. kwamen er voor. Zou u mij in *D. L. N.* er even over willen inlichten? Een mijner leerlingen, (Chr. kweekschool te Leiden) bracht mij de Peperkers, *Lepidium latifolium*, in de flora met z. z. z. aangeduid.

Leiden.

J. DE JONG SAAKES.

Uw anemone is niet de gewone boschanemone, maar *Anemone sylvestris*, die bij ons niet in het wild voorkomt.

H.

Paarse Boksbaard. — In de geïllustreerde flora van 1909 staat op blz. 1043 dat een paarse boksbaard alleen gekweekt of in 't geheel niet meer bij ons voorkomt en op blz. 1064 dat die plant vroeger bij ons gekweekt en nog wel eens als verwilderd exemplaar teruggevonden is (Zeeland).

Bij dezen meld ik u echter, dat deze plant bij minstens 100 exemplaren (te zamen met gele boksbaard) hier aan de zeedijk tusschen Enkhuizen en Andijk te vinden is. Of het verwilderde exemplaren zijn, weet ik niet te zeggen.

Enkhuizen.

DE KONING.

Literatuur over Hagedissen. — 1e vraag: Welk werk moet ik raadplegen om antwoord te vinden op onderstaande vragen? Van de familie *Lacertidae* wilde ik gaarne het volgende weten: 1o. Welke zijn de namen van de geslachten dezer familie? 2o. Van de geslachten het kenmerk der soorten waardoor het zich van de overige onderscheidt of waardoor ze zamen dat geslacht vormen en de namenlijst der soorten welke het geslacht vormen. 3o. Van de soorten de opgave der kenmerken waardoor het zich van de overige soorten uit zijn geslacht onderscheidt en welke verscheidenheden men weer vervolgens in de soort onderscheidt; verder welke eigenaardigheden, verbreidingsgebied en alles wat men van de soort heeft opgemerkt.

2e vraag. In Dr. Bade's Praxis der terrasienskunde staat onder de kleurendrukplaat *Lacerta* var. *lissana*, forma *melisellensis* und *Lacerta litoralis* var. *lissana* W. en in de inhoud staat dat de plaat voorstelt *Lacerta serpa* var. *melisellensis* und *Lacerta fiuma* var. *lissana*; wat beteekent dat, dat is toch niet hetzelfde?

Den Haag.

W. v. H.

Dit alles vindt u in: 1o. Dürigen, Die Amph. u. Reptilien, Deutschland; voor Europeesche. Verder: a. Mehely Archi- und Neo-lacerten, 1907. Ann. Hist. Mus. Nat. Hung., Budapest (mij niet bekend. H.). b. Cambridge Nat. History, Amphibia and Reptiles VIII.

2o. Ik heb het al lang opgegeven, met Bade *Lacerta*-variëteiten te bepalen.

H.

CORRESPONDENTIE.

H. N. de F., Bussum. De groote oranje vlekken op *Rhamnus* zijn van de zwam: *Puccinia coronata*, waarvan de sporen op rogge overgaan en daar weer voortwoekeren. De kleine oranje stipjes zijn van een andere zwam (*Aecidium rhamni*).

H.

G. de G., te Vogelenzang. De op den bodem der sloot door u waargenomen eeuwig kronkelende wormpjes zijn Kokerwormpjes; *Tubifex*. Alleen die speldeknopvormige kop zal wel op gezichtsbedrog berusten. *Tubifex* zit nl. met de voorste helft van zijn lichaam in het slijk en het wuivende gedeelte is het staartstuk, dat echter aan het einde niet verdikt is. Zoodra in de vragenbus onzer vereeniging plaatsruimte is, wil ik gaarne een en ander over dezen nuttigen sloot- maar lastigen aquariumbewoner meedeelen. Wilt u hem voorloopig eens nader bezien, schep dan met een pannetje wat modder op van de plaats, waar u *Tubifex* ziet (niet te ondiep) en gooi dat in een glaasje. Eerst is het wel een vreeselijke modderboel, maar na eenigen tijd wordt het wel weer helder en u kunt dan de wonderlijke dieren van alle kanten bezien.

Rotterdam.

P. HANNIK.

Het was dus toch *Tubifex*, zooals ik vermoedde en vooropstelde; maar de waarnemer sprak van lange, witte draden. *Tubifex* is bij mij altijd rood, en niet langer dan $1\frac{1}{2}$ à 2 cm.

E. HEIMANS.

Voorloopig wijzen wij even op het verschijnen van een mooi determineerboekje, door L. Dorsman, voor de schelpen van ons strand. f 1.30 geb.

H.