


VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.

Adder-Vergiftiging. — In October 1908 deelde ik aan *De Levende Natuur* mede, als bijdrage over het voorkomen van adders, hoe te Baarn een jongen door een adder gebeten was. Op Zondag 19 Mei l.l. kwam 's middags een jongen van 14 jaar bij mij met een opgezwollen hand, tengevolge van een adderbeet, een uur te voren op het landgoed Groeneveld gekregen, bij een poging om de adder met de hand te vangen. Het was juist op dezelfde plaats geweest, waar ook 4 jaar geleden de adders gevangen waren. De jongen bracht de adder nog levend mede, zoodat ik mij ook werkelijk kon overtuigen, dat het een adder geweest was. Het was een zeer groot exemplaar, 70 c.M. lang en op het dikste gedeelte had het een omvang van 8 c.M. Hierbij voeg ik een paar photo's die, hoewel niet zoo scherp als ik gewenscht had, u toch van de identiteit kunnen overtuigen. Den volgenden dag was de arm van den jongen geheel opgezwollen en had hij daarbij temperatuursverhooging. De zwelling liep verder tot schouder en borst. Onder bedrust, inwikkeling enz. ging de zwelling langzaam terug, zoodat de jongen na een week hersteld was, ofschoon toen de arm nog geel en blauw verkleurd was; wat ook langzamerhand geheel verdwenen is. Op de eene photo had ik een duimstok er naast gelegd, in de hoop dat dit op de photo te zien zou zijn, om de lengte te vergelijken. Daarnaast had ik voor rariteit een reuzenexemplaar van de eetbare Champignon of Kampernoelje *Psalliota arvensis* geplaatst, dat hier een veertien dagen geleden in het bosch werd gevonden. De hoed had een middellijn van ruim 20 c.M. De vliezige ring is duidelijk te zien. Behalve de grootte is ook de tijd van het jaar, Juni, waarin thans vele champignons gevonden worden, zeer ongewoon, daar deze gewoonlijk eerst in September voorkomen.



Baarn.

Dr. F. P. A. MUYSKEN.

De Waterrietzanger in Nederland. — Ter aanvulling van hetgeen op pag. 83 in het nummer van 15 Juni j.l. van dit tijdschrift over vroegere vermeldingen van den *Waterrietzanger* in Nederland is medegedeeld, wensch ik de aandacht te vestigen op het navolgende, zooals ik met een enkel woord reeds deed in de inleiding der XV Familie: *Sylviidae* in mijn »Oologia Neerlandica,« bij *Calamodus aquatica* (Gmelin).

In de tusschen 1845—1854 bewerkte »Fortpflanzungsgeschichte der gesammten Vögel«, van Dr. F. A. L. Thienemann, nog steeds het beste werk op het gebied der nest-kunde, waarvan de tekst helaas door langdurige, ernstige ziekte van den auteur onvoltooid is gebleven, vermeldt Dr. Th. dat hij van den *Waterrietzanger* meerdere nesten uit de omgeving van Rotterdam, door tusschenkomst van den heer Löffbecke aldaar kreeg toegezonden. Over het geheel genomen onderscheiden zich die nesten — zegt Dr. Th. — van die van den gewonen *Rietzanger* door: 1. geringere wijde; 2. ingetrokken binnenrand en 3. met meer zorg geëffende binnenbekleding.

Gaarne houdt de *Waterrietzanger* — zoo wordt t.a.p. ook gezegd — zich op lage plaatsen op, die over groote uitgestrektheid met *Carex*-soorten zijn begroeid. Zijn vindplaats bij Wageningen, in de *Geldersche Vallei* namelijk is dus daarmede wel in overeenstemming.

Met Gloger, Schlegel e. a. hield Dr. Thienemann reeds *cariceti* en *aquatica* voor één soort. Arnhem, 19 Juni 1912.

A. A. VAN PELT LECHNER.

Varenrijkdom. — Dat hier de gewone varensorten op de grenzen van Groningen-Drenthe in menigte voorkomen, zal wel algemeen bekend zijn, wellicht stelt u er echter belang in, dat de vindplaats van *Phegopteris polypodioides* te Paterswolde nog altijd goed voorzien is. Gelukkig dat het plukken daar verboden is. *Scolopendrium vulgare* komt te dezer stede in het Noorderplantsoen voor, evenals menige andere zeldzame plant. *Asplenium ruta muraria* vindt men aan de Z.-W.-zijde van de meeste kerken in deze omgeving. De *Phegopteris dryopteris* vond ik ($\pm$ 20 stuks) onder Zuidlaren, één *Polystichum oreopteris* onder Schipborg.

Polystichum thelypteris en *Osmunda regalis* verdringen elkander bij de eendenkooi onder Haren. De *Cystopteris fragilis* moet voorkomen in het bosch van de Fraeylemaborg te Slogteren, waar ik op een zonnig plekje onder de *Pteridia aquilina* ook méénde de variëteit *brevipes* te zien.

Mag ik meteen — misschien niet voor het eerst — de aandacht vestigen op dat eenig mooie Slogterensche bosch? De bijzonder goede grond blijft daar als boschgrond gespaard. Men vindt er een menigte boschplanten en ook andere planten als in weinige bosschen elders. De uil en hermelijn zijn er ook aangetroffen. Onder de planten en boomen kan men noemen: *Aesculus flava*, *Anemone nemorosa* (ook dubbele, mede de gele Anemoon), *Convallaria maialis*, *Digitalis purpurea*, (ook witte), *Doronicum*, *Endymion natus*, *Geranium robertianum* (in het N. niet zoo veelvuldig als in Holland), *Impatiens nolitangere*, *Lilium martagon*, *Ornithogalum umbellatum*, *Sedum purpureum* (hier algemeen), *Sambucus racemosa*, *Solidago*, *Vinca minor*.

Eindelijk kan ik u melden, dat ik de *Gagea spathacea* tusschen Roden en Lieveren vond.

Na een week heeft mijn vorig schrijven aanvulling nodig. Dinsdag vond ik onder Zuidlaren een tweede vindplaats van *Polystichum oreopteris*, 28 Juni onder Norg-Donderen eindelijk ook de *Polystichum cristatum*, zoodat naar mijn weten hier in het Noorden voorkomen uit uw Flora: *Polypod. vulg.* *Blechnum spic.*, *Asplenium ruta muraria*, *Scolopendrium vulgare* (niet wild), *Athyrium filix femina*, *Polystichum thelypteris*, *oreopteris*, *filix mas. spinulosum* (2 var.), *cristatum*, *Phegopteris polypodioides*, *dryopteris*, (*Cystopteris fragilis*?), *Osmunda regalis*.

Groningen.

Prof. Dr. A. VAN VELDHIJZEN.

Kerstroos. — In mijn tuin bloeide begin Januari een kerstroos en krijgt nu nieuwe bladeren en daartusschen één bloem, die bovendien nog de volgende merkwaardigheden vertoont, zooals de teekening aangeeft. 't Gewone schutblad is vereenigd tot een miniatuur gewoon blad, terwijl in de oksel twee kleine blaadjes staan. Tegen de bloem bevinden zich twee schutbladen.

J. C. RIJK.

De inlandsche moerasschildpad. — Na de volgende mededeeling zal wel niemand meer twifelen aan het in volkomen wilden staat voorkomen van de moerasschildpad. In Noord-Limburg wordt aan natuurstudie zeer weinig gedaan en de streek om Meerlo waar ik het nu speciaal over zal hebben kan een filiaal van Merkelbach nog goed missen. Tusschen Meerlo en Blitterswijk ligt het gehucht Miegielsum en hierbij liggen eenige plassen, met de Maas in verbinding, en er een goed uur van verwijderd. In Miegielsum denkt niemand er aan een aquarium te houden maar velen aan vissen. En nu was dezer dagen iemand zoo gelukkig, in een trommel een volwassen vrouwelijk exemplaar van een moerasschildpad te vangen. Op 't oogenblik wordt ze als een curiosum te Miegielsum bewaard en ik hoop dat mijn raad, ze maar weer in haar oude pool te werpen, dezer dagen opgevolgd wordt.

Well (L).

A. H. M. WILLEMSE.

Tuinmerels. — In het artikel »Het Merelvraagstuk«, afl. 24 vorige jaarg., nam ik met verbazing kennis van de slechte hoedanigheden die in de Zwitsersche Catalogus aan de zoogen. tuinmerels worden toegeschreven. Er huizen hier dicht bij in 't waterrijk parkje verscheidene paren en juist van morgen werd ik heel vroeg op de aangenaamste wijze gewekt door de wonder-schoone zang van een van deze veronderstelde snoodaards, die mij tevens verleden najaar groote diensten in den tuin bewees door met alleszins navolgenswaardigen ijver bladeren om te werken, natuurlijk om de insecten te krijgen. Vroeger in Den Haag zag ik ze ook altijd zoo bezig. 't Lied van van morgen had dat echte krachtvol uitgeworpen, wijdklinkend geluid, dat ik van een merel altijd zoo mooi vind. Hij zong zoo wat onophoudelijk een half uur achter elkaar zijn morgen-hymne en ging toen zeker aan den arbeid, die naar ik tot mijn spijt in 't vogelboekje las, ook wel bestaat in 't verorberen van jonge vogeltjes. Dat spijt mij van mijn lievelingsvogel.

Gouda.

A. STAVENISSE DE BRAUW.

GEVRAAGD:

Ter overname gevraagd een goedkoop soort prismakijker in goeden staat. Adres: A Pot Jzn., Steinstraat 1, Alkmaar.

