

Op het voorgaande artikel van den Heer de Meyere, dat de Redactie zoo vriendelijk was mij ter inzage te doen toekomen, wensch ik ten besluite mede te deelen, dat de Catalogus der Collectie van Dr. Thienemann geen jaartal draagt; gelukt het mij omtrent den tijd van zijn verschijning gegevens te verkrijgen, dan zal ik die gaarne mededeelen.

Thienemann beschouwde *Kleine Karekiet* en *Boschrietzanger* als twee vormen ¹⁾ van één soort; eerstgenoemde toch duidt hij in zijn »Fortpflanzungsgeschichte« (pag. 192) als »Hauptform« aan.

Dat ik Dr. Hennicke's gevoelen, als zoude Dr. Thienemann bepaalde eieren van zijn (Thienemann's) »*palustris-vorm*« met die van zijn »*strepera-vorm*« verward hebben, niet deel, blijkt uit hetgeen ik bij die soorten in het algemeen overzicht der *Sylviidae* in mijn Eierwerk daarover zeg.

Komen ons nu, door Thienemann's van de onze afwijkende inzichten omtrent het wezen der »soort«, diens opvattingen aangaande *Kleine Karekiet* en *Boschrietzanger* ongerijmd voor dan verzuime men niet zichzelf de vraag te stellen: Weten wij thans met zekerheid iets af omtrent de ware verhouding, die phylogenetisch tusschen *A. strepera* en *A. palustris* bestaat?

Arnhem, 17 Maart 1913.

A. A. VAN PELT LECHNER.

¹⁾ In mijn »Oologia Neerlandica« gelieve men t. a. p. achter het woordje »voors« de woorden »twee vormen van«, en in mijn vorig artikel in »D. L. N.« voor »Abarten« het woord »Formen« te lezen.

MORIELJES.



EDEREEN, denk ik, kent wel morieljes, al was het dan maar ingemaakt in de lange glazen cylinders, zooals men ze in de delikatessenwinkels ziet prijken: ronde sponsachtige dingies op korte steeltjes; raar goedje eigenlijk; je kunt niet begrijpen, dat dat nu zoo lekker moet wezen en toch, het neusje van de zalm, zeggen de kenners. »Die hierher gehörigen wohlschmeckenden Speisepilze sind von national-ökonomischer Wichtigkeit, wie ein Blick auf die Märkte im Frühjahr beweist« zegt Dr. Rehm, de oude ascomycetenkenner. Inderdaad nemen zij een belangrijke plaats in onder de handelspaddenstoelen. Niet zoo zeer als volksvoedsel — daar zijn zij veel te duur voor — doch als delicatesse: in een natuurlijk stelsel komen ze dus in de groep van oesters, caviaar en eetbare vogelnestjes....

»In 't voorjaar?« vraagt wellicht menigeen, voor wien het begrip »paddenstoel« onafscheidbaar met den herfst verbonden is. Ja, dit zijn nu eens lenteszwammen; als de anemonen bloeien, dan komt ook de tijd van de morieljes; vooral aan boschranden, onder hakhout en d.g. kan men ze dan aantreffen.

Er zijn een aantal soorten van, waarvan de begrenzing soms moeilijk te bepalen is. Rehm zegt: »De begrenzing der soorten is zeer moeilijk, doordat de geheele vorm, maar vooral de hoed, zoo sterk afwisselt onder invloed van bodemgesteldheid en weersveranderingen«. Ten einde eene nauwkeurige studie te kunnen maken van de bij ons voorkomende morieljes en hunne verspreiding, wenschte ik tot de lezers het volgende verzoek te richten:

Zoo ge op uwe voorjaarswandelingen morieljes aantreft, zendt er dan enkele exemplaren van op naar Leiden. Het eenvoudigst geschiedt dit als monster zonder waarde, waar men op zet: »studiemateriaal«. Daar hier niets bij geschreven mag worden, voege men een briefkaart bij, waarop men de vindplaats, en liefst ook eenige bijzonderheden omtrent grondsoort en d.g. vermeldt. Gaarne zal ik dan naam en bijzonderheden van de gevonden voorwerpen in ruil geven, terwijl de zwammen zelve in de Standaardcollectie der Nêd. Myc. Ver. worden opgenomen, en voor zoover noodig ook gefotografeerd.

Op deze wijze hoop ik een overzicht te kunnen verkrijgen van onze morieljes en hunne verspreiding en tevens eene verzameling van typen bijeen te brengen, van blijvende waarde voor de studie dezer belangrijke Fungi.

Natuurlijk zijn ook andere voorjaarszwammen (b.v. bekerzwammen) mij zeer welkom, zooals alle toezendingen; toch wilde ik op de morieljes speciaal even de aandacht vestigen.

Leiden, 's Rijks-Herbarium,

H. A. A. v. d. LEK.

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.

Tentoonstelling te Luik. — In het Palais des Beaux Arts de la ville de Liège zal van 3 Mei tot 1 Juni 1913 een internationale ornithologische tentoonstelling worden gehouden, ook betreffende de betrekkingen tusschen ornithologie, entomologie en botanie, die volgens het ons toegezonden programma zeer belangrijk kan worden. Alle inlichtingen omtrent deze tentoonstelling zijn te bekomen bij den heer M. L. Cuisinier, 155 Rue de Bruxelles te Ans. T.

Vreemde vangst. — In verband met het berichtje (zie 't nummer van 15 Mrt.) het volgende: In de eendenkooi werden niet één, maar twee paartjes aangetroffen. Het gevangen tweetal hoort niet bij elkaar. De woerd van 't eene paar dreef de eend van 't andere de pijp in en zoo werden deze gevangen. Zoo wordt 't vermoeden, dat 't uit een volière ontvluchte vogels zouden zijn, al zeer gering. Trouwens, daarvoor zien de vogels er ook te mooi uit. Een en ander deelde ik ook mee aan Baron Snoutckaert.

Zwolle.

B. G. RUTTINK.

Aanvullingen en verbeteringen in de lijst van nieuwe plantensoorten en nieuwe vindplaatsen van zeldzame plantensoorten, vermeld in *De Levende Natuur* XVII, 403—406.

Behalve aanvullingen van de H. H., die in de vorige lijst vele opgaven deden, bevat deze lijst ook eenige nieuwe opgaven, aan mij verstrekt door den Heer B. H. Danser te Rotterdam (verkort tot B. H. D.).

De lijst van nieuwe soorten en variëteiten moet aangevuld worden met:

Panicum sanguinale var. *distachyum* Aschrs. et Gr. te Gorinchem (H.).

Phalaris coerulescens Def. te Rotterdam (1910, H. N. Kooiman), in het verslag D. L. N. XVI, 358 opgegeven als *P. nodosa*.

Apera spica venti var. *subbiflora* Heur, te Gorinchem (H.).

Avena sterilis L., te Gorinchem (H.), te Rotterdam (B. H. D.).

Lagurus ovatus L., te Rotterdam (1910, H. N. Kooiman).

Glyceria plicatus Fr., te Rotterdam (1909), Reuver (1914), Nuth (1912) (B. H. D.).

Bromus japonicus B. *velutinus* Aschr. et Gr., te Gorinchem (H.).

Lolium linicolum var. *aristatum* Döll., te Gorinchem (H.).

" " var. *oliganthum* Beck, te Gorinchem (H.).

" " m. *compositum*, te Gorinchem (H.).

Aegilops caudata B. *polyathera* Boiss., te Gorinchem (H.).

Axyris hybrida Pers., te Amsterdam (H.).

De lijst van nieuwe vindplaatsen van zeldzame plantensoorten moet aangevuld worden met:

Muscari comosiem, te Haarlem (C. Sipkes), in het verslag XVII 403—406 opgegeven als *M. botryoides*.

Panicum capillare, te Gorinchem (H.).

Panicum crus galli E. *brevisetum* var. *paniculorum* Aschrs et Gr., te Lochem (H.) en te Zandbulte (Fr.) (K.) (in het verslag XVII 403—406, vermeld als *P. crus galli* B. *brevisetum*).

Phalaris intermedia, te Rotterdam (B. H. D.).

Phleum graecum, te Gorinchem (H. en K.).

Polypogon interruptus, staat in verslag XVII 403—406 als gevonden door W. en J.; deze is ook gevonden door B. H. D.

Dactylis glomerata b. *abbreviata*, staat in verslag XVII 403—406 als gevonden te Wormerveer, dit moet zijn te Dordrecht.

Bromus japonicus, te Gorinchem (H. en K.).

Bromus japonicus var. *porrectus* Hack, te Arnhem Rijnsoever (H.).

Bromus arvensis b. *oliganthus*, moet in verslag XVII 403—406 vervallen.