

Vogelvoer voor den winter. — Men vraagt mij, of lijsterbessen voor den winter kunnen worden bewaard of ingemaakt. Wel, dat is heel eenvoudig, je hebt ze maar te drogen. Pluk alleen maar af wat de spreuwen en jonge lijsters hebben laten zitten en hang dat op zolder aan draden te drogen. Zoo kunnen ook behandeld worden de vruchten van Kardinaalsmuts, Geldersche roos, berberis, meidoorn en zelfs duindoorn. Het is goed de trossen te plukken even voordat ze rijp zijn. Dat de vogels er dol op zijn, blijkt al wel voldoende uit 't feit, dat in de lijsterstrikken ook altijd gedroogde lijsterbessen worden gebruikt.

Th.

Vergroeiing. — De hierbijgaande afbeelding stelt een eigenaardige vergroeiing van een paar worteltjes voor. Mochten soms lezers van D. L. N. dergelijke afwijkingen verzamelen, dan zijn ze gaarne ter beschikking.

Haarlem

J. C. RIJK.

Uit een brief van een nestjeszoeker. — Wat mijn koekoeken betreft, die van den duimpieper is mislukt, dat weet u al; de boompieper-koekoek en de tapuitkoekoek zijn uitgevlogen en nu van 't paapjesnest met 't koekoeksei komt een heele geschiedenis. Na 12 dagen kwamen er 3 paapjesieren uit. Den volgenden dag om ongeveer denzelfden tijd waren de andere 2 (1 paapjesier en 't koekoeksei) ook uit. De jonge koekoek was zwart. De paapjes roze. Nu nam ik één van de jonge paapjes uit 't nest en zette hem bij een kneu, die 6 jongen had om te kijken, of 't lukken zou de andere paapjes nadat ze er uit waren gegooid ook onder te brengen bij een kneu. Toen ik den volgenden dag kwam leefde 't nog. Toen ik bij de koekoek kwam, lagen er 3 levende paapjes buiten 't nest en de koekoek riep om eten. Ik nam ze mee en bracht ze onder bij dezelfde kneu, zoodat die er toen 10 jongen op nahield, 6 echte, 4 pleegkinderen. Maar dit ging zoo niet. Het nest was hol gevuld. Toen ging ik op zoek naar een ander nest, om ze daarbij te deponeeren. Spoedig vond ik er één; van een kneu weer. Ik ging terug naar de andere kneu haalde 3 paapjes jongen en legde ze in 't nestje van de kneu, die 3 eieren had. Ik dacht niet dat 't goed zou gaan, ze waren halfdood, maar 's avonds om half negen kwam ik bij 't nest, de kneu vloog er af en de jongen waren springlevend. Nu had ik dus een kneu met 3 paapjes-jongen en 3 eieren, een kneu met 6 jongen en 1 paapjesjong en een paapjesnest met een jongen koekoek. Een paar dagen later kwam ik weer, toen was de kneu met 3 eieren en 3 jongen uitgehaald, de andere kneu ging goed, de koekoek werd een leelijk zwart dier. Een paar dagen ging 't goed, toen was de jonge koekoek uitgehaald. Toen ging ik naar de kneu met 6 jongen en 1 paapjesjong. Ik vond er 4 bijna flukse kneujongen; waar de 2 andere en 't paapjesjong waren gebleven mag Joost weten.

Nu is ook dat nest uitgehaald. Misschien waren ze al net uitgevlogen. Nu is er dus één stuk afgehandeld. U vraagt me in uw brief ook hoe 't met al die nesten is afgelopen. Er is ongeveer $\frac{1}{3}$ van verloren gegaan waarvan $\frac{20}{35}$ dus dat is $\frac{6}{7}$ door uithalerij, misschien nog wel meer.

Nu zal ik u vertellen, hoe 't met mijn klauwieren is afgelopen. Op een Zondagmorgen vond ik een 2^{de} nest met flinke groote jongen en één er van liep weg. Den Zondag daarop was 't nest uitgehaald. De jongen der 1^{ste} klauwier groeiden goed. Dienzelfden Zondagmorgen kwam ik bij hem, toen heb ik zijn jongen bekeken en toen zijn er 2 weggelopen. Nu werd Zondagmiddags ook dat uitgehaald, zoodat 't ééne klauwierenpaar nog maar één jong had, 't 2^{de} twee jongen waarvan 't wijfje er één opvoedt en 't mannetje één. Mannetje en wijfje zijn den heelen dag gescheiden, maar 's avonds komen ze samen met hun jongen om in 't boschje te overnachten. Nu zal ik u ook eens vertellen, wat ze hebben opgeprikt, alleen die 2 families ('t is heel wat): 2 spitsmuizen, 1 veldmuis, 1 nachtuil, 2 kikkers, 3 hagedissenkoppen (de rest van 't beessie was langs de ruggegraat afgekloven), 7 vogels (waaronder zelfs een leeuwerik en 2 van de vogels waren jongen), 5 bijen. Naar 't opprikken te oordeelen zou dus de klauwier hiër schadelijk zijn, maar de kleine dingen prikt hij natuurlijk niet op, dat zijn heel kleine hapjes voor hem, dus die vindt men niet. Maar als men eens een tijdje den vogel stil gadeslaat, ziet men wel hoeveel insecten hij vangt en wanneer men de haarballen nagaat, vindt men niets dan dekschilden van insecten (kniptorren, mestkevers).

Noordwijk.

JAN VERWEY.

