

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.

Nieuwe vindplaatsen in Nederland van zeldzame plantensoorten in 1914.

In deze lijst zijn de volgende verkortingen gebruikt:

- H. voor J. Th. Henrard te 's Gravenhage, J. voor P. Jansen te Amsterdam, K. voor A. W. Kloos Jr. te Dordrecht en W. voor A. de Wever te Nuth (Z. L.).
- Muscari comosum* te Merkelbeek, Bingelrade en Oirsbeek in Z. L. (W.).
- Carex vulpina* B. *nemorosa* te Dordrecht (H., K.).
- Carex acutiformis* var. *spadicea* te Hoensbroek (H.) en Hulsberg (W.).
- Scirpus maritimus* var. *compactus* te Dordrecht en Oostvoorne (H., K.) en te Knollendam (K.).
- Cyperus vegetus* te Knollendam (K.) en te Rotterdam (J. D. Dorgelo).
- Phalaris intermedia* te Knollendam (K.).
- Phalaris coerulescens* te Amsterdam (J. en W. H. Wachter).
- Alopecurus agrestis* var. *versicolor* op den St. Pietersberg (J. en W. H. Wachter).
- Polypogon monspeliensis* te Bovenkarspel (H. N. Kooiman, 1913).
- Agrostis canina* var. *mutica* te Wolfheze (J. en W. H. Wachter).
- Lagurus oratus* te Wormerveer (J. en W. H. Wachter).
- Gastridium lendigerum* te Wormerveer (K.).
- Arrhenatherum elatius* B. *bulbosum* Koch te Beek-Esloo (W.).
- Gaudinia fragilis* te Wormerveer (J. en W. H. Wachter).
- Eragrostis minor* te Sittard (W.).
- Glyceria plicata* te Dordrecht en Oostvoorne (H., K.), te Wormerveer en Bergen (K.), tusschen Mechelen en Epen (B. H. Danser), te Honthem (H.), Hoensbroek, Eis-Wittem, Klimmen, Nuth, Bunde (W.).
- Cynosurus echinatus* te Wormerveer (K.).
- Dactylis glomerata* var. *ciliata* te Wijlre (W.).
- Bromus unioloides* te Sittard (W.).
- Bromus japonicus* te Valkenburg (W.) en te Wormerveer (J., H., K.).
- Bromus japonicus* var. *velutinus* te Valkenburg (W.).
- Bromus arvensis* var. *oliganthus* te Sittard (W.) en te Gorinchem (H.).
- Bromus erectus* var. *villosus* te Groot Lanaye (Z. L.) (H., J.).
- Bromus squarrosus* te Valkenburg (W.).
- Bromus squarrosus* var. *uberrimus* te Amsterdam (J. en W. H. Wachter).
- Bromus tectorum* var. *longipilus* te Valkenburg (W.).
- Hordeum jubatum* te Brummen (L. Dorsman Czn.).
- Hordeum Gussoneanum* te Amsterdam (J. en W. H. Wachter).
- Lolium multiflorum* m. *furcatum* te Wormerveer (K.).
- Aegilops cylindrica* te Wormerveer (K.).
- Aceras anthropophora* te Gronsveld (A. Hardij de Bast, 1910), te Gulpen (L. Backhuis 1914).
- Goodyera repens* te Bergen (N. H.) (C. Sipkes).
- Rumex odontocarpus* te Rotterdam (B. H. Danser, 1910, 1912).
- Rumex crispus* × *sanguineus* te Gorinchem en te Sleeuwijk (H., B. H. Danser).
- Rumex salicifolius* te Wormerveer (H., J., K.).
- Rumex hydrolapathum* × *aquaticus* te Sleeuwijk (H. en B. H. Danser).
- Rumex obtusifolius* × *sanguineus* te Gorinchem (H. en B. H. Danser).
- Rumex obtusifolius* × *conglomeratus* te Gorinchem (H. en B. H. Danser).
- Rumex scutatus* B. *hastifolius* te Eijsden (1912) en St. Pieter (W.).
- Polygonum mite* × *persicaria* te Rotterdam (B. H. Danser 1910, 1912).
- Salsola Kali* B. *tenuifolia* te Wormerveer (K.).
- Kochia scoparia* te Wormerveer (K.).
- Chenopodium urbicum* te Wormerveer (K.), te Sittard (W.).
- Chenopodium multifidum* aangevoerd te Sittard (W.) en te Voerenvaal (W.).
- Chenopodium ambrosioides* (J., H., K.).
- Chenopodium opulifolium* te Wormerveer (J., H., K.), te Sittard (W.), te Gorinchem en Sleeuwijk (H.).
- Axyris amarantoides* te Wormerveer (K.). De opgave van A. hybrida in L. N. 17 p. 575 moet ook veranderd worden in A. amarantoides.
- Atriplex tataricum* te Wormerveer (H., J., K.) en te Gorinchem (H. en B. H. Danser).
- Atriplex roseum* te Maastricht (1912) en te Nuth (W.).
- Amarantus deflexus* te Wormerveer (H., J., K.).
- Amarantus albus*. Aangevoerd te Sittard (W.).
- Herniaria hirsuta* te Heerlen (W. 1910).

- Cucubalus baccifer* te Brummen (L. Dorsman Czn.).
Melandrium album var. *roseum* te Leijduin (C. Sipkes).
Silene muscipula, Tusschen Beek-Elsloo en te Geulle (W. 1911).
Anemone Pulsatilla, Tusschen Echterbosch en Montfort (Z. L.) (Kaufman 1913).
Ranunculus nemorosus op verschillende plaatsen in Zuid-Limburg (W.), ook bij Nijmegen (H. C. M. v. Altena).
Papaver hybridum te Maastricht (1912) en Sittard (1913) (W.).
Glacium flavum, Aangevoerd te Sittard (W. 1913, 1914),
Corydalis ochroleuca te Maastricht (1913 W.).
Nasturtium officinale var. *siifolium* te Geulle, Geullem, Eis-Witten (W.).
Barbarea intermedia, Langs vele spoorwegen in Zuid-Limburg (W.).
Eruca sativa var. *glabrescens* te Maastricht (B. Swart 1913).
Erysimum repandum te Wormerveer (K.) en te Rotterdam (H. N. Kooiman).
Erysimum Perowskianum te Noordwijk verwilderd (K.).
Malcolmia maritima (wit- en roodbloemig) te Noordwijk (Mej. A. M. Wibaut).
Alyssum hirsutum te Wormerveer (K.).
Brassica lanceolata te Dordrecht en Wormerveer (H., K.).
Brassica elongata var. *armoracioides* te Sittard (W.).
Sinapis dissecta op IJsselmonde (K.).
Thlaspi perfoliatum te Vaals, Lemiers, Orsbach, Eijs-Witten, Bemelen (W.), niet aangevoerd.
Lepidium apetalum, aangevoerd te Wijlre (W. 1913).
Lepidium virginicum, aangevoerd te Maastricht, Wijlre, Sittard, Nuth, Kerkrade (W.).
Calepina Corvini, aangevoerd te Gronsveld (W. 1912).
Chorispota tenella te Wormerveer (K.).
Rapistrum perenne, aangevoerd te Sittard (W. 1913).
Rapistrum rugosum B. *glabrum* te Epen (W.).
Helianthemum chamaecistus op den St. Pietersberg, te Canne, St. Geertruid en Bemelen (W.).
Impatiens parviflora te Hilversum (J. P. Rosendaal).
Hibiscus Trionum te Dordrecht (H., K.), te Sittard (W.).
Althaea hirsuta te Nuth-Schinnen (W.).
Geranium divaricatum te Wormerveer (H., J., K.), te Sittard (W.).
Geranium nodosum te Valkenburg verwilderd (1902, W.).
Polygala comosa te Vaals, Lemiers, Orsbach, Eis-Witten, Wijlre, Canne (W.).
Potentilla recta var. *acutifolia* te Gorinchem (H.) en bij den Haag (A. Herman).
Oenanthe pimpinelloides te Gorinchem (H.).
Bifora radians te Wormerveer (K.).
Vicia varia te Wormerveer en Dordrecht (H., K.).
Vicia pannonica te Delftshaven (J. D. Dorgelo).
Gilia achilleaeifolia, verwilderd te Noordwijk (K.).
Phacelia tanacetifolia, blauwbloemig te Hilversum (D. J. Boosman 1905), te Noordwijk (Mej. A. M. Wibaut) en te Helpman bij Groningen (P. Boerma), witbloemig te Noordwijk (B. H. Danser).
Nemophila insignis, verwilderd te Noordwijk (K.).
Lappula patula te Wormerveer (K.).
Lycium halimifolium te Brummen (L. Dorsman Czn.).
Solanum rostratum te Purmerend (A. L. v. Diermen).
Hyoscyamus niger B. *agrestis*, aan een spoordijk bij Arnhem (J. Hofker).
Nicotiana rustica en *affinis* te Wormerveer (K.).
Verbascum phoeniceum te Wormerveer (K.).
Verbascum orientale, aangevoerd te Amsterdam (G. H. H. Zandvoort).
Alectorolophus fallax te Delftshaven (J. D. Dorgelo).
Erigeron linifolium te Wormerveer (J. en W. H. Wachter).
Galinsoga parviflora te Hollandsche Veld (Dr.) (L. Dorsman Czn.), te Amsterdam achter den Hortus (C. Sipkes) en te Wormerveer (J. en W. H. Wachter).
Ambrosia trifida B. *integrifolia* te Wormerveer (H., J., K.).
Achillea nobilis te Wormerveer (K.).
Calendula arvensis te Gorinchem (H.).
Carduus tenuiflorus te Rotterdam (H. en B. H. Danser).
Carduus acanthoides te Wormerveer (H., J., K.).
Centaurea melitensis te Gorinchem (H.).
Centaurea diffusa aan de Maas te Bunde (W.).
Lactuca scariola var. *integrata* te Wormerveer (H., J., K.).
Sonchus arvensis B. *uliginosus* te Wormerveer (K.).
Crepis setosa en *pulcher* te Gorinchem (H.).

H. HEUKELS.