



Raderdierpjes. — Volledigheidshalve plaatsen wij opnieuw de illustraties van de raderdierpjes met de onderschriften, die in de vorige aflevering ontbraken.




Huisjesmakende raderdierpjes

I. *Oecistes*. II. *Tubicolaria*. III. *Melicerta*. IV. *Limnias*.
V. *Floscularia*. VI. *Stephanoceros*.




Raderdierpjes met aanhangels.

I. *Polyarthra*. II. *Triarthra*.




Kolenvormende raderdierpjes

I. *Lacinularia*. II. *Conochilus*.




Ongepaarde raderdierpjes.

I. *Asplanchna priodonta*. Met nog een soort algemeen in vaarten, vijvers, enz. Een zeer gulzig dier, dat zich o.a. met andere doorschijnende raderdierpjes voedt. Het brengt levende jongen ter wereld. II. *Synchaeta*. Verschillende soorten algemeen in zoet en brak water. III. *Hydatina senta*. Kristalhelder; komt algemeen voor in de oeverzone. IV. *Rotifer vulgaris*. Alomtegenwoordig! Brengt levende jongen voort.



Enige gepaarde raderdierpjes.

I. *Brachionus*. Verscheidene soorten algemeen in open en begroeid water. II. *Notholca acuminata* Rondom Amsterdam algemeen. III. *Anuraea cochlearis*. Zeer algemeen in open water. IV. *Anuraea aculeata*. Algemeen in open water. Wordt met de vorige vaak gevangen door *Asplanchna*. V. *Pterodina*. Veel in begroeide sloten en vijvers.



Brachionus angularis.
In zwermen van miljoenen in open water, vooral omstreeks April.

Errata. — *Sexarthra* staat op blz. 48 abusievelijk voor *Hexarthra*.