

ongeluk was, weet ik niet; na even weg geweest te zijn kwam ze terug en ging kalm op 't nest zitten, even daarna echter stond ze op, ging op den rand van 't nest staan, keek er in, ging dan weer zitten, stond weer op, in één woord ze was erg onrustig.

Wel een kwartier lang heeft dat zoo geduurd, toen werd ze weer kalm en ging zitten.

Wanneer een zwaluw op m'n gordijn zit, houdt hij zich ten eerste vast met z'n pootjes, maar hij steunt zich ook veel met z'n staart.

Zwolle.


AGNES MEIJBOOM.

**Abnormaliteit bij een kreeft.** — De hier afgebeelde figuur is een teekening op ware grootte van een ex. van *Cancer pagurus* ♀, waarvan de linker »schaar« op een eigenaardige manier »verdubbeld« is.

Het exemplaar werd door een visscher te Zierikzee gevangen en is in mijn bezit. Hoewel het dier beide laatste leden van de misvormde schaar kon bewegen, scheen de meest aan het uiteinde geplaatste toch alleen gebruikt te worden.

Middelburg.

P. DE BRUYNE.



Abnormale krabbeschaar.

**Hommelnest.** — Ds. O. te W. zond ons brokken van een hommelnest en wel van de akkerhommel (*Bombus agrorum*). Het komt zeer dikwijls voor, dat hommels hun nest maken in verlaten winterkoninkjesnesten of in speelnesten van dezen vlijtigen nestbouwer. Ook nestblokken worden vaak door hommels in beslag genomen en bijna altijd is de bruinruggige akkerhommel de dader. Er gaat geen jaar voorbij, of ze nemen één of meer van mijn nestblokken in beslag en menigeen, die vogels op zijn erf wil lokken, komt teleurgesteld uit door het werk van die hommels, al is zoo'n vestiging op zich zelf toch ook weer heel interessant en leerzaam. De hommelkolonie gaat in den nazomer te gronde, 't is daarom goed reeds in September de nestkastjes schoon te maken, want de hommelnesten kunnen zeer groot zijn en veroorzaken veel rommel. Wie er op let, kan in 't voorjaar de vogels wel met de insecten zien kibbelen en de hommel wint het dikwijls. 't Volgend voorjaar ga ik eens probeeren of ik de hommels door 't één of ander geurtje, dat hun ergert, maar de vogels niet schaadt, uit de nestblokjes kan houden.

In 't doosje waren tijdens de verzending een paar hommelpoppen uitgekomen, de hommels daaruit waren bijna spierwit.

Th.

**De Lijsters in Oost en West.** — In de eerste weken van Augustus ben ik nogal dikwijls heen en weer getrokken langs de oostgrens van ons land en langs de zee en nu was het opmerkelijk dat, terwijl langs den duinzoom reeds in 't laatst van Juli de meeste lijsterbesboomen geheel kaalgevreten waren, nog in het midden van Augustus diezelfde boomen in Drente, Overijsel en Gelderland nog rood waren van de vruchten. Wijst dit op een sterkere lijsterbevolking voor Holland of hebben wij daar eerder te doen met een vroegen najaarstrek van jonge lijsters, in 't bijzonder van merels? Het laatste lijkt mij 't waarschijnlijkst.

Th.

**Blauwe Bremraap.** — Naar aanleiding van uw vraag in *D. L. N.* van 1 Juli, wie de blauwe bremraap ook ten Noorden van het Noordzeekanaal waarnam, meld ik u, dat ik in 1908 dicht bij IJmuiden een pracht-exemplaar vond.

Haarlem.

CATH. COOL.

**Lepelaars.** — Als wachtcommandant, uitkijkpost over den mond van het Haringvliet, zit ik iederen dag een paar uur door een pracht-verrekijker — tot op 10 KM. duidelijke beelden —