



Dat het roode kroos aan het daarmee besmette landschap een zekere somberheid verleent, die het niet-besmette landschap mist, valt ons bij vergelijking van het besmette met het niet-besmette gebied, terstond op.

De hier en daar onderzochte exemplaren, waarvan er verscheidene sporocarpiën droegen,



Het Verspreidingsgebied van Azolla

op Voorne. 26 October 1915. □



De Communicatie der Polders.

→ Richting v. h. Uitstroomende water.

⇨ Richting v. h. instroomende water.

behoorden allen tot de soort *filiculoides*. Bestrijdingsmaatregelen werden, tot nu toe, nog nergens genomen.

Enkele gevallen zijn ons bekend, waar Azolla tot bemesting werd aangewend en gunstige ervaringen werden opgedaan.

M. SPOON.

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.

Geaster limbatus. — Naar aanleiding van het artikel over »Nieuwe en zeldzame Nederlandse paddestoelen gevonden in het jaar 1914«, in aflevering-No. 6 van uw tijdschrift »De Levende Natuur« heb de eer u te berichten, dat ik 31 Augustus 1915 op de Stompert bij Amersfoort hoogstwaarschijnlijk een *Geaster limbatus* gevonden heb. De tekening althans klopt volkomen. Het volgende jaar zal ik daar nog eens rondsnuffelen en als ik weer een exemplaar vind, zal ik het u opzenden.

Utrecht.

P. DEN TOOM.