

algemeen aan onze kust voorkomt en vaak gevangen wordt in de netten der garnalen visschers. Dit is ook een typische slijmvisch, heelemaal niet gevaarlijk en daarenboven zeer interessant, omdat hij zoowat de eenige visch is in onze fauna, die levende jongen ter wereld brengt. De puitaal is nog al eens levend te zien in het Aquarium van »Artis« te Amsterdam; den zeewolf heb ik daar lang niet zooveel keer ontmoet, wat geen wonder is, want er zal wel heel wat toe noodig zijn, om zulk een Hollen Gijs van het noodige te voorzien.

L. DORSMAN Cz.

VERSLAG VAN DE TENTOONSTELLING DER NED. MYCOLOGISCHE VEREENIGING

gehouden in het Gebouw „de Vereeniging“ te 's Gravenhage van 25—28 Sept. 1915.

Eere-Comité:

Prof. Dr. G. van Iterson, Eere-Voorzitter; Mevr. M. E. Baronesse van der Capellen—Molewater; Mevr. S. W. Harpen Kuyper—Cats; Mevr. C. de Wit—Boellaard; Jhr. W. C. S. van den Brandeler; Dr. Joh. H. van Burkom; Jhr. C. E. Dittlinger; P. J. van Houten; Mr. P. Maclaine Pont; J. D. Ruys; O. F. Weise.

Regelings-Comité:

Joh. Ruys, Voorzitter; J. J. Duyvené de Witt, Secr.-Penningmeester, Velp. Mej. A. M. Dekker, Wormerveer; Mevr. E. Kalshoven—Biermans, Zalt-Bommel; Mevr. A. den Tex—Boissevain, Amsterdam; P. J. A. J. Meulemeester, Zwolle; D. A. M. G. Planken, den Haag. Benevens de overige leden van het Hoofdbestuur der N. M. V., die als zoodanig deel dezer Commissie uitmaken: Mej. Ch. J. Farret; Dr. H. J. Calkoen.

Beoordeeligs-Comité:

Mej. Cath. Cool, Haarlem; C. Brakman, Zeist; H. A. A. v. d. Lek, Wageningen; P. Ligtenberg, Oss; Dr. J. S. Meulenhoff, Zwolle.

Vorbereiding:

Reeds den 23^{sten} Sept. verzamelden zich eenige Commissieleden om op het buitengoed Wildsang te 's Gravenhage, welwillend daartoe door den eigenaar beschikbaar gesteld, materiaal te verzamelen. Zóó deden natuurlijk alle consuls in hunne omgeving en met hen, vele leden en niet leden der Mycologische Vereeniging, opdat den 24^{sten} Sept. tijdig de paddenstoelen aanwezig zouden zijn.

De tijds- en weersomstandigheden waren zeer ongunstig. Zeer vele paddenstoelen waren er in de maanden Juli en Augustus reeds geweest en bovendien waren de laatste weken droog en de laatste dagen zeer koud geweest, wat allesbehalve bevordelijk was voor den groei van deze natuurkiaderen, die 't beste gedijen bij zeer vochtig-lauw-warm weer. De Commissie had in het slagen van de tentoonstelling dan ook een zwaar hoofd, besloot echter tot doorgaan, wat haar niet heeft berouwd. Op den 24^{sten} Sept., den grooten dag van voorbereiding was er tot haar vreugde nog zeer veel materiaal aanwezig, uit alle oorden van het land toegestuurd, veel meer dan nog bij een der vorige tentoonstellingen in gunstiger tijden, wel een bewijs van den grooten vooruitgang der mycologie door de Vereeniging in ons land gemaakt. Prachtige zendingen kwamen er o.a. van den heer Mr. J. G. Wurfain, Huize »Heuven« Worth Rheden, van den chef-bloemist op 't Loo, den heer Berendsen, van den heer Berninck uit Denekamp, van Dr. Vuyck uit Diepenveen, van Mej. Popta uit Heiloo, van Mej. v. Steyn, huize

Volledige lijst van ingekomen soorten: *Amanita phalloides*, mappa, muscaria, pantherina, virosa, rubescens, junquillea, vaginata; *Lepiota procera* en var. fuliginosa, rhacodes, lenticularis, excoriata, cristata, amianthina, hispida?, aspera; *Armillaria aurantiaca*, mellea, mucida; *Tricholoma columbetta*, alba, albo-brunneus, aggregatum, terreum, saponaceum, portentosum, colossus, rutilans, equestre, vaccinum, nudum, sulfureum, brevipes, graveolens, cinerascens; *Clitocybe infundibuliformis*, flaccida, clavipes, odora, pithyophylla, nebularis, obsoleta; *Laccaria laccata* en var. amethystina; *Collybia velutipes*, dryophila, butyracea, maculata, distorta, confluens, platyphylla, radicata; *Mycena pura*, filopes, polygramma, rugosa, galericulata, haematopoda; *Omphalia fibula*, Schwartzii; *Hygrophorus miniatus*, flammans, coccineus, hypothejus; *Lactarius controversus*, vietus, rufus, subdulcis, theiogalus, insulsus, turpis, deliciosus, vellereus, piperatus, serifluus, blennius, mitissimus, flexuosus, glyciosmus, pyrogalus, helvus, volemus; *Russula* Queletii, drimeii, ochroleuca, fellea, nigrescens, adusta, cyanoxantha, heterophylla, fragilis, rubra, ochracea, alutacea, xerampelina; *Cantharellus cibarius*, infundibuliformis, umbonatus; *Nyctalis asterophora*; *Marasmius rotula*, urens, oreades, graminum; *Panus stypticus*; *Lentinus cochleatus*; *Schizophyllum commune*; *Lenzites betulina*, saepiaria; *Pluteus cervinus* en var.; *Entoloma sericeum*; *Nolanea pascua*, icterina; *Leptonia euchroa*; *Volvaria gloiocephala*; *Cortinarius elatior*, erythrinus, mucifluus, vibratilis, mucosus, albo-violaceus, cinereo-violaceus, hinnuleus, paleaceus, laniger, armillatus, pholideus, bolaris; *Pholiota spectabilis*, adiposa, aurivella squarrosa, mutabilis, destruens, radicata; *Inocybe frumentacea*, geophylla, fastigiata, decissa, hirsuta, sambucina, rimosa, scabella, lucifuga, *Hebeloma crustuliniforme*, sinapizans; *Flammula sapinia*, chrysophylla, gummosa, flavida, astragalina; *Galera tenera*, hypnorum; *Paxillus involutus*, atrotomentosus; *Gomphidius viscidus*, roseus; *Psalliota campestris* en de var. alba, praticola en haemorrhoidaria, arvensis, sylvatica; *Stropharia aeruginosa*, stercoraria; *Hypholoma fasciculare*, sublateritium, cotoneum, lacrymabundum, piluliformis, hydrophyllum; *Psathyra bifrons*; *Coprinus micaceus*, comatus, atramentarius, extingtorius; *Panaeolus campanulatus*; *Psathyrella disseminata*; *Boletus cavipes*, granulatus, cyanescens, badius, variegatus, versicolor, satanas, bovinus, castaneus, luteus, flavus, flavidus, edulis, piperatus, chrysenteron, subtomentosus, scaber; *Fistulina hepatica*; *Polyporus vaporarius*, radiatus, destructor, coninatus, borealis,

chioneus, adustus, fumosus, rutilans, betulinus, amorphus, annosus, versicolor, varius, brumalis, cuticularis, applanatus, igniarius, resinosus, perennis, abietinis, zonatus, conchatus, robustus; *Daedalea*, biennis, quercina, unicolor; *Trametes* rubescens, gibbosa; *Merulius* tremellosus, corium, lacrimans; *Hydnum* repandum, compactum, ferrugineum, imbricatum, melaleuceum, graveolens, violascens, cyathiforme, nigrum, molle, auriscalpium, erinaceum; *Phlebia* merismoides; *Craterellus* cornucopioides; *Telephora* terrestris, antocephala; *Stereum* hirsutum, spadiceum, purpureum; *Corticium* cinereum, quercinum; *Calocera* viscosa; *Exobasidium* vaccinii; *Clavaria* formosa, cristata, rugosa, stricta; *Sparassis* crispa; *Hirneola* auricula Judae; *Exidia* glandulosa; *Dacryomyces* deliquescens; *Tremella* mesenterica; *Phallus* impudicus en var., caninus; *Cyathus* striatus; *Crucibulum* vulgare; *Scleroderma* vulgare, verrucosum; *Geaster* triplex, mammosum, fornicatus, fimbriatus, minimus, coliformis; *Tulostoma* mammosum; *Lycoperdon* gemmatum, saccatum, echinatum, caelatum, hiemalis; *Bovista* gigantea, plumbea; *Rhizopogon* luteolus; *Peziza* onotica, aurantiaca, fusispora, leporina, badia, cupularis, scutellata, haemisphaerica, tuberosa; *Leotia* lubrica; *Helvella* elastica, atra; *Macropodia* macropus; *Xylaria* polymorpha, hypoxylon; *Bulgaria* inquinans; *Morchella* esculenta, rimosipes; *Elaphomyces* granulatus; *Cordiceps* militare, ophioglossoides; *Rhytisma* acerinum; *Nectria* cinnabarina; *Geoglossum* glabrum; *Trichia* varia; *Stemonitis* fusca; *Leocarpus* fragilis; *Badhamia* utricularis; *Arcyria* flava en punicea.

Wijze van demonstratie: op tafels tusschen mos en planten. De paddenstoelen waren gerangschikt volgens het systeem van wijlen Prof. C. A. J. A. Oudemans; de eetbare soorten voorzien van groene, de niet eetbare, onschadelijke soorten van witte en de giftige van roode kaartjes; de doodelijk-giftige prijkten bovendien met een doodskop op het kaartje.

Stillevenen van paddenstoelen waren deze keer helaas door de weinige fleur en kleur der soorten niet te vervaardigen. Alleen prijkte er op een tafeltje een sierlijk stukje moeras, met *Geoglossum* glabrum (de aardtong) en het vuurroode moeraszwammetje *Hygrophorus* flammans ingezonden door mej. Dr. Mia Boissevain.

Verdere bijdragen:

1. Een »meule« in 't klein, ingezonden door den Champignonkweeker de heer Polvliet uit Ugghelen bij Apeldoorn.
2. *Schilderijen* van paddenstoelen ingezonden door Mevr. Thol—Ruysch.
3. *Aquarellen* van paddenstoelen door Mevr. E. Kalshoven—Biermans te Zalt-Bommel, den Heer Joh. Ruys te Heemstede en den Heer B. Reith te Maarssen.
4. *Inzending gedroogde Polyporeën* van het Rijks-Herbarium te Leiden, opgeluisterd door de aquarellen van paddenstoelen door Mej. H. C. v. d. Pavord Smits te Leiden, vervaardigd voor de Flora Batava. Tevens eenige boekwerken op mycologisch gebied.
5. *Inzending Plaat- en Boekwerken* van de firma Nijhoff te 's Gravenhage.
6. *Een eet-tafel voor paddenstoelen*, waarvan Mej. Cath. Cool uit Haarlem voor wie het wenschten, verschillende paddenstoelensoorten liet proeven. Aanwezig waren: *Armillaria mellea*, *Lepiota procera*, *Marasmius oreades*, *Cantharellus cibarius* (ook als zoet-zuur), *Coprinus comatus* en *atramentarius*, *Psalliota arvensis*, *Boletus edulis*, *granulatus*, *luteus* en *flavus*, *Fistulina hepatica*, *Lycoperdon Bovista* en *Morchella esculenta*.
7. *Inzending van gesteriliseerde paddenstoelen*. *Cantharellus cibarius* (hanekammen) en *Morchella esculenta* (morieljes) door Mevr. Zeller uit Amsterdam.

Ter verkoop waren bij den ingang van de zaal de volgende boekwerken: »Een en ander over paddenstoelen«, uitgave van de Ned. Mycol. Ver.

Over de Sporenkieming en het kweken van Paddenstoelen door Cath. Cool, uitgave Ned. Mycol. Ver.

Het Paddenstoelenboekje, door Cath. Cool en H. A. A. v. d. Lek. (Bibliotheek van D. L. N.).

Het wonderle leven der Paddenstoelen van D. J. v. d. Ven.

»Onder het Zwammenvolkje« van Tante Lize (Mevr. E. Dopheide—Witte).

»De Champignonkeuken« van »Lucullus«.

De opening van de tentoonstelling geschiedde den 25^{sten} Sept. des morgens 11 uur, door den Voorzitter van het Eere-comité Prof. Dr. G. v. Iterson uit Delft, nadat eerst Dr. A. J. Kluyver een zeer boeiende voordracht gehouden had over »De Chemie der hoogere zwammen.«

Dienzelfden morgen 12 uur vereerde H. M. de Koningin-Moeder de tentoonstelling met een langdurig, belangstellend bezoek. De Commissieleden vereenigden zich daarna aan een gemeenschappelijke lunch.

Des avonds op de Algemeene Vergadering der Vereeniging hield de Heer D. J. v. d. Ven een voordracht over »de Paddenstoelen in het Volksleven en Volksgeloof.«

Het aantal bezoekers gedurende de tentoonstellingsdagen bedroeg ruim 1100.

Frisch materiaal werd nog weer verzameld op de buitens Zorgvliet en Duindigt.

Haarlem.

CATH. COOL.


VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.

Molge cristata. — Het verwondert mij, dat collega Willemse in zijn stuk over de salamanders van Nederland schrijft ten aanzien over *Molge cristata* Laurenti. »Het is wel opvallend dat deze soort in de Noordelijke provinciën en in Noord- en Zuid-Holland niet gevonden is.« Schlegel zegt op pag. 40 van zijn »Kruipende Dieren«: »Hij komt ook op sommige plaatsen in de slooten aan den duinkant voor....« Zelf vond ik het dier bij Leiden vrij veelvuldig en ik denk, dat ik niet de eenige zal zijn, die het in de Hollandsche provincie vond. Ik hoop dat zijn stuk het gewone goede gevolg zal hebben, dat velen met hun ervaring voor den dag komen.

Amsterdam. D. MAC GILLAVRY.

Rectificatie. — Op pag. 306 in de vorige aflevering moet *Nerita fluviatilis* veranderd worden in *Neritina fluviatilis*.

Streken van Stuifballen. — Vergroeiingen van paddestoelen komen nog al dikwijls voor, wat niet te verwonderen is, als men bedenkt, dat het paddestoellichaam eigenlijk uit vrij wel een en hetzelfde stel van dunne draadjes is opgebouwd. Geen wonder dus, dat, als ze dicht op elkaar staan af en toe eens een stelletje aan elkander verkleefd raken en eigenlijk moeten wij ons erover verwonderen, dat zij nog zoo dikwijls in bijzondere omstandigheden toch tot normale ontwikkeling komen b. v. dat zeer dicht op elkaar groeiende paddestoelen toch nog zoowat nooit den



Abnormaal gevormde stuifbal.

vijfhoek- of zeshoekvorm aannemen. In hetzelfde sparrantaalje te Bloemendaal, waar de reuzen-schubsteel groeit, die ons zooveel hoofdbreken