

Zwarte Specht. — In »De Graafschapsbode«, dd. 1 Juli 1916, vind ik een bericht omtrent het broeden van den zwarten specht op het landgoed »De Wiersse« bij Ruurlo. Er staat zelfs nog wel, dat er »eenige paren« van nestelen. Woont er geen der lezers in die buurt, die eens een onderzoek in loco zou willen instellen en zijn bevindingen publiceeren. 't Dunk me wel de moeite waard te wezen.

Wageningen.

A. B. WIGMAN.

Een nieuwe merelmode. — Er broedt op het oogenblik in onze kweekkerij een zwarte merel op den grond, een kuiltje in het zand, met 5 eieren. Hierin bevindt zich hoegenaamd niets in, wat op een nest gelijkt, zelfs geen grassprietje. Gisteren joegen wij den vogel van dit kuiltje, en nu bleek ons vermoeden juist, het bleek, dat deze niet kon vliegen, vermoedelijk tegen een telegraafdraad gevlogen. Wij vinden het zoo aardig, dat trots de merel gewond is, toch nog voor de voortplanting gezorgd wordt.

Naarden.

J. JURRISEN.

CORRESPONDENTIE.

J. C. v. d. D. te R. — Ingesloten takje niet aangetroffen, maar dat *Verbena officinalis* aan dien dijk zou groeien is niet onwaarschijnlijk; de plant duikt overal langs de groote rivieren op. *Lolium* vertoont dikwijls wringing van de bloeias. De werking van vergiften op planten en dieren is zeer verschillend en 't is dus heel goed mogelijk, dat de eene plant leed en de andere ongedeerd bleef.

T.

W. J. V. te A. — De Driehoorn (*Geolrupes Typhoeus*) is op onze heiden vrij algemeen in het voor- en najaar aan te treffen.

T.

J. M. D. te Maastricht. — Op uw vraag of het aftreksel van den bolster der noot (*Juglans regia*) schadelijke of giftige bestanddeelen bevat kan ik u antwoorden, dat ik die bolster nergens als giftig gesignaleerd vind. Het aftreksel is van ouds een bekend middel om huid en haar te kleuren.

T.

Mej. S. te Groesbeek. — De gal, die u zond, is die van het galwespie van 't Havikskruid, *Aulax hieracii*. Vooral op Schermdragend havikskruid komt deze gal dikwijls voor op bloemstelen.

T.

K. B. te Hoogezand. — Uw vlinder is *Hylophila bicolorana*. De rups ervan is groen, soms geelachtig getind, met een zwarte, licht omzoomde middenstreep over den rug. Leeft voornamelijk op eik, ook op beuken en berken. De verwante soort *H. prasinana* is meer algemeen, die heeft niet zulke mooie, witte zijden achtervleugeltjes. Uw schildluis is wel *Coccus conchaeiformis*.

T.

A. K. te Amsterdam. — Dat roodstaartjes tweemaal achtereen in één jaar hetzelfde nest gebruiken komt dikwijls voor; ook wel nemen zij jaren achtereen dezelfde holte. Dat draaihalzenei op den grond zal daar toch wel in legnood gedeponeerd zijn.

T.

GEVRAAGD:

Wortelstokken van Paris en *Trientalis*, mits uitgegraven op een plaats, waar zij in groote hoeveelheden voorkomen, met opgave van vindplaats, verzonden in vochtig mos, verpakt in biscuitblik; in ruil voor: in potjes gekweekte wilde Nederlandsche en buitenlandsche bosch-, weide- en rotsplantjes.

Boschplanten: *Circaea* (heksenkruid), *Sanicula*, papaver, *Corydalis Cava*, een geranium uit 't bosch van Vallombrasa, die bloeit van Mei—November, *Astrantia major*, *Campanula rotundifolia*, een *Asperula*soort van 't meer van Nemi, die bloeit den geheelen zomer. Al deze planten bloeien overvloedig in de schaduw en breiden zich snel uit door kruipen of zaaiing enz.

Rotsplantjes: Verschillende sedums, *saxifraga's* en *Sempervivums*, *Campanula pusilla*, *Geranium pyrenaicum*, enz.

Planten om te laten verwilderen op een grasveldje, dat alleen in Juni en Augustus gemaaid wordt. *Hieracium aurantiacum*, *Ajuga reptans*, *brunella*, *Chrysanthemum leucanthemum*, enz. — Tot 1 October te zenden aan Mevr. G. M. den Tex, Heerlijkheid bij Naarden, met opgaaf van hoeveel, van welk soort planten verlangd wordt, tot een maximum van 25 potjes.

Billijk ter overname gevraagd: D. ter Haar, »De Nederlandsche Vlinders«; Dr. E. Everts, »*Cleoptera Neerlandica*«; Reitter, »*Käfer Germanica*« Brieven fr., met uiterste prijsopgave, aan J. F. B. Nieuwenhuysen, Adm. de Ruyterweg 108, Amsterdam.